ÜRÜN ÖZELLİKLERİ ÖZETİ

1. VETERİNER TIBBİ ÜRÜNÜN İSMİ
DERMAVAC, Enjeksiyonluk Çözelti Liyofilizatı ve Sulandırıcısı

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM
1 doz (0,1 ml) aşıda,

Etkin madde:
Attenue Ektima Aşı Virusu Pendik Suşu E(P)CK22 $\geq 10^{2,9}$ $TCID_{50}$

Tüm yardımcı maddeler için Bölüm 6.1'e bakınız.

3. FARMASÖTİK ŞEKİL
Enjeksiyonluk Çözelti Liyofilizatı ve Sulandırıcısı

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1. Hedef türler
Kuzu, oğlak

4.2. Her bir hedef tür için kullanım alanı
DERMAVAC Aşısı; kuzu ve oğlakların Ektima hastalığına karşı koruyucu amaçla kullanılır.

4.3 Kontrendikasyonlar
Aşı önerilen dozlarda kullanıldığında etkin maddesi veya aşı muhteviyatına karşı bilinen bir kontraendikasyon bulunmamaktadır.

4.4. Her bir hedef tür için özel uyarılar
Aşı, kuzu ve oğlaklarda kullanılmak üzere hazırlanmıştır. Diğer aşılarla (canlı, inaktif/ viral, bakterin, toksoid) birlikte uygulanmasına yönelik yeteri düzeyde çalışma bulunmamaktadır.

4.5. Kullanıma ilişkin özel uyarılar
(i) **Hayvanlarda kullanımına ilişkin özel uyarılar**
Aşı uygulaması sadece sağlıklı hayvanlara yapılmalıdır. Yüksek ateş ve hastalık bulguları gösteren hayvanlar sürüden ayrılmalı ve aşılanmamalıdır. Enjeksiyon yeri antiseptiklere temizlendikten sonra aşı iyice çalkalanarak uygulanmalıdır.
Uygulamadan 3-4 gün sonra aşı yerinde vezikül püstül ve daha sonra kabuklaşma meydana gelir. %1 oranında genel ferdi aşı reaksiyonları görülebilir. Aşı yapılan hayvanlarda lokal ve genel aşı reaksiyonları görülmesi halinde hasta kuzu ve oğlaklar sürüden ayrılır; kapalı bir barınakta Veteriner Hekiminin kontrolü altında tedavi edilir.

(ii) Ürünü uygulayana ilişkin özel uyarılar
Aşı uygulamaları sadece veteriner hekim veya veteriner hekim gözetimindeki teknisyenler tarafından yapılır. Uygulama sırasında koruyucu ekipmanlar (önlük, eldiven gibi) kullanılmalıdır. İyi hekimlik uygulaması gereğince aşılama sırasında cilt, göz ve giysilerin aşı materyali ile temasından kaçınılmalıdır. ORF aşı suşu insanlarda enfeksiyon oluşturma yeteneğine sahiptir. Aşının deri ve göz ile temasından kesinlikle kaçınılmalıdır. Böyle bir temas durumunda, hemen alkol veya uygun bir dezenfektan temas olunan bölgeye uygulanmalıdır. Aşı uygulayan veya hayvan zaptında görev yapan kişilerin aşı ile teması durumunda bir sağlık

kuruluşu tarafından brusellosiz yönünden takibi yapılmalıdır. Aşının uygulama sahasına dökülmesi durumunda dökülen yer uygun bir dezenfektan kullanılarak dezenfekte edilmelidir.

4.6. İstenmeyen etkiler (sıklık ve şiddet)
Aşılamadan sonra enjeksiyon yerinde hafif kızarıklık, çizikten dolayı hafif şişkinlik ve 4-8 gün içinde tamamen iyileşen ince kabuklanmalar meydana gelebilir. Bunlar normal aşı reaksiyonlarıdır. Aşılama yapılan kuzularda vücut sıcaklıklarında aşılamadan sonra birinci günde hafif bir artış gözlenebilir.

4.7. Gebelik, laktasyon ve yumurtlama döneminde kullanım
DERMAVAC, gebe ve ergin hayvanlarda kullanılmamaktadır.

4.8. Diğer tıbbi ürünlerle etkileşim ve diğer etkileşim şekilleri
Diğer aşılarla kullanıldığında (aynı gün ya da farklı zamanlarda) bu ürünün güvenliği ve etkinliği bilinmemektedir. Genel bir yaklaşımda aşının uygulanmasından 14 gün önce ve 14 gün sonrasında başka bir tıbbi ürünün uygulanması önerilmez.

4.9. Dozaj ve kullanım yolu
Aşı 1 haftalıktan itibaren her yaştaki kuzu ve oğlaklara Regio inguinaldeki (arka bacağın iç kısmi) çıplak deride oluşturulan skarifikasyon alanına 2 damla (0,1 ml) damlatılıp bir kaç saniye bekletilerek uygulanır. Skarifikasyon, 0.5-1 cm. uzunluğunda 3-4 çizgi halinde çaprazlama şeklinde derinin ilk tabakasını geçecek kadar derin, fakat kanama yapmayacak şekilde çizerek oluşturulur.
Aşı, kullanılacağı zaman steril bir enjektörle sulandırma sıvısından 3 ml alınıp kuru aşı şişesine aktarılır, köpürtmeden çalkalanır ve tekrar enjektörle çekilerek sulandırma sıvısına ilave edilir. Bu işlem 2-3 kez tekrarlanmalıdır.
Aşı, uygulamalarında asepsi ve antisepsi kurallarına kesinlikle uyulmalı, kullanılan iğne ve enjektörler kimyasal maddelerle temizlenmemelidir. Bağışıklık 21 günde tam olarak oluşur, bağışıklık süresi 6 aydır.

4.10. Doz aşımı, varsa semptomlar, acil prosedürler, antidotlar (gerekli ise)
10 doz aşı uygulaması yapılan hayvanlarda herhangi bir olumsuz bulgu gözlemlenmemiş olup; 10 doza kadar güvenli bir şekilde kullanılabilir.

4.11. Kalıntı arınma süreleri (sıfır gün olanlar da dâhil)
Gıda değeri olan hayvanlarda yasal arınma süresi 14 gündür.

5. İMMUNOLOJİK ÖZELLİKLER
Farmakoterapötik Grup: Keçi ve koyunlarda canlı viral aşılar
ATCvet Kodu: QI03AD

6.FARMASÖTİK ÖZELLİKLER
6.1 Yardımcı Maddeler

Liyofilize aşı:
Laktalbumin hidrolizat
Sükroz

Sulandırma sıvısı:
Sodyum Klorür

Potasyum Klorür
Disodyum hidrojen fosfat
Potasyum dihidrojen fosfat
Gliserol
Enjeksiyonluk su

6.2 Geçimsizlikler
Ürünün sulandırıcısı ve ürünle sağlanan diğer komponentler dışında herhangi bir tıbbi ürünle karıştırılmaması önerilir.

6.3 Raf ömrü
Satışa sunulmuş haliyle raf ömrü: 24 ay
Sulandırma sıvısının raf ömrü: 24 ay
Sulandırılan aşının raf ömrü: 6 saat

6.4 Muhafaza şartları
Liyofilize aşı; 2 – 8 °C'de saklanmalıdır ve güneş ışığından korunmalıdır. Dondurulmamalıdır. Sulandırıcı, karanlık ve kuru bir yerde, 25 °C'nin altında buzdolabına konulmadan, dondurulmadan muhafaza edilmelidir.

6.5 Birincil ambalajın niteliği ve kompozisyonu
Karton kutu içerisinde, 50 dozluk liyofilize aşılar 5 ml, 100 dozluk liyofilize aşılar 10 ml ve 200 dozluk liyofilize aşılar 20 ml sulandırma sıvısı ile birlikte ambalajlanmıştır. Liyofilize kısım için Tip I 4R cam şişe, sulandırma sıvısı şişeleri 5 ml için Tip I 8R cam şişe, 10 ml için Tip I 10R cam şişe, 20 ml için Tip I 20R cam şişeler kullanılmıştır. Şişelerin ağzı butil plastikten yapılmış tıpalar ve alüminyum kapaklar ile kapatılmıştır. Liyofilize aşı ve sulandırma sıvısı içeren aşılar münferit karton kutularda prospektüs, damlalık ile birlikte ambalajlanmış şekilde piyasaya sunulmaktadır.

6.6 Kullanılmış veya Arta Kalan Ürünün İmhasına İlişkin Özel Önlemler
Kullanılmış veya arta kalan ürün ilgili mevzuata göre imha edilmelidir. İmha işlemi iki aşamada gerçekleşir. İlk olarak 1.2 atm basınç altında 121 ºC'de 1 saat süreyle otoklav işlemi uygulanır. Son olarak biyolojik atık sistemine gönderilir veya fosseptik çukurlara gömülür.

7. PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ
VETAL Hayvan Sağlığı Ürünleri A.Ş.
Petrolosb. Mah. 14. Cad.No.1/1 Adıyaman
Telefon: +90 416 223 2030- 223 2488 **Faks:**+90 416 223 1456
Web: www.vetal.com.tr **E-mail:** vetal@vetal.com.tr

8. PAZARLAMA İZNİ NUMARASI

9. PAZARLAMA İZNİNİN İLK VERİLME VEYA YENİLEME TARİHİ
10.11.2004

10. METİN DEĞİŞİKLİK TARİHİ
09.03.2026

PROSPEKTÜS

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır

DERMAVAC

Enjeksiyonluk Çözelti Liyofilizatı ve Sulandırıcısı

Kuzu ve Oğlakların Ektima Virüsü Aşısı

Ektima virüsü ile hazırlanmış, kuzu ve oğlakaların ektima hastalığına karşı koruyucu canlı aşı

BİLEŞİMİ

1 doz (0,1 ml) aşıda

Etkin madde:

Attenue Ektima Aşı Virusu Pendik Suşu E(P)CK22 $\geq 10^{2,9}$ $TCID_{50}$

Yardımcı maddeler:

Laktalbumin hidrolizat	0,25 mg
Sükroz	0,5 mg

Sulandırma Sıvısının Bileşimi:

Bir doz sulandırma sıvısı içinde; Sodyum Klorür 0,4 mg, Potasyum Klorür 0,01 mg, Disodyum hidrojen fosfat 0,06 mg, Potasyum dihidrojen fosfat 0,01 mg, Gliserol 0,05 ml, Enjeksiyonluk su (hacim tamamlayıcısı) içerir.

İMMUNOLOJİK ÖZELLİKLER

Farmakoterapötik Grup: Keçi ve koyunlarda canlı viral aşılar
ATCvet Kodu: QI03AD

KULLANIM SAHASI/ ENDİKASYONLAR

DERMAVAC Aşısı; kuzu ve oğlakların Ektima hastalığına karşı koruyucu amaçla kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Aşı 1 haftalıktan itibaren her yaştaki kuzu ve oğlaklara Regio inguinaldeki (arka bacağın iç kısmi) çıplak deride oluşturulan skarifikasyon alanına 2 damla (0,1 ml) damlatılıp bir kaç saniye bekletilerek uygulanır. Skarifikasyon, 0.5-1 cm. uzunluğunda 3-4 çizgi halinde çaprazlama şeklinde derinin ilk tabakasını geçecek kadar derin, fakat kanama yapmayacak şekilde çizerek oluşturulur.

Aşı, kullanılacağı zaman steril bir enjektörle sulandırma sıvısından 3 ml alınıp kuru aşı şişesine aktarılır, köpürtmeden çalkalanır ve tekrar enjektörle çekilerek sulandırma sıvısına ilave edilir. Bu işlem 2-3 kez tekrarlanmalıdır.

Aşı, uygulamalarında asepsi ve antisepsi kurallarına kesinlikle uyulmalı, kullanılan iğne ve enjektörler kimyasal maddelerle temizlenmemelidir. Bağışıklık 21 günde tam olarak oluşur, bağışıklık süresi 6 aydır.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL UYARILAR

Aşı, kuzu ve oğlaklarda kullanılmak üzere hazırlanmıştır. Diğer aşılarla (canlı, inaktif/ viral, bakterin, toksoid) birlikte uygulanmasına yönelik yeteri düzeyde çalışma bulunmamaktadır. Aşı

uygulaması sadece sağlıklı hayvanlara yapılmalıdır. Yüksek ateş ve hastalık bulguları gösteren hayvanlar sürüden ayrılmalı ve aşılanmamalıdır. Enjeksiyon yeri antiseptiklere temizlendikten sonra aşı iyice çalkalanarak uygulanmalıdır.
Uygulamadan 3-4 gün sonra aşı yerinde vezikül püstül ve daha sonra kabuklaşma meydana gelir. %1 oranında genel ferdi aşı reaksiyonları görülebilir. Aşı yapılan hayvanlarda lokal ve genel aşı reaksiyonları görülmesi halinde hasta kuzu ve oğlaklar sürüden ayrılır; kapalı bir barınakta Veteriner Hekiminin kontrolü altında tedavi edilir.

Gebelik ve Laktasyon Döneminde Kullanımı
DERMAVAC, gebe ve ergin hayvanlarda kullanılmamaktadır.

İSTENMEYEN ETKİLER
Aşılamadan sonra enjeksiyon yerinde hafif kızarıklık, çizikten dolayı hafif şişkinlik ve 4-8 gün içinde tamamen iyileşen ince kabuklanmalar meydana gelebilir. Bunlar normal aşı reaksiyonlarıdır. Aşılama yapılan kuzularda vücut sıcaklıklarında aşılamadan sonra birinci günde hafif bir artış gözlenebilir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ
Diğer aşılarla kullanıldığında (aynı gün ya da farklı zamanlarda) bu ürünün güvenliği ve etkinliği bilinmemektedir. Genel bir yaklaşımda aşının uygulanmasından 14 gün önce ve 14 gün sonrasında başka bir tıbbi ürünün uygulanması önerilmez. Ürünün sulandırıcısı ve ürünle sağlanan diğer komponentler dışında herhangi bir tıbbi ürünle karıştırılmaması önerilir.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT
10 doz aşı uygulaması yapılan hayvanlarda herhangi bir olumsuz bulgu gözlemlenmemiş olup; 10 doza kadar güvenli bir şekilde kullanılabilir.

GIDA DEĞERİ OLAN HAYVANLARDA KALINTI UYARILARI
Gıda değeri olan hayvanlarda yasal arınma süresi 14 gündür.

KONTRENDİKASYONLAR
Aşı önerilen dozlarda kullanıldığında etkin maddesi veya aşı muhteviyatına karşı bilinen bir kontraendikasyon bulunmamaktadır.

GENEL UYARILAR
Çocukların ulaşamayacağı yerde bulundurunuz.
Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN ÖNERİLER
DERMAVAC aşı uygulamaları sadece veteriner hekim veya veteriner hekim gözetimindeki teknisyenler tarafından yapılır. Uygulama sırasında koruyucu ekipmanlar (önlük, eldiven gibi) kullanılmalıdır. İyi hekimlik uygulaması gereğince aşılama sırasında cilt, göz ve giysilerin aşı materyali ile temasından kaçınılmalıdır. ORF aşı suşu insanlarda enfeksiyon oluşturma yeteneğine sahiptir. Aşının deri ve göz ile temasından kesinlikle kaçınılmalıdır. Böyle bir temas durumunda, hemen alkol veya uygun bir dezenfektan temas olunan bölgeye uygulanmalıdır. Aşı uygulayan veya hayvan zaptında görev yapan kişilerin aşı ile teması durumunda bir sağlık kuruluşu tarafından brusellosiz yönünden takibi yapılmalıdır Aşının uygulama sahasına dökülmesi durumunda dökülen yer uygun bir dezenfektan kullanılarak dezenfekte edilmelidir.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ
Satışa sunulmuş haliyle raf ömrü: 24 ay
Sulandırma sıvısının raf ömrü: 24 ay
Sulandırılan aşının raf ömrü: 6 saat
Liyofilize aşı; 2 – 8 °C'de saklanmalıdır ve güneş ışığından korunmalıdır. Dondurulmamalıdır. Sulandırıcı, karanlık ve kuru bir yerde, 25 °C'nin altında buzdolabına konulmadan, dondurulmadan muhafaza edilmelidir.

KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR
Kullanılmış veya arta kalan ürün ilgili mevzuata göre imha edilmelidir. İmha işlemi iki aşamada gerçekleşir. İlk olarak 1.2 atm basınç altında 121 ºC'de 1 saat süreyle otoklav işlemi uygulanır. Son olarak biyolojik atık sistemine gönderilir veya fosseptik çukurlara gömülür.

TİCARİ TAKDİM ŞEKİLLERİ
Karton kutu içerisinde, 50 dozluk liyofilize aşılar 5 ml, 100 dozluk liyofilize aşılar 10 ml ve 200 dozluk liyofilize aşılar 20 ml sulandırma sıvısı ile birlikte ambalajlanmıştır. Liyofilize kısım için Tip I 4R cam şişe, sulandırma sıvısı şişeleri 5 ml için Tip I 8R cam şişe, 10 ml için Tip I 10R cam şişe, 20 ml için Tip I 20R cam şişeler kullanılmıştır. Şişelerin ağzı butil plastikten yapılmış tıpalar ve alüminyum kapaklar ile kapatılmıştır. Liyofilize aşı ve sulandırma sıvısı içeren aşılar münferit karton kutularda prospektüs, damlalık ile birlikte ambalajlanmış şekilde piyasaya sunulmaktadır.

PROSPEKTÜSÜN ONAY TARİHİ: 09.03.2026

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİHİ:10.11.2004

PAZARLAMA İZİN SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ:
Vetal Hayvan Sağlığı Ürünleri A.Ş.
Petrol Mah. 14.Cad. No:1 Organize Sanayi Bölgesi
Adıyaman /TÜRKİYE
Telefon : +90 416 223 20 30
Faks : +90 416 223 14 56
e-mail: vetal@vetal.com.tr
web: www.vetal.com.tr

ÜRETİCİ FİRMA ADI VE ADRESİ:
Vetal Hayvan Sağlığı Ürünleri A.Ş.
Petrol Mah. 14.Cad. No:1 Organize Sanayi Bölgesi
Adıyaman /TÜRKİYE
Telefon : +90 416 223 20 30
Faks : +90 416 223 14 56
e-mail: vetal@vetal.com.tr
web: www.vetal.com.tr

İÇ AMBALAJ ETİKETİ

LİYOFİLİZAT ETİKET BİLGİLERİ **50, 100, 200 doz**

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır
DERMAVAC
Enjeksiyonluk Çözelti Liyofilizatı
Kuzu ve Oğlakların Ektima Virüsü Aşısı

DERMAVAC Aşısı; kuzu ve oğlakların Ektima hastalığına karşı koruyucu amaçla kullanılır.

1 doz aşı ≥ $10^{2,9}$ $TCID_{50}$ koyun- keçi ektima virüsü ve yardımcı madde olarak 0,25 mg Laktalbumin hidrolizat ve 0,5 mg Sükroz içerir.

Kullanım Şekli ve Dozu:
Kuzu ve oğlak : 0,1 ml (2 damla) (S.C)

Muhafaza Şartları ve Raf ömrü:
Liyofilize aşı; 2 – 8 °C'de saklanmalıdır ve güneş ışığından korunmalıdır.
Dondurulmamalıdır.
Satışa sunulmuş haliyle raf ömrü: 24 ay
Sulandırılan aşının raf ömrü: 6 saat

Gıda Değeri Olan Hayvanlarda Kalıntı Uyarıları:
Gıda değeri olan hayvanlarda yasal arınma süresi 14 gündür.

Çocukların ulaşamayacağı yerde bulundurunuz.
Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.
Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz.

T.C. Tarım Ve Orman Bakanlığı Pazarlama İzni Tarihi: 10.11.2004
Seri No:
Ü.R.T. :
S.K.T.:

Pazarlama İzin Sahibi/Üretici Firma Adı ve Adresi:
Vetal Hayvan Sağlığı Ürünleri A.Ş.
Petrolosb Mah.14.Cad. No:1/1 Adıyaman /TÜRKİYE
Telefon : +90 416 223 20 30 / Faks : +90 416 223 14 56
e-mail : vetal@vetal.com.tr / web : www.vetal.com.tr

İÇ AMBALAJ ETİKETİ

SULANDIRMA SIVISI ETİKET BİLGİLERİ **5, 10, 20 ml**

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır
DERMAVAC
Kuzu ve Oğlakların Ektima Virüsü Aşısı Sulandırma Sıvısı

DERMAVAC Aşısı; kuzu ve oğlakların Ektima hastalığına karşı koruyucu amaçla kullanılır.

Karanlık ve kuru bir yerde, 25 °C'nin altında buzdolabına konulmadan, dondurulmadan muhafaza edilmelidir.
Raf ömrü: 24 ay

Çocukların ulaşamayacağı yerde bulundurunuz.
Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.
Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz.

T.C. Tarım Ve Orman Bakanlığı Pazarlama İzni Tarihi: 10.11.2004
Seri No:
Ü.R.T. :
S.K.T.:

Pazarlama İzin Sahibi/Üretici Firma Adı ve Adresi:
Vetal Hayvan Sağlığı Ürünleri A.Ş.
Petrolosb Mah.14.Cad. No:1/1 Adıyaman /TÜRKİYE
Telefon : +90 416 223 20 30 / Faks : +90 416 223 14 56
e-mail : vetal@vetal.com.tr / web : www.vetal.com.tr

DIŞ AMBALAJ ETİKETİ (Tüm ambalaj formları için)

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır
DERMAVAC
Enjeksiyonluk Çözelti Liyofilizatı ve Sulandırıcısı
Kuzu ve Oğlakların Ektima Virüsü Aşısı

DERMAVAC Aşısı; kuzu ve oğlakların Ektima hastalığına karşı koruyucu amaçla kullanılır.

1 doz aşı $\geq 10^{2,9}$ $TCID_{50}$ koyun- keçi ektima virüsü ve yardımcı madde olarak 0,25 mg Laktalbumin hidrolizat ve 0,5 mg Sükroz içerir.

Kullanım Şekli ve Dozu:
Kuzu ve oğlak : 0,1 ml (2 damla) (S.C)

Muhafaza Şartları ve Raf ömrü:
Liyofilize aşı; 2 – 8 °C'de saklanmalıdır ve güneş ışığından korunmalıdır. Dondurulmamalıdır. Sulandırıcı, karanlık ve kuru bir yerde, 25 °C'nin altında buzdolabına konulmadan, dondurulmadan muhafaza edilmelidir.
Satışa sunulmuş haliyle raf ömrü: 24 ay
Sulandırma sıvısının raf ömrü: 24 ay
Sulandırılan aşının raf ömrü: 6 saat

Gıda Değeri Olan Hayvanlarda Kalıntı Uyarıları:
Gıda değeri olan hayvanlarda yasal arınma süresi 14 gündür.

Kullanım Sonu İmha ve Hedef Olmayan Türler İçin Uyarılar:
Kullanılmış veya arta kalan ürün ilgili mevzuata göre imha edilmelidir. İmha işlemi iki aşamada gerçekleşir. İlk olarak 1.2 atm basınç altında 121 ºC'de 1 saat süreyle otoklav işlemi uygulanır. Son olarak biyolojik atık sistemine gönderilir veya fosseptik çukurlara gömülür.

Çocukların ulaşamayacağı yerde bulundurunuz.
Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.
Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz.

T.C. Tarım Ve Orman Bakanlığı Pazarlama İzni Tarihi: 10.11.2004
Seri No:
Ü.R.T. :
S.K.T.:

KDV Dahil Perakende Satış Fiyatı:

Pazarlama İzin Sahibi/Üretici Firma Adı ve Adresi:
Vetal Hayvan Sağlığı Ürünleri A.Ş.
Petrolosb Mah.14.Cad. No:1/1 Adıyaman /TÜRKİYE
Telefon : +90 416 223 20 30 / Faks : +90 416 223 14 56
e-mail : vetal@vetal.com.tr / web : www.vetal.com.tr