ÜRÜN ÖZELLİKLERİ ÖZETİ

1. VETERİNER TIBBİ ÜRÜNÜN İSMİ
HEMOPAST RESPİ 6 Enjeksiyonluk Süspansiyon

2.KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM
1 doz (2 ml) aşıda;

Aktif maddeler:

Pasteurella multocida tip I anakültür	≥%35 PP*	
Mannheimia haemolytica A1 anakültür+leukotoksoid	≥%61 PP	≥1,9 Eİ**
Mannheimia haemolytica A2 anakültür+leukotoksoid	≥%66 PP	≥1,9 Eİ
Mannheimia haemolytica A7 anakültür+leukotoksoid	≥%48 PP	≥1,9 Eİ
Bibersteinia trehalosi T10 anakültür+leukotoksoid	≥%34 PP	≥1,9 Eİ
Histophylus somni anakültür	Tavşan serumlarında ≥ 3,4 Log2 MAT titresi***	

21-28 gün ara ile 2 ml Hemopast Respi 6 ile iki kez SC uygulama yapılan tavşandan ikinci uygulamadan 14 gün sonra alınan kan örneklerinde *PP(Yüzde pozitif) ve ** Eİ(Elisa İndexi).
*** En az 10 aşılanmış tavşanın tamamında Log2 MAT >2 koşulu ile ortalama log2 MAT > 3,4

Adjuvant:
Alüminyum hidroksit jel : 400 mg
Koruyucu:
Fenol E 232 : 4,8 mg

Yardımcı maddeler:
Tüm yardımcı maddeler için Bölüm 6.1'e bakınız

3. FARMASÖTİK ŞEKİL
Pembemsi-kırmızı renkli homojen enjeksiyonluk süspansiyon

4. KLİNİK ÖZELLİKLER
4.1. Hedef tür
Sığır, koyun ve keçi

4.2. Her bir hedef tür için kullanım alanı
HEMOPAST RESPİ 6, sığır, koyun ve keçilerde *pasterellozis veya mannheimiozisten* kaynaklanan hemorajik septisemi, pneumoni ve enzootik pneumoni ile sığırlarda *histofilozis* kaynaklı solunum yolu enfeksiyonlarının ve mortalitenin önlenmesi/azaltılması amacıyla kullanılır. İkinci aşılamadan 14 gün sonra bağışıklık başlar, en az 6 ay süreyle devam eder.

4.3. Kontrendikasyonlar
Bilinen bir kontrendikasyonu bulunmamaktadır.

4.4. Her bir hedef tür için özel uyarılar
Aşı sadece sağlıklı hayvanlara uygulanmalıdır. Yoğun stres ve kötü bakım besleme koşulları aşıdan beklenen bağışıklık yanıtının oluşmasını engelleyebilir. Maternal antikorlar nedeniyle iki aylıktan küçük hayvanların aşılaması önerilmez.

4.5. Kullanıma ilişkin özel uyarılar

(i) Hayvanlarda kullanımına ilişkin özel uyarılar

Aşılar kullanmadan önce ve kullanım sırasında çalkalanmalıdır. Aşılama asepsi ve antisepsi kurallarına uygun gerçekleştirilmelidir. Aşılamada steril enjektör ve iğneler kullanılmalıdır. Enjeksiyon bölgesinin temiz ve kuru olmasına özen gösterilmelidir. Kontaminasyon riskinden kaçınılmadığı takdirde aşılamaya bağlı apseleşmeler gelişebileceği göz önünde tutulmalıdır. Uygun koşullarda muhafaza edilmemiş, soğuk zinciri bozulmuş ve çalkalandığında homojen bir görünüm oluşturmayan aşılar kullanılmamalıdır.

(ii) Ürünü uygulayana ilişkin özel uyarılar

Aşı uygulamaları sadece Veteriner Hekim veya Veteriner Hekim gözetimindeki teknisyenler tarafından yapılır. Aşı inaktif olup, insanlar için patojen değildir. Bununla birlikte; uygulama sırasında koruyucu ekipmanlar (önlük, eldiven gibi) kullanılmalıdır. İyi hekimlik uygulamaları gereğince aşılama sırasında cilt, göz ve giysilerin aşı materyali ile temasından kaçınılmalıdır. Aşı uygulayan veya hayvan zaptında görev yapan kişilerin yaralanması veya kazara kendine enjeksiyon sonrası en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.

(iii) Diğer uyarılar

4.6 İstenmeyen etkiler (sıklık ve şiddet)

Aşılama sonrası vücut sıcaklığında kısa süreli bir artış ile enjeksiyon yerinde 1-2 hafta içinde gerileyen, sert veya yumuşak karakterli, ince kabuklanmalar yapan şişliklerin (sığırlarda 5cm'yi, koyun ve keçilerde 2 cm'yi geçmeyen çapta) oluşması normal aşı reaksiyonu olarak kabul edilir. Ender (seyrek) durumlarda aşırı duyarlı hayvanlarda bireysel olarak hipersensitivite reaksiyonları görülebilir. Bu durumda antiallerjik, adrenerjik ve antihistaminik preparatların kullanımı önerilir.

4.7 Gebelik, laktasyon ve yumurtlama döneminde kullanım

Gebe hayvanlarda kullanımında bir sakınca bulunmamaktadır. Aşı laktasyondaki hayvanlarda kullanılabilir.

4.8 Diğer tıbbi ürünlerle etkileşim ve diğer etkileşim şekilleri

Bu ürünün diğer aşılarla birlikte kullanıldığında geçimliliği hakkında bilgi bulunmamaktadır. Diğer ürünlerle birlikte kullanılmamalıdır.

4.9 Dozaj ve kullanım yolu

Aşı sığırlarda boyunun son 1/3'üne, koyun ve keçilere ise koltuk altı kılsız ve hareketsiz bölgeye derialtı (SC) ve kas içi (IM) yolla uygulanır. Doz sığırlarda 4 ml, koyun ve keçilerde 2 ml'dir. Aşılamadan 21 gün sonra aynı dozlarda ikinci aşılama yapılır. Hastalığın yaygın olduğu bölgelerde altı ay sonra yeni bir aşılama önerilir.

	Birinci Aşılama	*İkinci Aşılama*	*Tekrar Aşılama*
Sığır	4 ml SC-IM	4 ml SC- IM	6 ay sonra 4 ml SC-IM
Koyun ve Keçi	2 ml SC- IM	2 ml SC- IM	6 ay sonra 2 ml SC-IM

4.10. Doz aşımı, varsa semptomlar, acil prosedürler, antidotlar (gerekli ise)

İnaktif bir ürün olması nedeniyle doz aşımı çalışması yapılmamıştır. Ürünün primer aşılama rejimine göre 2 tekrarlı uygulanması güvenlidir.

4.11. Kalıntı arınma süresi (sıfır gün olanlar da dahil)
Sıfır (0) gündür.

5. İMMUNOLOJİK ÖZELLİKLER

Farmakoterapötik grup Sığır, koyun ve keçilerde inaktif bakteriyel aşı
ATCvet Code: QI02AB (Sığırlarda inaktif bakteriyel aşılar), QI04AB (Koyunlarda inaktif bakteriyel aşılar), QI03AB (Keçilerde inaktif bakteriyel aşılar)
Hemopast Respi 6 Aşısı, *Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica A1, Mannheimia haemolytica A2, Mannheimia haemolytica A7, Bibersteinia trehalosi T10 ve Histophylus somni* enfeksiyonlarına karşı aktif bağışıklık sağlamak için koruyucu antikor yanıt oluşumunu uyarır.

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1. Yardımcı maddeler
Alüminyum hidroksit
Fenol
Formaldehit
Enjeksiyonluk su

6.2. Geçimsizlikler
Herhangi bir tıbbi ürünle karıştırılmamalıdır.

6.3. Raf ömrü
Ürünün satışa sunulmuş hali ile raf ömrü: 24 ay
İç ambalajın ilk açıldıktan sonraki raf ömrü: 6- 8 saat

6.4. Muhafaza şartları
Hemopast Respi 6 aşısı, +2/+8 °C'de muhafaza edilir. Direkt güneş ışığından korunmalıdır. Dondurulmamalıdır.

6.5 Birincil ambalajın niteliği ve kompozisyonu
Hemopast Respi 6 aşısı, karton kutularda 20, 50, 100 ve 250 ml'lik polipropilen plastik şişelerde veya kutusuz olarak çoklu strafor viyollerde prospektüs ilave edilmiş olarak ambalajlanmıştır. Şişeler bütil plastikten yapılmış tıpa ve alüminyum kapakla kapatılmıştır. Tüm ambalajlar pazara sunulmayabilir.

6.6. Kullanılmış veya arta kalan ürünlerin imhasına ilişkin özel önlemler
Kullanılmış veya artakalan ürün ilgili mevzuata göre imha edilmelidir.

7.PAZARLAMA İZİN SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ

VETAL Hayvan Sağlığı Ürünleri A.Ş.
Adres : Petrolosb Mah. 14. Cad.No.1/1 Adıyaman/TÜRKİYE
E-mail: vetal@vetal.com.tr

8.PAZARLAMA İZNİ NUMARASI

---

9. PAZARLAMA İZNİNİN İLK VERİLME VEYA YENİLEME TARİHİ

10.11.2026

10. METİN DEĞİŞİKLİK TARİHİ

PROSPEKTÜS

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır

HEMOPAST RESPİ 6

Enjeksiyonluk Süspansiyon

İnaktif Pasterelloz/Mannheimioz ve Histofiloz Aşısı

BİLEŞİMİ

1 doz (2 ml) aşıda;

Aktif maddeler:

Pasteurella multocida tip I anakültür	≥%35 PP*	
Mannheimia haemolytica A1 anakültür+leukotoksoid	≥%61 PP	≥1,9 Eİ**
Mannheimia haemolytica A2 anakültür+leukotoksoid	≥%66 PP	≥1,9 Eİ
Mannheimia haemolytica A7 anakültür+leukotoksoid	≥%48 PP	≥1,9 Eİ
Bibersteinia trehalosi T10 anakültür+leukotoksoid	≥%34 PP	≥1,9 Eİ
Histophylus somni anakültür	Tavşan serumlarında ≥ 3,4 Log2 MAT titresi***	

21-28 gün ara ile 2 ml Hemopast Respi 6 ile iki kez SC uygulama yapılan tavşandan ikinci uygulamadan 14 gün sonra alınan kan örneklerinde *PP(Yüzde pozitif) ve ** Eİ(Elisa İndexi).

*** En az 10 aşılanmış tavşanın tamamında Log2 MAT >2 koşulu ile ortalama log2 MAT > 3,4

Adjuvant:

Alüminyum hidroksit jel : 400 mg

Yardımcı maddeler:

Fenol (Koruyucu) : 4,8 mg

İMMUNOLOJİK ÖZELLİKLER

Farmakoterapötik grup Sığır, koyun ve keçilerde inaktif bakteriyel aşı

ATCvet Code: QI02AB (Sığırlarda inaktif bakteriyel aşılar), QI04AB (Koyunlarda inaktif bakteriyel aşılar), QI03AB (Keçilerde inaktif bakteriyel aşılar)

Hemopast Respi 6 Aşısı, *Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica A1, Mannheimia haemolytica A2, Mannheimia haemolytica A7, Bibersteinia trehalosi T10 ve Histophylus somni* enfeksiyonlarına karşı aktif bağışıklık sağlamak için koruyucu antikor yanıt oluşumunu uyarır.

KULLANIM SAHASI/ ENDİKASYONLAR

HEMOPAST RESPİ 6, sığır, koyun ve keçilerde *pasterellozis veya mannheimiozisten* kaynaklanan hemorajik septisemi, pneumoni ve enzootik pneumoni ile sığırlarda *histofilozis* kaynaklı solunum yolu enfeksiyonlarının ve mortalitenin önlenmesi/azaltılması amacıyla kullanılır. İkinci aşılamadan 14 gün sonra bağışıklık başlar, en az 6 ay süreyle devam eder.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Aşı sığırlarda boyunun son 1/3'üne, koyun ve keçilere ise koltuk altı kılsız ve hareketsiz bölgeye derialtı (SC) ve kas içi (IM) yolla uygulanır. Doz sığırlarda 4 ml, koyun ve keçilerde 2 ml'dir. Aşılamadan 21 gün sonra aynı dozlarda ikinci aşılama yapılır. Hastalığın yaygın olduğu bölgelerde altı ay sonra yeni bir aşılama önerilir.

	Birinci Aşılama	*İkinci Aşılama*	*Tekrar Aşılama*
Sığır	4 ml SC-IM	4 ml SC- IM	6 ay sonra 4 ml SC-IM
Koyun ve Keçi	2 ml SC- IM	2 ml SC- IM	6 ay sonra 2 ml SC-IM

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL UYARILAR

Aşı sadece sağlıklı hayvanlara uygulanmalıdır. Yoğun stres ve kötü bakım besleme koşulları aşıdan beklenen bağışıklık yanıtının oluşmasını engelleyebilir. Maternal antikorlar nedeniyle iki aylıktan küçük hayvanların aşılaması önerilmez. Aşılar kullanmadan önce ve kullanım sırasında çalkalanmalıdır. Aşılama asepsi ve antisepsi kurallarına uygun gerçekleştirilmelidir. Aşılamada steril enjektör ve iğneler kullanılmalıdır. Enjeksiyon bölgesinin temiz ve kuru olmasına özen gösterilmelidir. Kontaminasyon riskinden kaçınılmadığı takdirde aşılamaya bağlı apseleşmeler gelişebileceği göz önünde tutulmalıdır. Uygun koşullarda muhafaza edilmemiş, soğuk zinciri bozulmuş ve çalkalandığında homojen bir görünüm oluşturmayan aşılar kullanılmamalıdır.

Gebelik ve Laktasyon Döneminde Kullanım

Gebe hayvanlarda kullanımında bir sakınca bulunmamaktadır. Aşı laktasyondaki hayvanlarda kullanılabilir.

İSTENMEYEN ETKİLER

Aşılama sonrası vücut sıcaklığında kısa süreli bir artış ile enjeksiyon yerinde 1-2 hafta içinde gerileyen, sert veya yumuşak karakterli, ince kabuklanmalar yapan şişliklerin (sığırlarda 5 cm'yi, koyun ve keçilerde 2 cm'yi geçmeyen çapta) oluşması normal aşı reaksiyonu olarak kabul edilir. Ender (seyrek) durumlarda aşırı duyarlı hayvanlarda bireysel olarak hipersensitivite reaksiyonları görülebilir. Bu durumda antiallerjik, adrenerjik ve antihistaminik preparatların kullanımı önerilir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Bu ürünün diğer aşılarla birlikte kullanıldığında geçimliliği hakkında bilgi bulunmamaktadır. Diğer ürünlerle birlikte kullanılmamalıdır

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT

İnaktif bir ürün olması nedeniyle doz aşımı çalışması yapılmamıştır. Ürünün primer aşılama rejimine göre 2 tekrarlı uygulanması güvenlidir.

GIDA DEĞERİ OLAN HAYVANLARDA KALINTI UYARILARI

Sıfır (0) gün.

KONTRENDİKASYONLAR

Bilinen bir kontrendikasyonu bulunmamaktadır.

GENEL UYARILAR

Çocukların ulaşamayacağı yerde bulundurunuz.
Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN ÖNERİLER

Aşı uygulamaları sadece Veteriner Hekim veya Veteriner Hekim gözetimindeki teknisyenler tarafından yapılır. Aşı inaktif olup, insanlar için patojen değildir. Bununla birlikte; uygulama sırasında koruyucu ekipmanlar (önlük, eldiven gibi) kullanılmalıdır. İyi hekimlik uygulamaları

gereğince aşılama sırasında cilt, göz ve giysilerin aşı materyali ile temasından kaçınılmalıdır. Aşı uygulayan veya hayvan zaptında görev yapan kişilerin yaralanması veya kazara kendine enjeksiyon sonrası en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ
Hemopast Respi 6 Aşısı; +2/+8°C'de muhafaza edilir. Direkt güneş ışığından korunmalıdır. Dondurulmamalıdır.
Ürünün satışa sunulmuş hali ile raf ömrü: 24 ay
İç ambalajın ilk açıldıktan sonraki raf ömrü: 6- 8 saat

KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR
Kullanılmış veya artakalan ürün ilgili mevzuata göre imha edilmelidir.

TİCARİ TAKDİM ŞEKİLLERİ
Hemopast Respi 6 aşısı, karton kutularda 20, 50, 100 ve 250 ml'lik polipropilen plastik şişelerde veya kutusuz olarak çoklu strafor viyollerde prospektüs ilave edilmiş olarak ambalajlanmıştır. Şişeler bütil plastikten yapılmış tıpa ve alüminyum kapakla kapatılmıştır. Tüm ambalajlar pazara sunulmayabilir.

PROSPEKTÜSÜN ONAY TARİHİ: 10.11.2026

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİHİ:10.11.2026

PAZARLAMA İZİN SAHİBİ / ÜRETİCİ FİRMA ADI VE ADRESİ:
Vetal Hayvan Sağlığı Ürünleri A.Ş.
Petrol Mah. 14.Cad. No:1 Organize Sanayi Bölgesi
Adıyaman /TÜRKİYE Telefon : +90 416 223 20 30 Faks : +90 416 223 14 56
e-mail: vetal@vetal.com.tr web: www.vetal.com.tr

İÇ AMBALAJ ETİKETİ
20-50-100-250 ml

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır.
HEMOPAST RESPİ 6
Enjeksiyonluk Süspansiyon
İnaktif Pasterelloz/Mannheimioz ve Histofiloz Aşısı

Bileşimi:1 doz (2 ml) aşıda;

Aktif madde:

Pasteurella multocida tip I anakültür	≥%35 PP*	
Mannheimia haemolytica A1 anakültür+leukotoksoid	≥%61 PP	≥1,9 Eİ**
Mannheimia haemolytica A2 anakültür+leukotoksoid	≥%66 PP	≥1,9 Eİ
Mannheimia haemolytica A7 anakültür+leukotoksoid	≥%48 PP	≥1,9 Eİ
Bibersteinia trehalosi T10 anakültür+leukotoksoid	≥%34 PP	≥1,9 Eİ
Histophylus somni anakültür	Tavşan serumlarında ≥ 3,4 Log2 MAT titresi***	

21-28 gün ara ile 2 ml Hemopast Respi 6 ile iki kez SC uygulama yapılan tavşandan ikinci uygulamadan 14 gün sonra alınan kan örneklerinde *PP(Yüzde pozitif) ve ** Eİ(Elisa İndexi).

*** En az 10 aşılanmış tavşanın tamamında Log2 MAT >2 koşulu ile ortalama log2 MAT > 3,4

Deri altı (SC) ve kas içi (IM) yolla, sığırlarda 4 ml, koyun ve keçilerde 2 ml uygulanır. Aşılamadan 21 gün sonra aynı dozlarda ikinci aşılama yapılır. Hastalığın yaygın olduğu bölgelerde altı ay sonra yeni bir aşılama önerilir.

+2/+8°C'de muhafaza edilir. Direkt güneş ışığından korunmalıdır. Dondurulmamalıdır.
Ürünün satışa sunulmuş hali ile raf ömrü: 24 ay.
İç ambalajın ilk açıldıktan sonraki raf ömrü: 6- 8 saat

Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz.
Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.
Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz.

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİHİ: 10.11.2026

PAZARLAMA İZİN SAHİBİ / ÜRETİCİ FİRMA ADI VE ADRESİ:
Vetal Hayvan Sağlığı Ürünleri A.Ş.
Petrol Mah. 14.Cad. No:1 Organize Sanayi Bölgesi
Adıyaman /TÜRKİYE Telefon : +90 416 223 20 30 Faks : +90 416 223 14 56
e-mail: vetal@vetal.com.tr
Seri No:
Ü.R.T.:
S.K.T.:

DIŞ AMBALAJ ETİKETİ
Tüm ambalaj formları için

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır.

HEMOPAST RESPİ 6

Enjeksiyonluk Süspansiyon

İnaktif Pasterelloz/Mannheimioz ve Histofiloz Aşısı

Bileşimi 1 doz (2 ml) aşıda;
Aktif madde:

Pasteurella multocida tip I anakültür	≥%35 PP*	
Mannheimia haemolytica A1 anakültür+leukotoksoid	≥%61 PP	≥1,9 Eİ**
Mannheimia haemolytica A2 anakültür+leukotoksoid	≥%66 PP	≥1,9 Eİ
Mannheimia haemolytica A7 anakültür+leukotoksoid	≥%48 PP	≥1,9 Eİ
Bibersteinia trehalosi T10 anakültür+leukotoksoid	≥%34 PP	≥1,9 Eİ
Histophylus somni anakültür	Tavşan serumlarında ≥ 3,4 Log2 MAT titresi***	

21-28gün ara ile 2 ml Hemopast Respi 6 ile iki kez SC uygulama yapılan tavşandan ikinci uygulamadan 14 gün sonra alınan kan örneklerinde *PP(Yüzde pozitif) ve ** Eİ(Elisa İndexi).
*** En az 10 aşılanmış tavşanın tamamında Log2 MAT >2 koşulu ile ortalama log2 MAT > 3,4

Adjuvant: Alüminyum hidroksit jel : 400 mg

Yardımcı madde: Fenol (Koruyucu): 4,8 mg

Kullanım Şekli ve Dozu:
Deri altı (SC) ve kas içi (IM) yolla, sığırlarda 4 ml, koyun ve keçilerde 2 ml uygulanır. Aşılamadan 21 gün sonra aynı dozlarda ikinci aşılama yapılır. Hastalığın yaygın olduğu bölgelerde altı ay sonra yeni bir aşılama önerilir.

Gıda Değeri Olan Hayvanlarda Kalıntı Uyarıları:
Sıfır (0) gün.

Muhafaza Şartları ve Raf Ömrü:
Hemopast Respi 6 Aşısı; +2/+8°C'de muhafaza edilir. Direkt güneş ışığından korunmalıdır. Dondurulmamalıdır. Ürünün satışa sunulmuş hali ile raf ömrü: 24 ay.
İç ambalajın ilk açıldıktan sonraki raf ömrü: 6- 8 saat

Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz.
Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.
Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz.
Kullanılmış veya artakalan ürün ilgili mevzuata göre imha edilmelidir.

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİHİ: 10.11.2026

PAZARLAMA İZİN SAHİBİ / ÜRETİCİ FİRMA ADI VE ADRESİ:
Vetal Hayvan Sağlığı Ürünleri A.Ş.
Petrol Mah. 14.Cad. No:1 Organize Sanayi Bölgesi
Adıyaman /TÜRKİYE Telefon : +90 416 223 20 30 Faks : +90 416 223 14 56
e-mail: vetal@vetal.com.tr web: www.vetal.com.tr
Seri No:
Ü.R.T.:
S.K.T.:
Perakende satış fiyatı:
(KDV dahil)