ÜRÜN ÖZELLİKLERİ ÖZETİ

1. VETERİNER TIBBİ ÜRÜNÜN İSMİ
HIPRAVIAR BPL2
Enjeksiyonluk emülsiyon

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM
Doz başına(0,5 ml) içerik:
Aktif madde:
İnaktif Newcastle Hastalığı Virüsü, La Sota suşu …….. IHA ≥ 1/16 (*)
(*)IHA = hemaglutinasyon inhibisyon sonucu elde edilen antikor

Adjuvant:
Sıvı parafin……...224,5 mg

Yardımcı madde:
Tiyomersal……0,05 mg
Yardımcı maddelerin tam listesi için Kısım 6.1'e bakınız.

3. FARMASÖTİK ŞEKİL
Enjeksiyonluk emülsiyon

4. KLİNİK ÖZELLİKLER
4.1 Hedef tür
Broiler, yumurtacı ve damızlık yarkalar

4.2 Her bir hedef tür için kullanım alanı:
Broiler, yumurtacı ve damızlık yarkalarda Newcastle Hastalığının önlenmesi.

4.3 Kontrendikasyonlar:
Bulunmamaktadır.

4.4 Her bir hedef tür için özel uyarılar
Sadece sağlıklı hayvanları aşılayınız.

4.5 Kullanıma ilişkin özel uyarılar
(i) Hayvanlarda Kullanıma İlişkin Özel Uyarılar
Deri altı yolla uygulama doğru yapılmaz ve intradermal yolla uygulanırsa olumlu seyir gösteren bölgesel ödem oluşabilir.

(ii) Ürünü Uygulayana İlişkin Özel Uyarılar
Uygulayıcı için:
Bu ürün mineral yağ içerir. Kazara kendi kendine enjeksiyon, özellikle bir eklem veya parmağa enjekte edilirse şiddetli ağrı ve şişmeye neden olabilir ve acilen tıbbi yardım sağlanmazsa bazen etkilenen parmağın kaybıyla sonuçlanabilir.
Bu ürünü yanlışlıkla enjekte ederseniz, çok küçük bir miktar enjekte etmiş olsanız bile acilen tıbbi yardım alın ve prospektüsü hekiminize gösteriniz. Tıbbi muayeneden sonra ağrı 12 saatten fazla devam ederse, tekrar tıbbi yardım alınız.

Doktorlar için:
Bu ürün mineral yağ içerir. Az miktarda enjekte edilmiş olsa bile, bu ürünün kazara enjekte edilmesi, iskemik nekroza ve hatta parmağın kaybına yol açabilecek ciddi enflamasyona neden olabilir. DERHAL uzman tıbbi müdahale gereklidir ve özellikle parmak ucu veya tendon etkilenmişse erken insizyon ve irrigasyon gerekli olabilir.

4.6 İstenmeyen etkiler (sıklığı ve şiddet)
Yok.

4.7 Gebelik, laktasyon ve yumurtlama döneminde kullanım
Yumurtlama döneminde kullanılabilir.

4.8 Diğer tıbbi ürünlerle etkileşim ve diğer etkileşim şekilleri
Aşının diğer veteriner tıbbi ürünler ile kullanıldığındaki güvenlik ve etkinliğine ilişkin bilgi bulunmamaktadır. Aşının herhangi diğer veteriner tıbbi üründen önce veya sonra uygulaması kararı vakaya göre verilmelidir.

4.9 Dozaj ve kullanım yolu
0,5 ml/hayvan dozunda, kas içi (IM) yolla göğüs kasına veya deri altı (SC) yolla boynun arka bölgesine uygulanır.

Newcastle hastalığına karşı önerilen aşılama programı:

Broiler:
İlk hafta Newcastle hastalığına karşı canlı aşı uygulayınız.
3-5 haftalıkken yeniden Newcastle hastalığına karşı canlı veya inaktif aşı uygulayınız.

Yumurtacı ve Damızlık Yarkalar:
İlk hafta Newcastle hastalığına karşı canlı aşı uygulayınız.
3-5 haftalıkken yeniden canlı veya inaktif aşı uygulayınız.
3 aylıkken yeniden canlı veya inaktif aşı uygulayınız.
5 aylıkken (yumurtlama dönemi başında) inaktif aşı uygulayınız.

Kullanmadan önce çalkalayınız.
Aşıyı +15 - + 25 ºC'de uygulayınız.

4.10 Doz aşımı, varsa semptomlar, acil prosedürler, antidotlar (gerekli ise)
İki dozdan fazla aşı uygulanması, nadir durumlarda, birkaç gün devam eden küçük bir nodülün ortaya çıkmasına neden olabilir.

4.11 Kalıntı arınma süreleri (sıfır gün olanlar da dahil)
Sıfır gün.

5. İMMÜNOLOJİK ÖZELLİKLER
ATCvet kodu: QI01AA02
Farmakoterapötik grup: Kanatlılar için inaktif viral aşılar, Newcastle Hastalığı virüsü.

Broilerlerde, yumurtacılarda ve damızlıklarda Newcastle hastalığına karşı aktif bağışıklığı uyarmak için.

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1 Yardımcı Maddeler

Sıvı parafin
Tiyomersal
Polisorbat 80
Sorbitan monooleat
Makrogol oleat
Enjeksiyonluk su

6.2 Geçimsizlikler

Diğer veteriner tıbbi ürünler ile karıştırmayınız.

6.3 Raf ömrü

Satış için ambalajlı veteriner tıbbi ürünün raf ömrü: 24 ay.
Primer ambalaj açıldıktan sonra raf ömrü: Hemen kullanınız.

6.4. Muhafaza şartları

2 °C – 8 ºC'de muhafaza ediniz. Dondurmayınız. Güneş ışığından koruyunuz.

6.5 Birincil ambalajın niteliği ve kompozisyonu:

1000 doz (500 ml) ürün içeren yüksek yoğunluklu polietilen plastik şişeler, tip I polimerik elastomer tıpalar ve alüminyum kapaklarla kapatılır.

6.6 Kullanılmış veya arta kalan ürünün imhasına ilişkin özel önlemler

Kullanılmış veya arta kalan ürün ilgili mevzuata göre imha edilmelidir.

7. PAZARLAMA İZİN SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ

HIPRA VETERİNER MÜSTAHZARLARI TİC. LTD. ŞTİ.
Y. Dudullu Mh. Necip Fazıl Bulvarı KEYAP Çarşı Sit. B 2 Blok, No:44/29 Ümraniye/İSTANBUL
Tel: (216) 526 60 00

8. PAZARLAMA İZNİ NUMARASI: 24.03.2011

9. PAZARLAMA İZNİ İLK VERİLME VEYA YENİLEME TARİHİ : 24.03.2011

10. METİN DEĞİŞİKLİK TARİHİ: 28.07.2025

PROSPEKTÜS

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır

HIPRAVIAR BPL2
Enjeksiyonluk Emülsiyon
Newcastle Hastalığına Karşı İnaktif Aşı

BİLEŞİMİ
Doz başına(0,5 ml) içerik:
İnaktif Newcastle Hastalığı Virüsü, La Sota suşu …….. IHA ≥ 1/16 (*)
(*)IHA = hemaglutinasyon inhibisyon sonucu elde edilen antikor

Adjuvant:
Sıvı parafin……...224,5 mg

Yardımcı madde:
Tiyomersal……0,05 mg

KULLANIM SAHASI/ENDİKASYONLAR
Broiler, yumurtacı ve damızlık yarkalarda Newcastle Hastalığının önlenmesi.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
0,5 ml/hayvan dozunda kas içi (IM) olarak göğüs kasına veya deri altı (SC) yolla boynun arka bölgesine uygulanır.

Newcastle hastalığına karşı önerilen aşılama programı:

Broiler:
İlk hafta Newcastle hastalığına karşı canlı aşı uygulayınız.
3-5 haftalıkken yeniden Newcastle hastalığına karşı canlı veya inaktif aşı uygulayınız.

Yumurtacı ve Damızlık Yarkalar:
İlk hafta Newcastle hastalığına karşı canlı aşı uygulayınız.
3-5 haftalıkken yeniden canlı veya inaktif aşı uygulayınız.
3 aylıkken yeniden canlı veya inaktif aşı uygulayınız.
5 aylıkken (yumurtlama dönemi başında) inaktif aşı uygulayınız.

Kullanmadan önce çalkalayınız.
Aşıyı +15 - + 25 ºC'de uygulayınız.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL UYARILAR
Sadece sağlıklı hayvanları aşılayınız.
Deri altı yolla uygulama doğru yapılmaz ve intradermal yolla uygulanırsa olumlu seyir gösteren bölgesel ödem oluşabilir.

Gebelik, Laktasyon ve Yumurtlama Döneminde Kullanım
Yumurtlama döneminde kullanılabilir.

İSTENMEYEN ETKİLER
Yok.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ
Aşının diğer veteriner tıbbi ürünler ile kullanıldığındaki güvenlik ve etkinliğine ilişkin bilgi bulunmamaktadır. Aşının herhangi diğer veteriner tıbbi üründen önce veya sonra uygulaması kararı vakaya göre verilmelidir. Diğer veteriner tıbbi ürünlerle karıştırmayınız.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER, ANTİDOT
İki dozdan fazla aşı uygulanması, nadir durumlarda, birkaç gün devam eden küçük bir nodülün ortaya çıkmasına neden olabilir.

GIDA DEĞERİ OLAN HAYVANLARDA KALINTI UYARILARI
Sıfır gün.

KONTRENDİKASYONLAR:
Bulunmamaktadır.

GENEL UYARILAR
Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz.
Kullanmadan önce veteriner hekime danışınız.
Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN ÖNERİLER:
Uygulayıcı için:
Bu ürün mineral yağ içerir. Kazara enjeksiyon (kendi kendine enjeksiyon), özellikle bir eklem veya parmağa enjekte edilirse şiddetli ağrı ve şişmeye neden olabilir ve acilen tıbbi yardım sağlanmazsa bazen etkilenen parmağın kaybıyla sonuçlanabilir.
Bu ürünü yanlışlıkla enjekte ederseniz, çok küçük bir miktar enjekte etmiş olsanız bile acilen tıbbi yardım alın ve prospektüsü hekiminize gösteriniz. Tıbbi muayeneden sonra ağrı 12 saatten fazla devam ederse, tekrar tıbbi yardım alınız.

Doktorlar için:
Bu ürün mineral yağ içerir. Az miktarda enjekte edilmiş olsa bile, bu ürünün kazara enjekte edilmesi, iskemik nekroza ve hatta parmağın kaybına yol açabilecek ciddi enflamasyona neden olabilir. DERHAL uzman tıbbi müdahale gereklidir ve özellikle parmak ucu veya tendon etkilenmişse erken insizyon ve irrigasyon gerekli olabilir.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ
2 °C – 8 ºC'de muhafaza ediniz. Dondurmayınız. Güneş ışığından koruyunuz.
Satış için ambalajlı veteriner tıbbi ürünün raf ömrü: 24 ay.
Primer ambalaj açıldıktan sonra raf ömrü: Hemen kullanınız.

TİCARİ TAKDİM ŞEKİLLERİ
1000 doz (500 ml) ürün içeren yüksek yoğunluklu polietilen plastik şişeler, tip I polimerik elastomer tıpalar ve alüminyum kapaklarla kapatılır.

KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR
Kullanılmış veya arta kalan ürün ilgili mevzuata göre imha edilmelidir.

PROSPEKTÜSÜN ONAY TARİHİ: 28.07.2025

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİHİ: 24.03.2011

PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ:
HIPRA VETERİNER MÜSTAHZARLARI TİC. LTD. ŞTİ. Y. Dudullu Mh. Necip Fazıl Bulvarı Keyap Çarşı Sit. B 2 Blok, No:44/29 Ümraniye/İSTANBUL Tel: (216) 526 60 00

ÜRETİCİ FİRMA ADRESİ: LABORATORIOS HIPRA, S.A. Avda la Selva, 135 - 17170 Amer (Girona) İSPANYA.

ETİKET

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır
HIPRAVIAR BPL2
Enjeksiyonluk Emülsiyon
Newcastle Hastalığına Karşı İnaktif Aşı

BİLEŞİMİ
Doz başına(0,5 ml) içerik:
İnaktif Newcastle Hastalığı Virüsü, La Sota suşu ……IHA ≥ 1/16 (*)
(*)IHA = hemaglutinasyon inhibisyon sonucu elde edilen antikor
Adjuvant:
Sıvı parafin..... 224,5 mg
Yardımcı maddeler:
Tiyomersal ..... 0,05 mg

KULLANIM SAHASI/ENDİKASYONLAR
Broiler, yumurtacı ve damızlık yarkalarda Newcastle Hastalığının önlenmesi

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
0,5 ml/hayvan dozunda kas içi (IM) olarak göğüs kasına veya deri altı (SC) yolla boynun arka bölgesine uygulanır.

GIDA DEĞERİ OLAN HAYVANLARDA KALINTI UYARILARI
Sıfır gün.

GENEL UYARILAR
Çocukların ulaşamayacağı yerde bulundurunuz.
Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ
2 ºC – 8 °C'de muhafaza ediniz. Dondurmayınız. Güneş ışığından koruyunuz.
Ambalajlı veteriner tıbbi ürünün raf ömrü: 24 ay
Ambalaj açıldıktan sonraki raf ömrü: Hemen kullanınız.

KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR
Kullanılmış veya arta kalan ürün ilgili mevzuata göre imha edilmelidir.

TİCARİ TAKDİM ŞEKİLLERİ:
1000 doz (500 ml) ürün içeren yüksek yoğunluklu polietilen plastik şişeler, tip I polimerik elastomer tıpalar ve alüminyum kapaklarla kapatılır.

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİHİ: 24.03.2011
PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ: HIPRA VETERİNER MÜSTAHZARLARI TİC. LTD. ŞTİ. Y. Dudullu Mh. Necip Fazıl Bulvarı Keyap Çarşı Sit. B 2 Blok, No:44/29 Ümraniye/İSTANBUL Tel: (216) 526 60 00

ÜRETİM YERİ VE ADRESİ: LABORATORIOS HIPRA, S.A. Avda la Selva, 135 - 17170 Amer (Girona) İSPANYA.

SERİ NO:
SKT:
Perakende satış fiyatı (KDV dahil): ….. TL