ÜRÜN ÖZELLİKLERİ ÖZETİ

1. VETERİNER TIBBI ÜRÜNÜN İSMİ
Nobilis Multriva RT+IBm+ND+Gm+REOm

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM
Her 0.3 ml dozun içinde:

Etkin maddeler:

İnaktif Kanatlı Metapneumovirüs, BUT1 #8544 Suşu	≥ 19.0 U[1]
İnaktif Enfeksiyöz Bronşit Virüsü, M41 Suşu	≥ 4.8 $\log_2$ HI[2]
İnaktif Enfeksiyöz Bronşit Virüsü, 4/91 Suşu	≥ 5.7 $\log_2$ HI[2]
İnaktif Newcastle Hastalığı Virüsü, Ulster Suşu	≥ 5.9 U[1]
İnaktif Enfeksiyöz Bursal Hastalığı virüsü, GB02 suşu	≥ 100.9 U[1]
İnaktif Enfeksiyöz Bursal Hastalık virüsü, 89/03 suşu	≥ 88.6 U[1]
İnaktif Kanatlı Reovirüs, suş ARV-1	≥ 11.5 U[1]
İnaktif Kanatlı Reovirüs, suş ARV-4	≥ 11.4 U[1]

[1] *İn vitro* antijenik kütle ELISA potens testinde tayin edildiği gibi
[2] Tavuklarda *in vivo* potens testinde tayin edildiği gibi

Adjuvan:

Hafif sıvı parafin	43 mg

Yardımcı maddelerin tam listesi için 6.1'e bakınız.

3. FARMASÖTİK ŞEKİL
Enjeksiyonluk Emülsiyon
Homojen, (kısmen) beyaz emülsiyon

4. KLİNİK ÖZELLİKLER
4.1 Hedef tür
Tavuklar.

4.2 Her bir hedef tür için kullanım alanı
Tavukların aşağıdaki amaçlarla aktif bağışıklaması için.
• Avian metapnömovirüsün (AMPV) neden olduğu yumurta verimindeki düşüşün azaltılması.
• Massachusetts (GI-1 genotipi) ve 4/91-793B (GI-13 genotipi) enfeksiyöz bronşit virüs (IBV) suşlarının neden olduğu solunum belirtilerinin ve yumurta verimindeki düşüşün azaltılması
• Newcastle hastalığı virüsünün (NDV) neden olduğu ölümlerin ve klinik belirtilerin azaltılması.
• aşılanmış tavukların yavrularının aşağıdaki amaçlarla pasif immünizasyonu:
- Enfeksiyöz bursal hastalık virüsünün (IBDV) çok virülan (CS89) ve klasik (STC) varyantlarının neden olduğu hastalığın ölüm oranını ve klinik belirtilerini azaltmak.
- Avian reovirüsün (ARV) (genotip 1 ve 4) neden olduğu viremi ve klinik hastalık belirtilerini azaltmak.
<u>İmmünite başlangıcı:</u>

- IBV, NDV, IBDV ve ARV: Aşılamadan 4 hafta sonra
- AMPV: Aşılamadan 5 hafta sonra
- Yavrularda IBDV ve ARV: 1 günlük

İmmünite süresi:
- AMPV, IBV, NDV, IBDV ve ARV: Aşılamadan 80 hafta sonra
- Yavrularda IBDV ve ARV: 3 haftalık

IBV suşları QX-D388 (GI-19 genotipi), Var2 (GI-23 genotipi) ve Ql (GI-16 genotipi) için çapraz koruma sağlanmıştır.
IBDV antijenik varyant suşları (varyant E ve GLS) için çapraz koruma sağlanmıştır.
ARV genotipleri 2, 3 ve 5 için çapraz koruma sağlanmıştır.

4.3 Kontraendikasyonlar
Bulunmamaktadır.

4.4 Her bir hedef tür için özel uyarılar
Sadece sağlıklı hayvanlar aşılanmalıdır.

4.5 Kullanıma İlişkin Özel Uyarılar
(i) Hayvanlarda Kullanıma İlişkin Özel Uyarılar
Bulunmamaktadır.

(ii) Ürünü uygulayana ilişkin özel uyarılar
Kullanıcının dikkatine: Bu veteriner tıbbi ürün mineral yağ içermektedir. Kazara enjeksiyon/kendi kendine enjeksiyon, özellikle bir eklem veya parmağa enjekte edildiğinde şiddetli ağrı ve şişmeye neden olabilir ve ender durumlarda, acil tıbbi müdahale yapılmazsa etkilenen parmağın kaybıyla sonuçlanabilir. Eğer bu veteriner tıbbi ürünü kazayla kendinize enjekte ederseniz, çok küçük bir miktar enjekte edilmiş olsa bile derhal bir doktora başvurun ve kullanma talimatını da yanınıza alın. Eğer doktorun muayenesinden sonra ağrı 12 saat boyunca sürerse, tekrar doktora başvurun.

Doktorun dikkatine: Bu veteriner tıbbi ürün mineral yağ içermektedir. Küçük bir miktarın enjekte olması halinde bile, bu veteriner tıbbi ürünün kazayla enjekte edilmesi örneğin iskemik nekroza ve hatta bir parmağın kaybına yol açabilecek olan yoğun şişliğe neden olabilir. DERHAL uzman tıbbi yardım sağlanmalıdır, özellikle bir parmak pulpası veya tendonun etkilendiği hallerde, enjekte olan alanın erken dönemde insizyonu ve irigasyonu gerekli olabilir.

(iii) Diğer uyarılar
Bulunmamaktadır.

4.6 İstenmeyen etkiler (sıklık ve şiddet)
Tavuklar:

Yaygın olmayan (tedavi edilen 1000 hayvan içinden 1 ila 10 hayvanda)	Enjeksiyon yerinde kitle[1]

[1] Genellikle 3 hafta içinde kaybolur.

4.7 Gebelik, laktasyon ve yumurtlama döneminde kullanımı

Yumurtacı tavuklar:

Tavuklarda, kuluçkaya yatmış ve kuluçka döneminin başlamasından önceki 3 hafta içinde kullanılmamalıdır.

4.8 Diğer tıbbi ürünlerle etkileşim ve diğer etkileşim şekilleri

Başka herhangi bir veteriner tıbbi ürün ile birlikte kullanıldığı durumda bu aşının güvenliliğine ve etkililiğine dair hiçbir bilgi mevcut değildir. Dolayısıyla, bu aşının başka bir veteriner tıbbi ürününden önce veya sonra kullanılması kararı vaka bazında alınmalıdır.

4.9 Dozaj ve Kullanım yolu

Bu aşı, aşılama programında canlı veya inaktif aşılarla hazırlık dozlaması yapıldıktan sonra rapel aşı olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Birincil aşılar, enfeksiyöz bronşit virüsü (örn. Nobilis IB 4-91, Nobilis IB Ma5), enfeksiyöz bursal hastalık virüsü (örn. Nobilis Gumboro D78, Innovax-ND-IBD) ve avian reovirüse (örn. Nobilis Reo 1133, Nobilis Multriva REOm) karşı canlı veya inaktif aşılarla yapılmalıdır. Aşı, birincil aşının uygulanmasından en az 4 hafta sonra yapılmalıdır.

Kas içi kullanım içindir.

Meme veya uyluk bölgesine 8 haftalıktan itibaren tek doz 0,3 ml uygulanır, ancak yumurtlamanın başlamasından en geç 3 hafta önce uygulanmalıdır.

Kullanmadan önce aşının oda sıcaklığına ulaşmasını bekleyiniz.

Kullanmadan önce iyice çalkalayın.

Şırınga ve iğneler kullanılmadan önce steril olmalıdır.

Standart aseptik prosedürlere uyulmalıdır.

Avian metapnömovirüs (örn. Nobilis Rhino CV) ve/veya Newcastle hastalığı virüsüne (örn. Nobilis ND C2, Nobilis ND Clone 30, Innovax-ND-IBD) karşı birincil aşılama yapıldığında, aşı birincil aşılamanın uygulanmasından en az 4 hafta sonra yapılmalıdır.

4.10 Doz aşımı, varsa semptomlar, acil prosedürler, antidotlar (gerekli ise)

Çift doz aşının uygulanmasından sonra bölüm 4.6'da belirtilenler dışında herhangi bir istenmeyen etki gözlenmemiştir.

4.11 Gıda Değeri Olan Hayvanlarda Kalıntı Uyarıları

Sıfır gün.

5. İMMUNOLOJİK ÖZELLİKLER

Farmakoterapötik grup: Kanatlılar için inaktive viral aşılar.

ATCvet kodu: QI01AA26.

Aşı, avian rinotrakeit virüsü, enfeksiyöz bronşit virüsü ve Newcastle hastalığı virüsüne karşı aktif immüniteyi uyarmak ve yavrulara enfeksiyöz bursal (Gumboro) hastalığı ve avian reovirüse karşı pasif immünite sağlamak amacıyla aktif immüniteyi uyarmak için tasarlanmıştır.

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1 Yardımcı maddeler

Hafif sıvı parafin
Polisorbat 80
Sorbitan oleat
PBS çözeltisi:
- Sodyum dihidrojen fosfat dihidrat
- Disodyum fosfat dihidrat
- Sodyum klorür
- Enjeksiyonluk su (WFI)

6.2 Geçimsizlikler

Diğer veteriner tıbbi ürünlerle karıştırılmamalıdır.

6.3 Raf ömrü

Satış için ambalajlanmış veteriner tıbbi ürünün raf ömrü: 2 yıl.
İlk açıldıktan sonraki raf ömrü: 10 saat.

6.4 Muhafaza Şartları

Buzdolabında 2-8 ºC'de dondurulmadan saklanmalıdır. Doğrudan güneş ışığından koruyunuz.

6.5 Birincil ambalajın niteliği ve kompozisyonu

300 ml (1000 doz) veya 600 ml'lik (2000 doz) 1 şişe içeren kauçuk tıpa ve alüminyum kapak ile kapatılmış polietilen tereftalat (PET) şişelerde karton kutuda sunulmaktadır.
Tüm ambalaj boyutları pazara sunulmamış olabilir.

6.6 Kullanılmamış veya arta kalan ürünün imhasına ilişkin özel önlemler

Kullanılmamış veya arta kalan ürün ilgili mevzuata göre imha edilmelidir.

7. PAZARLAMA İZNİ SAHİBİ ADI ve ADRESİ

INTERVET Veteriner İlaçları Paz. ve Tic. Ltd.Şti.
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 199
Levent 199 Ofis Bloğu Kat:13, 34394 Şişli/İSTANBUL

8. PAZARLAMA İZNİ NUMARASI:---

9. PAZARLAMA İZNİNİN İLK VERİLME VEYA YENİLEME TARİHİ: 21.05.2025

10. METİN DEĞİŞİKLİK TARİHİ

Prospektüs

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır

Nobilis Multriva RT+IBm+ND+Gm+REOm

Enjeksiyonluk Emülsiyon

Kanatlı Metapnömovirüsü, Enfeksiyöz Bronşit virüsü, Newcastle Hastalığı virüsü, Enfeksiyöz Bursal Hastalığı virüsü ve Kanatlı Reovirüs'ünün suşlarının neden olduğu belirtilere karşı bağışıklık amacıyla kullanılan inaktif aşı

BİLEŞİMİ

İnaktif Kanatlı Metapneumovirüs, BUT1 #8544 Suşu	≥ 19.0 U[1]
İnaktif Enfeksiyöz Bronşit Virüsü, M41 Suşu	≥ 4.8 $\log_2$ HI[2]
İnaktif Enfeksiyöz Bronşit Virüsü, 4/91 Suşu	≥ 5.7 $\log_2$ HI[2]
İnaktif Newcastle Hastalığı Virüsü, Ulster Suşu	≥ 5.9 U[1]
İnaktif Enfeksiyöz Bursal Hastalığı virüsü, GB02 suşu	≥ 100.9 U[1]
İnaktif Enfeksiyöz Bursal Hastalık virüsü, 89/03 suşu	≥ 88.6 U[1]
İnaktif Kanatlı Reovirüs, suş ARV-1	≥ 11.5 U[1]
İnaktif Kanatlı Reovirüs, suş ARV-4	≥ 11.4 U[1]

Adjuvan: Hafif sıvı parafin 43 mg içeren homojen, kısmen beyaz inaktif enjeksiyonluk emülsiyon aşı.

İMMUNOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Farmakoterapötik grup: Kanatlılar için inaktive viral aşılar.

ATCvet kodu: QI01AA26.

Aşı, avian rinotrakeit virüsü, enfeksiyöz bronşit virüsü ve Newcastle hastalığı virüsüne karşı aktif immüniteyi uyarmak ve yavrulara enfeksiyöz bursal (Gumboro) hastalığı ve avian reovirüse karşı pasif immünite sağlamak amacıyla aktif immüniteyi uyarmak için tasarlanmıştır.

KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLAR

Tavukların aşağıdaki amaçlarla aktif bağışıklaması için.

- Avian metapnömovirüsün (AMPV) neden olduğu yumurta verimindeki düşüşün azaltılması.
- Massachusetts (GI-1 genotipi) ve 4/91-793B (GI-13 genotipi) enfeksiyöz bronşit virüs (IBV) suşlarının neden olduğu solunum belirtilerinin ve yumurta verimindeki düşüşün azaltılması
- Newcastle hastalığı virüsünün (NDV) neden olduğu ölümlerin ve klinik belirtilerin azaltılması.
- aşılanmış tavukların yavrularının aşağıdaki amaçlarla pasif immünizasyonu:

- Enfeksiyöz bursal hastalık virüsünün (IBDV) çok virülan (CS89) ve klasik (STC) varyantlarının neden olduğu hastalığın ölüm oranını ve klinik belirtilerini azaltmak.
- Avian reovirüsün (ARV) (genotip 1 ve 4) neden olduğu viremi ve klinik hastalık belirtilerini azaltmak.

<u>İmmünite başlangıcı:</u>

- IBV, NDV, IBDV ve ARV: Aşılamadan 4 hafta sonra
- AMPV: Aşılamadan 5 hafta sonra

• Yavrularda IBDV ve ARV: 1 günlük

İmmünite süresi:
• AMPV, IBV, NDV, IBDV ve ARV: Aşılamadan 80 hafta sonra
• Yavrularda IBDV ve ARV: 3 haftalık

IBV suşları QX-D388 (GI-19 genotipi), Var2 (GI-23 genotipi) ve Ql (GI-16 genotipi) için çapraz koruma sağlanmıştır.
IBDV antijenik varyant suşları (varyant E ve GLS) için çapraz koruma sağlanmıştır.
ARV genotipleri 2, 3 ve 5 için çapraz koruma sağlanmıştır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Bu aşı, aşılama programında canlı veya inaktif aşılarla hazırlık dozlaması yapıldıktan sonra rapel aşı olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Birincil aşılar, enfeksiyöz bronşit virüsü (örn. Nobilis IB 4-91, Nobilis IB Ma5), enfeksiyöz bursal hastalık virüsü (örn. Nobilis Gumboro D78, Innovax-ND-IBD) ve avian reovirüse (örn. Nobilis Reo 1133, Nobilis Multriva REOm) karşı canlı veya inaktif aşılarla yapılmalıdır. Aşı, birincil aşının uygulanmasından en az 4 hafta sonra yapılmalıdır.
Kas içi kullanım içindir.
Meme veya uyluk bölgesine 8 haftalıktan itibaren tek doz 0,3 ml uygulanır, ancak yumurtlamanın başlamasından en geç 3 hafta önce uygulanmalıdır.
Kullanmadan önce aşının oda sıcaklığına ulaşmasını bekleyiniz.
Kullanmadan önce iyice çalkalayın.
Şırınga ve iğneler kullanılmadan önce steril olmalıdır.
Standart aseptik prosedürlere uyulmalıdır.
Avian metapnömovirüs (örn. Nobilis Rhino CV) ve/veya Newcastle hastalığı virüsüne (örn. Nobilis ND C2, Nobilis ND Clone 30, Innovax-ND-IBD) karşı birincil aşılama yapıldığında, aşı birincil aşılamanın uygulanmasından en az 4 hafta sonra yapılmalıdır.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL UYARILAR

Sadece sağlıklı hayvanlar aşılanmalıdır.
Yumurtlama döneminde kullanım: Tavuklarda, kuluçkaya yatmış ve kuluçka döneminin başlangıcından önceki 3 hafta içinde kullanmayınız.

İSTENMEYEN ETKİLER

Güvenlik ve klinik çalışmalar sırasında enjeksiyon bölgesinde yaygın olmayan enjeksiyon yerinde kitle gözlenmiştir. Bu şişlikler genellikle 3 hafta içinde kaybolur.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Bu aşının diğer herhangi bir veteriner tıbbi ürün ile birlikte kullan güvenilirliği ve etkinliği ile ilgili herhangi bir bilgi yoktur. Dolayısıyla, bu aşıyı diğer her tür veteriner tıbbi üründen önce veya sonra kullanma kararı her bir vaka için bağımsız olarak değerlendirilerek alınmalıdır.
Diğer veteriner tıbbi ürünlerle karıştırılmamalıdır.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT
Çift doz aşının uygulanmasından sonra "İstenmeyen Etkiler" bölümünde belirtilenler dışında herhangi bir istenmeyen etki gözlenmemiştir.

KONTRENDİKASYONLARI
Bulunmamaktadır.

GIDA DEĞERİ OLAN HAYVANLARDA YASAL ARINMA SÜRESİ
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.): Sıfır gün.

GENEL UYARILAR:
Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.
Çocukların ulaşamayacağı yerde bulundurunuz.
Ambalajı hasar görmüş ürünleri kullanmayınız.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN ÖNERİLER
Kullanıcının dikkatine: Bu veteriner tıbbi ürün mineral yağ içermektedir. Kazara enjeksiyon/kendi kendine enjeksiyon, özellikle bir eklem veya parmağa enjekte edildiğinde şiddetli ağrı ve şişmeye neden olabilir ve ender durumlarda, acil tıbbi müdahale yapılmazsa etkilenen parmağın kaybıyla sonuçlanabilir. Eğer bu veteriner tıbbi ürünü kazayla kendinize enjekte ederseniz, çok küçük bir miktar enjekte edilmiş olsa bile derhal bir doktora başvurun ve kullanma talimatını da yanınıza alın. Eğer doktorun muayenesinden sonra ağrı 12 saat boyunca sürerse, tekrar doktora başvurun.
Doktorun dikkatine: Bu veteriner tıbbi ürün mineral yağ içermektedir. Küçük bir miktarın enjekte olması halinde bile, bu veteriner tıbbi ürünün kazayla enjekte edilmesi örneğin iskemik nekroza ve hatta bir parmağın kaybına yol açabilecek olan yoğun şişliğe neden olabilir. DERHAL uzman tıbbi yardım sağlanmalıdır, özellikle bir parmak pulpası veya tendonun etkilendiği hallerde, enjekte olan alanın erken dönemde insizyonu ve irigasyonu gerekli olabilir.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ
Buzdolabında 2-8 ºC'de dondurulmadan saklanmalıdır. Doğrudan güneş ışığından koruyunuz.
Satış için ambalajlanmış veteriner tıbbi ürünün raf ömrü: 2 yıl.
İlk açıldıktan sonraki raf ömrü: 10 saat.

TİCARİ TAKDİM ŞEKİLLERİ
300 ml (1000 doz) veya 600 ml'lik (2000 doz) 1 şişe içeren kauçuk tıpa ve alüminyum kapak ile kapatılmış polietilen tereftalat (PET) şişelerde karton kutuda sunulmaktadır.

KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR
Kullanılmamış veya arta kalan ürün ilgili mevzuata göre imha edilmelidir.

PROSPEKTÜSÜN ONAY TARİHİ: 21.05.2025

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİHİ: 21.05.2025

PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ
INTERVET Veteriner İlaçları Paz. ve Tic. Ltd.Şti.
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 199 Levent 199 Ofis Bloğu Kat:13, 34394 Şişli/İstanbul

ÜRETİCİ FİRMA VE ADRESİ
Merck Sharp & Dohme Animal Health, S.L
C/Zeppelin, 6. Pol. Ind. El Montalvo I, Parcela 38, Carbajosa de la Sagrada 37008 Salamanca, İspanya
Serbest bırakma: Intervet International B.V., Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer, Hollanda

Dış Etiket (Kutu-tüm takdim şekilleri için)

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır

Nobilis Multriva RT+IBm+ND+Gm+REOm

Enjeksiyonluk Emülsiyon

Kanatlı Metapnömovirüsü, Enfeksiyöz Bronşit virüsü, Newcastle Hastalığı virüsü, Enfeksiyöz Bursal Hastalığı virüsü ve Kanatlı Reovirüs'ünün suşlarının neden olduğu belirtilere karşı bağışıklık amacıyla kullanılan inaktif aşı

İnaktif Kanatlı Metapneumovirüs, BUT1 #8544 Suşu≥ 19.0 U^1
İnaktif Enfeksiyöz Bronşit Virüsü, M41 Suşu≥ 4.8 log_2 HI^2
İnaktif Enfeksiyöz Bronşit Virüsü, 4/91 Suşu≥ 5.7 log_2 HI^2
İnaktif Newcastle Hastalığı Virüsü, Ulster Suşu≥ 5.9 U^1
İnaktif Enfeksiyöz Bursal Hastalığı virüsü, GB02 suşu≥ 100.9 U^1
İnaktif Enfeksiyöz Bursal Hastalık virüsü, 89/03 suşu≥ 88.6 U^1
İnaktif Kanatlı Reovirüs, suş ARV-1≥ 11.5 U^1
İnaktif Kanatlı Reovirüs, suş ARV-4≥ 11.4 U^1
Adjuvan: Hafif sıvı parafin 43 mg
içeren homojen, kısmen beyaz inaktif enjeksiyonluk emülsiyon aşı.
Kanatlı Metapnömovirüsü, Enfeksiyöz Bronşit virüsü, Newcastle Hastalığı virüsü, Enfeksiyöz Bursal Hastalığı virüsü ve Kanatlı Reovirüs'ünün suşlarının neden olduğu belirtilere karşı aktif bağışıklığı sağlamak için kullanılır.
8 haftalık yaştan itibaren, yumurtlama başlangıcından en geç 3 hafta önce göğüs veya uyluk bölgesine kas içi 0.3 ml'lik tek bir doz uygulanır.
Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz.
Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.
Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz.
GIDA DEĞERİ OLAN HAYVANLARDA YASAL ARINMA SÜRESİ: Sıfır gün
Buzdolabında 2-8 ºC'de dondurulmadan saklanmalıdır. Doğrudan güneş ışığından koruyunuz.
Satış için ambalajlanmış veteriner tıbbi ürünün raf ömrü: 2 yıl.
İlk açıldıktan sonraki raf ömrü: 10 saat.
T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİHİ : 21.05.2025
PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ
INTERVET Veteriner İlaçları Paz. ve Tic. Ltd.Şti.
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 199 Levent 199 Ofis Bloğu Kat:13, 34394 Şişli/İstanbul
ÜRETİCİ FİRMA VE ADRESİ
Merck Sharp & Dohme Animal Health, S.L, İspanya
Serbest bırakma: Intervet International B.V., Hollanda
SERİ NO:
ÜRETİM TARİHİ:
SON KULLANMA TARİHİ:
PSF (KDV DAHİL):

İç Etiket (tüm takdim şekilleri için)

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır

Nobilis Multriva RT+IBm+ND+Gm+REOm

Enjeksiyonluk Emülsiyon

Kanatlı Metapnömovirüsü, Enfeksiyöz Bronşit virüsü, Newcastle Hastalığı virüsü, Enfeksiyöz Bursal Hastalığı virüsü ve Kanatlı Reovirüs'ünün suşlarının neden olduğu belirtilere karşı bağışıklık amacıyla kullanılan inaktif aşı

Her 0.3 ml dozun içinde:

Etkin maddeler:

İnaktif Kanatlı Metapneumovirüs, BUT1 #8544 Suşu	≥ 19.0 U[1]
İnaktif Enfeksiyöz Bronşit Virüsü, M41 Suşu	≥ 4.8 $\log_2$ HI[2]
İnaktif Enfeksiyöz Bronşit Virüsü, 4/91 Suşu	≥ 5.7 $\log_2$ HI[2]
İnaktif Newcastle Hastalığı Virüsü, Ulster Suşu	≥ 5.9 U[1]
İnaktif Enfeksiyöz Bursal Hastalığı virüsü, GB02 suşu	≥ 100.9 U[1]
İnaktif Enfeksiyöz Bursal Hastalık virüsü, 89/03 suşu	≥ 88.6 U[1]
İnaktif Kanatlı Reovirüs, suş ARV-1	≥ 11.5 U[1]
İnaktif Kanatlı Reovirüs, suş ARV-4	≥ 11.4 U[1]

[1] *İn vitro* antijenik kütle ELISA potens testinde tayin edildiği gibi

[2] Tavuklarda *in vivo* potens testinde tayin edildiği gibi

Adjuvan:

Hafif sıvı parafin	43 mg

Uygulama: Kas içi kullanım.

SERİ NO:

SON KULLANMA TARİHİ: