ÜRÜN ÖZELLİKLERİ ÖZETİ

1. VETERİNER TIBBİ ÜRÜNÜN İSMİ:
POXDOLL Enjeksiyonluk süspansiyon liyofilizatı ve çözücüsü

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM:
Her bir koyun dozu aşı (0,5 ml) içeriği aşağıdaki gibidir:

Enjeksiyonluk süspansiyon liyofilizatı

Aktif madde	**Miktar**	**İşlevi**
Atenüe SPV(Bk) LK_{63} suşu	$\geq 10^{2,5}$ $DKID_{50}$/doz	İmmunize eden antijen
Yardımcı maddeler		
Laktalbumin hidrolizat	0,25 mg/doz	Stabilizatör
Sukroz	0,50 mg/doz	

Parenteral uygulama için çözücü

Bileşenler	**Miktar**	**İşlevi**
Sodyum klorür	8,5 mg/ml	Sulandırma sıvısı
Disodyum hidrojen fosfat heptahidrat	0,18 mg/ml	
Sodyum dihidrojen fosfat dihidrat	0,06 mg/ml	
Enjeksiyonluk su	1 ml q.s.	

Yardımcı maddelerin tam listesi için bölüm 6.1'e bakınız.

3. FARMASÖTİK ŞEKİL:
Enjeksiyonluk süspansiyon liyofilizatı ve çözücüsü
Krem renkli liyofilize pelet ve renksiz berrak çözücü

4. KLİNİK ÖZELLİKLER:
4.1. Hedef tür:
Koyun, keçi, sığır.

4.2. Her bir hedef tür için kullanım alanı:
POXDOLL koyun ve keçilerde koyun keçi çiçek hastalığına, sığırlarda ise sığırların nodüler ekzantemine (Lumpy Skin Hastalığı) karşı koruyucu amaçla kullanılır. Aşılamayı takiben 21 gün sonra hücresel ve humoral immun yanıt oluşturarak bağışıklık oluşur. Bağışıklık süresi aşılamayı takiben 3 yıldır.

4.3. Kontrendikasyonlar:
Herhangi bir kontrendikasyonu yoktur.

4.4. Her bir hedef tür için özel uyarılar:
Hasta ve inkubasyon dönemindeki sirayetten şüpheli hayvanlar ile stres altındaki hayvanlar aşılanmamalıdır.

4.5. Kullanıma ilişkin özel uyarılar

(i) Hayvanlarda kullanıma ilişkin özel uyarılar:
- Koyun ve keçilerde 6 haftalıktan küçük genç hayvanlara aşı uygulanmaz.
- Sığırlarda aşılanmış hayvanlardan doğan buzağılar 6 aylıktan önce aşılanmamalı, aşılanmamış hayvanlardan doğan buzağılar ise 6 aylıktan önce aşılanmalıdır.
- Liyofilize aşı sulandırma sıvısı ile sulandırıldıktan sonra en geç 6 saat içinde kullanılmalıdır.
- Aşı kullanılacağı zaman liyofilize pelet steril enjektörler kullanılarak çözücü ile iyice çözdürülmeli ve aşı şişesi her kullanımdan önce hafifçe çalkalanmalıdır.
- Aşı uygulamadan önce oda sıcaklığına getirilmelidir.
- Aşılama sırasında aşı şişesi güneşten korunmalı, mümkünse buz içinde bulundurulmalıdır.
- Her uygulamada aseptik iğne ve enjektörler kullanılmalıdır.
- Aşı yalnızca veteriner hekim veya veteriner hekim gözetimindeki veteriner sağlık teknisyenlerince uygulanmalıdır.

(ii) Ürünü uygulayana ilişkin özel uyarılar:
- İnsan sağlığı için bilinen bir olumsuz etkisi yoktur, ancak aşı uygulama sırasında olabilecek yaralanmalarda bölge temizlenerek dezenfekte edilmelidir.
- Aşıyı kazara kendinize enjekte etmeniz hâlinde derhal tıbbi yardıma başvurun ve ürünün kullanma talimatını veya etiketini doktorunuza gösterin.

(iii) Diğer uyarılar:

4.6. İstenmeyen etkiler (sıklık ve şiddet):
Bazı hayvanlarda aşı uygulama bölgesinde yaygın (100 hayvanda 1'den fazla fakat 10'dan az) olarak 0,2-5 cm çapında sert veya yumuşak şişlikler ve geçici bir beden ısısı yükselmesi görülebilir.

4.7. Gebelik, laktasyon ve yumurtlama döneminde kullanım:
Gebe hayvanlarda kullanımı uygundur.

4.8. Diğer tıbbi ürünlerle etkileşimi ve diğer etkileşim şekilleri:
Bu ürünün diğer aşılarla birlikte kullanıldığında geçimliliği hakkında bilgi bulunmamaktadır. Bu nedenle bu ürünün diğer ürünlerle aynı günde veya farklı zamanlarda kullanımının etkili ve güvenilir olduğu ispatlanmamıştır.

4.9. Dozaj ve kullanım yolu:
Liyofilize pelet üzerine çözücü ilave edilir. Köpürtmeden çalkalanır. Enjektöre çekilerek çözücüye geri eklenir. 6-12 haftalık kuzu ve oğlaklara 0,2 ml, 12 haftalıktan büyük yaştaki koyun ve keçilere 0,5 ml ve 6 aylıktan büyük sığırlara 3 ml miktarında deri altı (subcutan) yolla uygulanır. Büyükbaş hayvanlara boynun yan yüzünün orta kısmına veya omuz gerisindeki hareketsiz bölgeye, koyunlarda arka bacak iç kısmına, keçilerde kuyruk altına deri altı yolla aşılama yapılır.

4.10. Doz Aşımı, varsa semptomlar, acil prosedürler, antidotlar:
Güvenlik çalışmalarında normal uygulama dozunun 10 katı dozu uygulamada güvenli olduğu görülmüştür.

4.11. Kalıntı Arınma Süreleri (sıfır gün olanlar da dahil):
Sıfır gündür.

5. İMMÜNOLOJİK ÖZELLİKLER:

Farmakoterapotik grup: Atenüe, liyofilize koyun-keçi çiçek, sığır LSD aşısı
ATC Vet kodu: Q102AD, QI03AD, QI04AD

POXDOLL koyun ve keçilerde koyun keçi çiçek hastalığına, sığırlarda ise sığırların nodüler ekzantemine (Lumpy Skin Hastalığı) karşı koruyucu amaçla kullanılan atenüe, liyofilize bir aşıdır.

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER:

6.1. Yardımcı maddeler:
Liyofilize pelet:
Laktalbumin hidrolizat
Sukroz

Parenteral uygulama için çözücü:
Sodyum klorür
Disodyum hidrojen fosfat heptahidrat
Sodyum dihidrojen fosfat dihidrat
Enjeksiyonluk su

6.2. Geçimsizlikler:
Ürünün diğer ürünlerle kullanılmasının güvenliği ve etkinliği bilinmemektedir.

6.3. Raf ömrü:
Satışa sunulmuş haliyle raf ömrü:
Enjeksiyonluk süspansiyon liyofilizatı: 36 ay.
Parenteral uygulama için çözücü: 36 ay.
Sulandırıldıktan sonraki raf ömrü: 6 saat.

6.4. Muhafaza şartları:
Enjeksiyonluk süspansiyon liyofilizatı: 2-8ºC'de ve karanlıkta muhafaza edilmelidir. Dondurmayınız.
Parenteral uygulama için çözücü: Buzdolabına konulmadan, karanlıkta ve 25°C'den düşük sıcaklıkta muhafaza edilir. Dondurmayınız.

6.5. Birincil ambalajın niteliği ve kompozisyonu:
Aşı 25, 50 ve 100 dozluk liyofilize pelet içeren Tip I renksiz cam şişelerde; parenteral uygulama için çözücü içeren 12,5 ml, 25 ml ve 50 ml Tip II amber renkli cam şişeler veya beyaz polipropilen plastik şişelerde ambalajlanır. Cam ve plastik şişeler bromobutil tıpa ve alüminyum kapak ile kapatılmış şekilde etiketlenir.
Liyofilize pelet plastik viyol içinde 20'şer adet veya kutulu/kutusuz olarak strafor içerisinde, Parenteral uygulama için çözücü münferit kutulu veya kutusuz olarak strafor içerisinde piyasaya sunulmaktadır.

6.6 Kullanılmış veya arta kalan ürünün imhasına ilişkin özel önlemler:
Kullanılmış veya arta kalan ürün ve bu ürünün kullanımıyla ortaya çıkan atık materyaller ilgili mevzuata göre imha edilmelidir. Her türlü atık/artık materyal evsel atıklarla ve atık sularla karıştırılmamalı, drenaj sistemlerine ve çevreye atılmamalıdır.

7. PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ:
DOLLVET BİYOTEKNOLOJİ A.Ş.
Konaklar Mahallesi Akasyalı Sokak No:10 Beşiktaş/İstanbul
E-mail: dollvet@dollvet.com.tr Telefon: +90 212 422 02 01 Faks: +90 212 422 00 72

8. PAZARLAMA İZNİ NUMARASI:

9. PAZARLAMA İZNİNİN İLK VERİLME VEYA YENİLEME TARİHİ:
25.06.2007

10. METİN DEĞİŞİKLİK TARİHİ: 22.05.2025

PROSPEKTÜS

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır
POXDOLL
Atenüe Canlı Koyun-Keçi Çiçek ve Sığır LSD Aşısı
Enjeksiyonluk Süspansiyon Liyofilizatı ve Çözücüsü

BİLEŞİMİ:
Her bir doz (0,5 ml) için aşağıdaki gibidir.

Enjeksiyonluk süspansiyon liyofilizatı

Aktif madde	**Miktar**	**İşlevi**
Atenüe SPV(Bk) LK_{63} suşu	$\geq 10^{2,5}$ $DKID_{50}$/doz	İmmunize eden antijen
Yardımcı maddeler		
Laktalbumin hidrolizat	0,25 mg/doz	Stabilizatör
Sukroz	0,50 mg/doz	

Parenteral uygulama için çözücü

Bileşenler	**Miktar**	**İşlevi**
Sodyum klorür	8,5 mg/ml	Sulandırma sıvısı
Disodyum hidrojen fosfat heptahidrat	0,18 mg/ml	
Sodyum dihidrojen fosfat dihidrat	0,06 mg/ml	
Enjeksiyonluk su	1 ml q.s.	

İMMUNOLOJİK ÖZELLİKLER:
Farmakoterapotik Grup: Atenüe, liyofilize Koyun-Keçi Çiçeği, Sığır LSD aşısı
ATC Vet Kodu: QI02AD, QI03AD, QI04AD

POXDOLL koyun ve keçilerde koyun keçi çiçek hastalığına, sığırlarda ise sığırların nodüler ekzantemine (Lumpy Skin Hastalığı) karşı koruyucu amaçla kullanılan atenüe, liyofilize bir aşıdır.

KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLAR:
POXDOLL koyun ve keçilerde koyun keçi çiçek hastalığına, sığırlarda ise sığırların nodüler ekzantemine (Lumpy Skin Hastalığı) karşı koruyucu amaçla kullanılır. Aşılamayı takiben 21 gün sonra hücresel ve humoral immun yanıt oluşturarak bağışıklık oluşur. Bağışıklık süresi aşılamayı takiben 3 yıldır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:
Liyofilize pelet üzerine çözücü ilave edilir. Köpürtmeden çalkalanır. Enjektöre çekilerek çözücüye geri eklenir. 6-12 haftalık kuzu ve oğlaklara 0,2 ml, 12 haftalıktan büyük yaştaki koyun ve keçilere 0,5 ml ve 6 aylıktan büyük sığırlara 3 ml miktarında deri altı (subcutan) yolla uygulanır. Büyükbaş hayvanlara boynun yan yüzünün orta kısmına veya omuz gerisindeki hareketsiz bölgeye, koyunlarda arka bacak iç kısmına, keçilerde kuyruk altına deri altı yolla aşılama yapılır.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL UYARILAR:
- Koyun ve keçilerde 6 haftalıktan küçük genç hayvanlara aşı uygulanmaz.
- Sığırlarda aşılanmış hayvanlardan doğan buzağılar 6 aylıktan önce aşılanmamalı, aşılanmamış hayvanlardan doğan buzağılar ise 6 aylıktan önce aşılanmalıdır.
- Liyofilize aşı sulandırma sıvısı ile sulandırıldıktan sonra en geç 6 saat içinde kullanılmalıdır.
-Hasta ve inkubasyon dönemindeki sirayetten şüpheli hayvanlar ile stres altındaki hayvanlar aşılanmamalıdır.
-Aşı kullanılacağı zaman liyofilize pelet steril enjektörler kullanılarak çözücü ile iyice çözdürülmeli ve aşı şişesi her kullanımdan önce hafifçe çalkalanmalıdır.
- Aşı uygulamadan önce oda sıcaklığına getirilmelidir.
- Aşılama sırasında aşı şişesi güneşten korunmalı, mümkünse buz içinde bulundurulmalıdır.
- Her uygulamada aseptik iğne ve enjektörler kullanılmalıdır.
- Aşı yalnızca veteriner hekim veya veteriner hekim gözetimindeki veteriner sağlık teknisyenlerince uygulanmalıdır.

Gebelik ve laktasyonda kullanım: Gebe hayvanlarda kullanımı uygundur.

İSTENMEYEN ETKİLER:
Bazı hayvanlarda aşı uygulama bölgesinde yaygın (100 hayvanda 1'den fazla fakat 10'dan az) olarak 0,2-5 cm çapında sert veya yumuşak şişlikler ve geçici bir beden ısısı yükselmesi görülebilir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ:
Bu ürünün diğer aşılarla birlikte kullanıldığında geçimliliği hakkında bilgi bulunmamaktadır. Bu nedenle bu ürünün diğer ürünlerle aynı günde veya farklı zamanlarda kullanımının etkili ve güvenilir olduğu ispatlanmamıştır.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT:
Güvenlik çalışmalarında normal uygulama dozunun 10 katı dozu uygulamada güvenli olduğu görülmüştür.

GIDA DEĞERİ OLAN HAYVANLARDA KALINTI UYARILARI:
Sıfır gündür.

KONTRENDİKASYONLAR:
Herhangi bir kontrendikasyonu yoktur.

GENEL UYARILAR:
"Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz."
"Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız."

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN ÖNERİLER:
- İnsan sağlığı için bilinen bir olumsuz etkisi yoktur, ancak aşı uygulama sırasında olabilecek yaralanmalarda bölge temizlenerek dezenfekte edilmelidir.
- Aşıyı kazara kendinize enjekte etmeniz hâlinde derhal tıbbi yardıma başvurun ve ürünün kullanma talimatını veya etiketini doktorunuza gösterin.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ:
Enjeksiyonluk süspansiyon liyofilizatı: 2-8ºC'de ve karanlıkta muhafaza edilmelidir. Dondurmayınız.
Raf ömrü 36 aydır.
Parenteral uygulama için çözücü: Buzdolabına konulmadan, karanlıkta ve 25°C'den düşük sıcaklıkta muhafaza edilir. Dondurmayınız.
Raf ömrü 36 aydır.
Sulandırılan aşı 6 saat içinde kullanılmalıdır.

KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR:
Kullanılmış veya arta kalan ürün ve bu ürünün kullanımıyla ortaya çıkan atık materyaller ilgili mevzuata göre imha edilmelidir. Her türlü atık/artık materyal evsel atıklarla ve atık sularla karıştırılmamalı, drenaj sistemlerine ve çevreye atılmamalıdır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKİLLERİ:
Aşı 25, 50 ve 100 dozluk liyofilize pelet içeren Tip I renksiz cam şişelerde; parenteral uygulama için çözücü içeren 12,5 ml, 25 ml ve 50 ml Tip II amber renkli cam şişeler veya beyaz polipropilen plastik şişelerde ambalajlanır. Cam ve plastik şişeler bromobutil tıpa ve alüminyum kapak ile kapatılmış şekilde etiketlenir.
Liyofilize pelet plastik viyol içinde 20'şer adet veya kutulu/kutusuz olarak strafor içerisinde, Parenteral uygulama için çözücü münferit kutulu veya kutusuz olarak strafor içerisinde piyasaya sunulmaktadır.

PROSPEKTÜSÜN ONAY TARİHİ: 22.05.2025

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİHİ: 25.06.2007

PAZARLAMA İZİN SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ:
DOLLVET BİYOTEKNOLOJİ A.Ş.
Konaklar Mahallesi Akasyalı Sokak No:10 Beşiktaş/İstanbul
E-mail: dollvet@dollvet.com.tr **Telefon:** +90 212 422 02 01 **Faks:** +90 212 422 00 72

ÜRETİCİ FİRMA VE ADRESİ:
DOLLVET BİYOTEKNOLOJİ A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi Koçören OSB Mahallesi 106. Cadde No:6 Eyyübiye/ŞANLIURFA
E-mail: dollvet@dollvet.com.tr **Telefon:** +90 414 369 11 33 **Faks:** +90 414 369 16 92

İÇ ve DIŞ AMBALAJ ETİKET BİLGİLERİ

İÇ AMBALAJ ETİKET BİLGİLERİ

Enjeksiyonluk Süspansiyon Liyofilizatı için iç ambalaj etiketi (25 doz, 50 doz, 100 doz)

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır
POXDOLL
Atenüe Canlı Koyun-Keçi Çiçek ve Sığır LSD Aşısı
Enjeksiyonluk Süspansiyon Liyofilizatı

Atenüe SPV(Bk) LK_{63} suşu	$\geq 10^{2,5}$ $DKID_{50}$/doz

6-12 haftalık kuzu ve oğlaklara 0,2 ml, 12 haftalıktan büyük yaştaki hayvanlara 0,5 ml ve 6 aylıktan büyük sığırlara 3 ml miktarında deri altı (subcutan) yolla uygulanır.

2-8 ºC'de karanlıkta saklanmalıdır. Dondurmayınız. Raf ömrü 36 ay.

TİCARİ TAKDİM ŞEKİLLERİ:
25, 50 ve 100 dozluk liyofilize pelet içeren Tip I renksiz cam şişeler

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİH: 25.06.2007

PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ:
DOLLVET BİYOTEKNOLOJİ A.Ş.
Konaklar Mah. Akasyalı Sok. No:10 Beşiktaş /İSTANBUL

SERİ NO:
ÜRETİM TARİHİ:
SON KULLANMA TARİHİ:

Parenteral uygulama için çözücü iç ambalaj etiketi (12,5 ml, 25 ml, 50 ml)

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır
POXDOLL
Parenteral Uygulama İçin Çözücü

BİLEŞİMİ:
Steril tamponlu fizyolojik tuzlu su

KULLANIM ŞEKLİ:
Liyofilize pelet üzerine çözücü ilave edilir. Köpürtmeden çalkalanır. Enjektöre çekilerek çözücüye geri eklenir.

GENEL UYARILAR:
"Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz"
"Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz"

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ:
Buzdolabına konulmadan, karanlıkta ve 25°C'den düşük sıcaklıkta muhafaza edilir. Dondurmayınız. Raf ömrü 36 ay.

TİCARİ TAKDİM ŞEKİLLERİ:
12,5 ml, 25 ml ve 50 ml çözücü içeren Tip II amber renkli cam şişeler veya beyaz polipropilen plastik şişeler

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİH: 25.06.2007

PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ:
DOLLVET BİYOTEKNOLOJİ A.Ş.
Konaklar Mah. Akasyalı Sok. No:10 Beşiktaş /İSTANBUL

SERİ NO:
ÜRETİM TARİHİ:
SON KULLANMA TARİHİ:

DIŞ AMBALAJ ETİKET BİLGİLERİ

Dış ambalaj etiketi (25 doz, 50 doz, 100 doz)

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır
POXDOLL
Atenüe Canlı Koyun-Keçi Çiçek ve Sığır LSD Aşısı
Enjeksiyonluk Süspansiyon Liyofilizatı ve Çözücüsü

BİLEŞİMİ:

Atenüe SPV(Bk) LK_{63} suşu	$\geq 10^{2,5}$ $DKID_{50}$/doz

KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLAR:
POXDOLL koyun ve keçilerde koyun keçi çiçek hastalığına, sığırlarda ise sığırların nodüler ekzantemine (Lumpy Skin Hastalığı) karşı koruyucu amaçla kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:
Liyofilize pelet üzerine çözücü ilave edilir. Köpürtmeden çalkalanır. Enjektöre çekilerek çözücüye geri eklenir. 6-12 haftalık kuzu ve oğlaklara 0,2 ml, 12 haftalıktan büyük yaştaki koyun ve keçilere 0,5 ml ve 6 aylıktan büyük sığırlara 3 ml miktarında deri altı (subcutan) yolla uygulanır. Büyükbaş hayvanlara boynun yan yüzünün orta kısmına veya omuz gerisindeki hareketsiz bölgeye, koyunlarda arka bacak iç kısmına, keçilerde kuyruk altına deri altı yolla aşılama yapılır.

GIDA DEĞERİ OLAN HAYVANLARDA KALINTI UYARILARI:
Sıfır gündür.

GENEL UYARILAR:
"Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz"
"Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz"

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ:
Enjeksiyonluk süspansiyon liyofilizatı: 2-8ºC'de ve karanlıkta muhafaza edilmelidir. Dondurmayınız.
Raf ömrü 36 aydır.
Parenteral uygulama için çözücü: Buzdolabına konulmadan, karanlıkta ve 25°C'den düşük sıcaklıkta muhafaza edilir. Dondurmayınız.
Raf ömrü 36 aydır.
Sulandırılan aşı 6 saat içinde kullanılmalıdır.

KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR:
Kullanılmış veya arta kalan ürün ve bu ürünün kullanımıyla ortaya çıkan atık materyaller ilgili mevzuata göre imha edilmelidir. Her türlü atık/artık materyal evsel atıklarla ve atık sularla karıştırılmamalı, drenaj sistemlerine ve çevreye atılmamalıdır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKİLLERİ:
Aşı 25, 50 ve 100 dozluk liyofilize pelet içeren Tip I renksiz cam şişelerde; parenteral uygulama için çözücü içeren 12,5 ml, 25 ml ve 50 ml Tip II amber renkli cam şişeler veya beyaz polipropilen plastik şişelerde ambalajlanır. Cam ve plastik şişeler bromobutil tıpa ve alüminyum kapak ile kapatılmış şekilde etiketlenir.
Liyofilize pelet plastik viyol içinde 20'şer adet veya kutulu/kutusuz olarak strafor içerisinde, Parenteral uygulama için çözücü münferit kutulu veya kutusuz olarak strafor içerisinde piyasaya sunulmaktadır.

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİH: 25.06.2007

PAZARLAMA İZİN SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ:
DOLLVET BİYOTEKNOLOJİ A.Ş.
Konaklar Mahallesi Akasyalı Sokak No:10 Beşiktaş/İstanbul
E-mail: dollvet@dollvet.com.tr **Telefon:** +90 212 422 02 01 **Faks:** +90 212 422 00 72

ÜRETİCİ FİRMA VE ADRESİ:
DOLLVET BİYOTEKNOLOJİ A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi Koçören OSB Mahallesi 106. Cadde No:6 Eyyübiye/ŞANLIURFA
E-mail: dollvet@dollvet.com.tr **Telefon:** +90 414 369 11 33 **Faks:** +90 414 369 16 92

SERİ NO:
ÜRETİM TARİHİ:
SON KULLANMA TARİHİ:
KDV DAHİL PERAKENDE SATIŞ FİYATI: