ÜRÜN ÖZELLİKLERİ ÖZETİ

1.VETERİNER BİYOLOJİK ÜRÜNÜN İSMİ

Pascol 10 Enjeksiyonluk Süspansiyon

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Her 2 ml (1 doz) için minimum oranlar aşağıdaki gibidir:

İçerik	Miktar	Fonksiyon
Aktif Maddeler		
Pasteurella multocida (ATCC 15743)	Fareleri virulent kültür enjeksiyonuna karşı PD_{50} log farkı ≥2 koruma	Antijen
Manheimia haemolytica Tip 1 (ATCC 43270)	Fareleri virulent kültür enjeksiyonuna karşı PD_{50} log farkı ≥2 koruma	Antijen
Manheimia haemolytica Tip 2 (ATCC 29694)	Fareleri virulent kültür enjeksiyonuna karşı PD_{50} log farkı ≥2 koruma	Antijen
Clostridium novyi (Pendik Suşu)	İmmunize tavşan serumlarında Alfa antitoksin ≥ 3.5 IU/ml)	Antijen
Clostridium septicum (ATCC 12464)	İmmunize tavşan serumlarında Alfa antitoksin ≥ 2.5 IU/ml	Antijen
Escherichia coli (ATCC 31619)	İmmunize tavşan serumlarında ≥100 AU (Aglutinin Unit) antikor	Antijen
Clostridium perfringens D (Pendik Suşu)	İmmunize tavşan serumlarında Epsilon antitoksin ≥ 5.0 IU/ml	Antijen
*Clostridium perfringens C (*Pendik Suşu)	İmmunize tavşan serumlarında Beta antitoksin ≥ 10.0 IU/ml	Antijen
Clostridium perfringens B Refik Saydam Hıfzısıhha (RSKK 502/4)	İmmunize tavşan serumlarında Beta antitoksin ≥ 10.0 IU/ml Epsilon antitoksin ≥5.0 IU/ml	Antijen
Clostridium chauvoei (Pendik No:20)	kobayları virulent kültür enjeksiyonuna karşı %90 koruma	Antijen
Yardımcı maddeler		
Alüminyum Hidroksit	1.8 mg/ml Alüminyum	Adjuvant
Thiomersal	% 0,01	Koruyucu

Tüm yardımcı maddeler için Bölüm 6.1' e bakınız.

3. FARMASÖTİK ŞEKİL

Enjeksiyonluk Süspansiyon. Üst kısım berrak, alt kısım opak, çalkalandığında homojen ve opak görünümdedir.

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1 Hedef tür

Sığır, koyun ve keçiler.

4.2 Her bir hedef tür için kullanım alanı

Sağlıklı sığır, koyun ve keçilerde Pascol 10 aşısı, *Pasteurella multocida* ve *Mannheimia haemolytica* etkenlerinin neden olduğu Pasteurellozis, *Clostridium chauvoei'*nin neden

olduğu Yanıkara (Blackleg), *Clostridium septicum*'un neden olduğu Malign Odema (Malignant Ödem) / Bradzot Hastalığı, *Clostridium novyi (oedematiens)*' nin neden olduğu İnfeksiyöz Nekrotik Hepatitis (Black Disease; Kara Hastalık), *Clostridium perfringens* Tip B, C ve D'nin neden olduğu Enterotoksemi ve *Escherichia coli*'nin neden olduğu ishallere karşı aktif bağışıklık sağlama, hastalığın mortalite, klinik bulgular ve lezyonlarının azaltılması amacıyla; sağlıklı sığır, koyun ve keçilere uygulanır.

4.3 Kontraendikasyonlar
Bilgi bulunmamaktadır.

4.4 Her bir hedef tür için özel uyarılar

4.5 Kullanıma ilişkin özel uyarılar
(i) Hayvanlarda kullanıma ilişkin özel uyarılar
3 aylıktan büyük sağlıklı sığır, koyun ve keçilere uygulanmalıdır. Aşı kullanım öncesi oda sıcaklığına getirilmelidir. Donmuş ve soğuk zincir dışına çıkmış, ambalaj bütünlüğü bozulmuş şişeler kesinlikle kullanılmamalıdır. Aşı kullanılmadan önce ve kullanım süresince çalkanarak homojenize edilmelidir. Aşı uygulamasında asepsi ve antisepsi kurallarına uyulmalıdır.

(ii) Ürünü uygulayana ilişkin özel uyarılar
Aşı uygulayıcı için zararsızdır.

(iii) Diğer uyarılar

4.6 İstenmeyen etkiler (sıklık ve siddet)
Aşılamadan sonra yaygın olarak kısa süreli hafif beden ısı artışı ile enjeksiyon bölgesinde sınırlı, giderek azalan şişkinlikler normal aşı reaksiyonudur. Çok seyrek olarak aşırı duyarlılık ve anafilaktik reaksiyonlar oluşabilir. Bu gibi durumlarda adrenalin veya benzeri preparatlar uygulanmalıdır.

4.7 Gebelik, laktasyon ve yumurtlama döneminde kullanım
Gebelik ve laktasyon süresince kullanılabilir. Ancak aşılama işlemi esnasında yaratılacak olan stres nedeniyle gebeliğin son dönemlerinde uygulanması önerilmemektedir.

4.8 Diğer ilaçlarla etkileşimi ve diğer etkileşim şekilleri
Diğer aşılarla birlikte kullanıldığında etkileşimi hakkında bilgi bulunmamaktadır. Bu nedenle ürünün diğer ürünlerle aynı günde veya farklı zamanlarda kullanımının etkili ve güvenilir olduğu ispatlanmamıştır.

4.9 Dozaj ve kullanım yolu
3 aylıktan büyük sağlıklı sığırlara 4 ml, koyun ve keçilere 2 ml miktarında deri altı yolla uygulanır. İlk dozun uygulanmasından 2-4 hafta sonra ikinci doz uygulanır. 3 ayın altındaki hayvanlar aşılanırsa, maternal antikorlar göz önüne alınarak, sütten kesme zamanında veya 4-6 aylık olduğunda aşılama tekrarlanmalıdır.

4.10 Doz aşımı, varsa semptomlar, acil prosedürler, antidotlar (gerekli ise)
Önerilen dozunun 2 katı kullanımı hedef türlerde yapılan çalışmalarla güvenli bulunmuştur. Gerekli durumlarda adrenalin ve benzeri preparatlar kullanılmalıdır.

4.11. Kalıntı arınma süreleri
Sıfır gün

5. İMMUNOLOJİK ÖZELLİKLER
Farmaterapötik grup: Sığır, Koyun ve Keçilerin Pasteurellozis, Yanıkara, Malign Ödem, Nekrotik Hepatitis, Enterotoksemi ve E. coli İshallerine Karşı İnaktif Bakteriyel Aşı
QI Immunologicals
ATCvet Code: QI02AC(Sığır), QI04AC(Koyun), QI03AC(Keçi)

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1 Yardımcı maddeler:
Formaldehit
Alüminyum Hidroksit
Thiomersal
WFI

6.2 Geçimsizlikler
Herhangi başka bir ürünle karıştırılmamalı ve birlikte uygulanmamalıdır.

6.3 Raf ömrü
Satışa Sunulmuş Haliyle Raf Ömrü: 2 (iki) yıldır.

6.4 Muhafaza şartları
İç Ambalaj Açıldıktan Sonraki Raf Ömrü: Açılan aşı şişeleri aynı gün içerisinde kullanılmalıdır. +2/+8 ºC' de buzdolabında ve karanlıkta saklanmalıdır. Dondurmayınız. Kullanım süresince soğuk zincir korunmalıdır. Açılan şişeler +2/+8 ºC' de muhafaza edilmelidir.

6.5 Birincil ambalajın niteliği ve kompozisyonu
50 ml ve 100 ml'lik farmasötik tip II cam şişeler ile 250 ml ve 500 ml'lik polipropilen plastik şişelerde, bütil tıpa ve alüminyum kapak ile kapatılarak etiketlenir. Aşılar kutusuz olarak strafor kutularda prospektüsleriyle takdim edilir.

6.6 Kullanılmış veya arta kalan ürünün imhasına ilişkin özel önlemler
Ürünün kullanımı sonrasında atık materyaller, yürürlükteki atık yönetmeliğine göre tıbbi atık olarak imha edilmelidir.

7. PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ
Ata Fen Veteriner Malzemeleri Hayvancılık Pazarlama ve Ticaret A.Ş.,
Adres: OSB Mah. 21 Sk. No:7/A, Kemalpaşa / İzmir
Tel: (232) 877 21 61 (PBX) | Faks: (232) 877 20 43 | e-mail: info@atafen.com.tr

8. PAZARLAMA İZNİ NUMARASI:
---

9. PAZARLAMA İZNİ TARİHİ, GÜNCELLEME VE YENİLEME TARİHİ:
15.12.2021

10. METİN DEĞİŞİKLİK TARİHİ: 19.08.2026

PROSPEKTÜS

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır
Pascol 10
Enjeksiyonluk Süspansiyon
Sığır, Koyun ve Keçilerin Pasteurellozis,
Yanıkara, Malign Ödem, Nekrotik Hepatitis,
Enterotoksemi ve E. coli İshallerine Karşı İnaktif Bakteriyel Aşı

BİLEŞİMİ: Üst kısım berrak, alt kısım opak, çalkalandığında homojen ve opak görünümdedir.
Aktif Maddeler: 1 doz (2 ml) için minimum oranlar;

Pasteurella multocida	*Farelerde PD50 log≥2 koruma*
Mannheimia haemolytica Tip 1	*Farelerde PD50 log≥2 koruma*
Mannheimia haemolytica Tip 2	*Farelerde PD50 log≥2 koruma*
*Clostridium novyi Alfa antitoksin**	*≥ 3.5 IU/ml*
*Clostridium septicum Alfa antitoksin**	*≥ 2.5 IU/ml*
Clostridium perfringens tip B	*≥ 10 IU/ml Beta ve ≥ 5 IU/ml Epsilon antitoksin**
Clostridium perfringens tip C	*≥ 10 IU/ml Beta antitoksin**
Clostridium perfringens tip D	*≥ 5 IU/ml Epsilon antitoksin**
Clostridium chauvoei	*Kobaylarda en az %90 koruma*
Escherichia coli	*≥100 AU (Aglutinin Unit)**
Thiomersal	% 0.01 Koruyucu

**: İmmunize tavşan serumlarındaki koruyucu yanıtlardır.*

Formaldehit ile inaktive edilmiştir. Alüminyum Hidroksit jele absorbe edilmiştir.

İMMUNOLOJİK ÖZELLİKLER
Pasteurella multocida ve *Mannheimia haemolytica* etkenlerinin neden olduğu Pasteurellozis, *Clostridium chauvoei'nin* neden olduğu Yanıkara (Blackleg), *Clostridium septicum*'un neden olduğu Malign Odema (Malignant Ödem)/ Bradzot Hastalığı), *Clostridium novyi (oedematiens)*' nin neden olduğu İnfeksiyöz Nekrotik Hepatitis (Black Disease; Kara Hastalık), *Clostridium perfringens* Tip B, C ve D'nin neden olduğu Enterotoksemi ve *Escherichia coli*'nin neden olduğu ishallere karşı aktif bağışıklık sağlama amacıyla; sağlıklı sığır, koyun ve keçilere uygulanır.

KULLANIM SAHASI/ENDİKASYONLAR
Sağlıklı sığır, koyun ve keçilere *Pasteurella multocida* ve *Mannheimia haemolytica* etkenlerinin neden olduğu Pasteurellozis, *Clostridium chauvoei'nin* neden olduğu Yanıkara (Blackleg), *Clostridium septicum*'un neden olduğu Malign Odema (Malignant Ödem)/ Bradzot Hastalığı), *Clostridium novyi (oedematiens)*' nin neden olduğu İnfeksiyöz Nekrotik Hepatitis (Black Disease; Kara Hastalık), *Clostridium perfringens* Tip B, C ve D'nin neden olduğu Enterotoksemi ve *Escherichia coli*'nin neden olduğu ishallere karşı aktif bağışıklık sağlama amacıyla uygulanır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
3 aylıktan büyük sağlıklı sığırlara 4 ml, koyun ve keçilere deri altı yolla 2 ml miktarında uygulanır. İlk dozun uygulanmasından 2-4 hafta sonra ikinci doz uygulanır. 3 ayın altındaki hayvanlar aşılanırsa, maternal antikorlar göz önüne alınarak, sütten kesme zamanında veya 4-6 aylık olduğunda aşılama tekrarlanmalıdır.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN UYARILAR
3 aylıktan büyük sağlıklı hayvanlara uygulanmalıdır. Aşı kullanım öncesi oda sıcaklığına getirilmelidir. Aşı soğuk zincirde taşınmalı veya muhafaza edilmelidir. Donmuş ve soğuk zincir dışına çıkmış aşılar kullanılmamalıdır. Ambalaj bütünlüğü bozulmuş şişeler kesinlikle kullanılmamalıdır. Aşı kullanılmadan önce ve kullanım süresince çalkanarak homojenize edilmelidir. Aşının uygulamasında asepsi ve antisepsi kurallarına uyulmalıdır.

Gebelik, laktasyon ve yumurtlama döneminde kullanım

Gebelik ve laktasyon süresince kullanılabilir. Ancak aşılama işlemi esnasında yaratılacak olan stres nedeniyle gebeliğin son dönemlerinde uygulanması önerilmemektedir.

İSTENMEYEN ETKİLER
Aşılamadan sonra kısa süreli hafif beden ısı artışı ile enjeksiyon bölgesinde sınırlı şişkinlikler normal aşı reaksiyonudur. Çok seyrek olarak aşırı duyarlılık ve anafilaktik reaksiyonlar oluşabilir. Bu gibi durumlarda adrenalin veya benzeri preparatlar uygulanmalıdır.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ
Diğer aşılarla birlikte kullanıldığında etkileşimi hakkında bilgi bulunmamaktadır. Bu nedenle ürünün diğer ürünlerle aynı günde veya farklı zamanlarda kullanımının etkili ve güvenilir olduğu ispatlanmamıştır. Herhangi başka bir ürünle karıştırılmamalı ve birlikte uygulanmamalıdır.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT
Aşının önerilen dozunun 2 katı kullanımı hedef türlerde yapılan çalışmalarla güvenli bulunmuştur. Gerekli durumlarda adrenalin ve benzeri preparatlar kullanılmalıdır.

GIDA DEĞERİ OLAN HAYVANLARDA KALINTI UYARILARI
0 (sıfır) gündür.

KONTRENDİKASYONLAR
Bilgi bulunmamaktadır.

GENEL UYARILAR
"Çocukların ulaşamayacağı ve göremeyeceği bir yerde muhafaza ediniz."
"Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız"

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN ÖNERİLER
Aşı uygulayıcı için zararsızdır.

MUHAFAZA KOŞULLARI VE RAF ÖMRÜ
+2/+8 ºC sıcaklıkta, buzdolabında ve karanlıkta saklayınız. Dondurmayınız. Açıldıktan sonra aynı gün içerisinde tüketilmelidir. Açılan şişeler +2/+8 ºC' de buzdolabında açılmamış ürün şartlarında muhafaza edilmelidir. Kullanım süresince soğuk zincir korunmalıdır. Raf ömrü 2 yıldır.

KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR
Ürünün kullanımı sonrasında artık materyaller, yürürlükteki atık yönetmeliğine göre tıbbi atık olarak imha edilir. Hedef türler dışında kullanılmamalıdır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKİLLERİ
50 ml ve 100 ml farmasötik tip II cam şişeler ile 250 ml ve 500 ml'lik polipropilen plastik şişeler bütil tıpa ve alüminyum kapak ile kapatılarak etiketlenir. Aşılar kutusuz olarak strafor kutularda prospektüsleriyle satışa sunulur.

PROSPEKTÜSÜN ONAY TARİHİ: 19.08.2026

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİHİ VE NO: 15.12.2021

PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI, ADRESİ: ATA FEN Veteriner Malzemeleri Hayvancılık Pazarlama ve Ticaret A.Ş.
OSB Mah. 21. Sok. No: 7/A, 35735 Kemalpaşa / İzmir / Türkiye

ÜRETİCİ FİRMA VE ADRESİ: ATA FEN Veteriner Malzemeleri Hayvancılık Pazarlama ve Ticaret A.Ş.
OSB Mah. 21. Sok. No: 7/A, 35735 Kemalpaşa / İzmir / Türkiye

100, 250 ve 500 ml Etiket Bilgileri

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır
Pascol 10
Enjeksiyonluk Süspansiyon
Sığır, Koyun ve Keçilerin Pasteurellozis,
Yanıkara, Malign Ödem, Nekrotik Hepatitis,
Enterotoksemi ve E. coli İshallerine Karşı İnaktif Bakteriyel Aşı

BİLEŞİMİ: 1 doz (2 ml) için minimum oranlar;

Pasteurella multocida	*Farelerde PD50 log≥2 koruma*
Mannheimia haemolytica Tip 1	*Farelerde PD50 log≥2 koruma*
Mannheimia haemolytica Tip 2	*Farelerde PD50 log≥2 koruma*
*Clostridium novyi Alfa antitoksin**	*≥ 3.5 IU/ml*
*Clostridium septicum Alfa antitoksin**	*≥ 2.5 IU/ml*
Clostridium perfringens tip B	*≥ 10 IU/ml Beta ve ≥ 5 IU/ml Epsilon antitoksin**
Clostridium perfringens tip C	*≥ 10 IU/ml Beta antitoksin**
Clostridium perfringens tip D	*≥ 5 IU/ml Epsilon antitoksin**
Clostridium chauvoei	*Kobaylarda en az %90 koruma*
Escherichia coli	*≥100 AU (Aglutinin Unit)**
Thiomersal	% 0.01 Koruyucu

**: İmmunize tavşan serumlarındaki koruyucu yanıtlardır.*

Formaldehit ile inaktive edilmiştir. Alüminyum Hidroksit jele absorbe edilmiştir. Hedef hayvanlara uygulandığında aktif maddelerin neden olduğu hastalıklara karşı aktif bağışıklık sağlar.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
2-4 hafta arayla 3 aylıktan büyük sağlıklı sığırlara 4 ml, koyun ve keçilere 2 ml miktarında deri altı yolla uygulanır. 3 ayın altındaki hayvanlar aşılanması durumunda, sütten kesme zamanında veya 4-6 aylık olduğunda aşılama tekrarlanmalıdır.

GENEL UYARILAR
"Çocukların ulaşamayacağı ve göremeyeceği bir yerde muhafaza ediniz."
"Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz"
"Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız"

GIDA DEĞERİ OLAN HAYVANLARDA KALINTI UYARILARI
0 (sıfır) gündür.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ
+2/+8 ºC sıcaklıkta, buzdolabında ve karanlıkta saklayınız. Dondurmayınız. Açıldıktan sonra aynı gün içerisinde tüketilmelidir. Kullanım süresince soğuk zincir korunmalıdır. Açılan şişeler +2/+8 ºC' de muhafaza edilmelidir. Raf ömrü 2 yıldır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKİLLERİ
50 ml ve 100 ml farmasötik tip II cam şişeler ile 250 ml ve 500 ml'lik polipropilen plastik şişeler bütil tıpa ve alüminyum kapak ile kapatılarak etiketlenir.

KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR
Ürünün kullanımı sonrasında artık materyaller, yürürlükteki atık yönetmeliğine göre tıbbi atık olarak imha edilir. Hedef türler dışında kullanılmamalıdır.

TC. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZİN TARİHİ VE NO: 15.12.2021

PAZARLAMA İZİN SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA ADI, ADRESİ:
ATA FEN Veteriner Malzemeleri Hayvancılık Pazarlama ve Sanayi Ticaret A.Ş.
Adres: OSB Mah. 21 Sk. No:7/A Ulucak-Kemalpaşa / İzmir.
Tel: (232) 877 21 61 (PBX) | Faks: (232) 877 20 43

SERİ NUMARASI:
ÜRETİM TARİHİ:
SON KULLANMA TARİHİ:

50 ml Etiket Bilgileri

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır
Pascol 10
Enjeksiyonluk Süspansiyon
Sığır, Koyun ve Keçilerin Pasteurellozis,
Yanıkara, Malign Ödem, Nekrotik Hepatitis,
Enterotoksemi ve E. coli İshallerine Karşı İnaktif Bakteriyel Aşı

BİLEŞİMİ: 1 doz (2 ml) için minimum oranlar;

Pasteurella multocida	*Farelerde PD50 log≥2 koruma*
Mannheimia haemolytica Tip 1	*Farelerde PD50 log≥2 koruma*
Mannheimia haemolytica Tip 2	*Farelerde PD50 log≥2 koruma*
*Clostridium novyi Alfa antitoksin**	*≥ 3.5 IU/ml*
*Clostridium septicum Alfa antitoksin**	*≥ 2.5 IU/ml*
Clostridium perfringens tip B	*≥ 10 IU/ml Beta ve ≥ 5 IU/ml Epsilon antitoksin**
Clostridium perfringens tip C	*≥ 10 IU/ml Beta antitoksin**
Clostridium perfringens tip D	*≥ 5 IU/ml Epsilon antitoksin**
Clostridium chauvoei	*Kobaylarda en az %90 koruma*
Escherichia coli	*≥100 AU (Aglutinin Unit)**
Thiomersal	% 0.01 Koruyucu

**: İmmunize tavşan serumlarındaki koruyucu yanıtlardır.*

Sığırlar, koyun ve keçilerde derialtı yolla uygulanır.
Ayrıntılı bilgi için prospektüsü okuyunuz.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ
+2/+8 ºC sıcaklıkta, buzdolabında ve karanlıkta saklayınız. Dondurmayınız. Açıldıktan sonra aynı gün içerisinde tüketilmelidir. Kullanım süresince soğuk zincir korunmalıdır. Açılan şişeler +2/+8 ºC' de muhafaza edilmelidir. Raf ömrü 2 yıldır.

TC. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZİN TARİHİ VE NO: 15.12.2021

PAZARLAMA İZİN SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA ADI, ADRESİ:
ATA FEN Veteriner Malzemeleri Hayvancılık Pazarlama ve Sanayi Ticaret A.Ş.
Adres: OSB Mah. 21 Sk. No:7/A Ulucak-Kemalpaşa / İzmir.
Tel: (232) 877 21 61 (PBX) | Faks: (232) 877 20 43

SERİ NUMARASI:
ÜRETİM TARİHİ:
SON KULLANMA TARİHİ:

Strafor Etiket Bilgileri

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır
Pascol 10
Enjeksiyonluk Süspansiyon
Sığır, Koyun ve Keçilerin Pasteurellozis,
Yanıkara, Malign Ödem, Nekrotik Hepatitis,
Enterotoksemi ve E. coli İshallerine Karşı İnaktif Bakteriyel Aşı

TİCARİ TAKDİM ŞEKİLLERİ:
50 ml ve 100 ml farmasötik tip II cam şişeler ile 250 ml ve 500 ml'lik polipropilen plastik şişeler bütil tıpa ve alüminyum kapak ile kapatılarak etiketlenir. Aşılar kutusuz olarak strafor kutularda prospektüsleriyle satışa sunulur.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ
+2/+8 ºC sıcaklıkta, buzdolabında ve karanlıkta saklayınız. Dondurmayınız. Açıldıktan sonra aynı gün içerisinde tüketilmelidir. Kullanım süresince soğuk zincir korunmalıdır. Açılan şişeler +2/+8 ºC' de muhafaza edilmelidir. Raf ömrü 2 yıldır.

TC. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZİN TARİHİ: 15.12.2021

PAZARLAMA İZİN SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA ADI, ADRESİ:
ATA FEN Veteriner Malzemeleri Hayvancılık Pazarlama ve Sanayi Ticaret A.Ş.
Adres: OSB Mah. 21 Sk. No:7/A Ulucak-Kemalpaşa / İzmir.
Tel: (232) 877 21 61 (PBX) | Faks: (232) 877 20 43