1. VETERİNER TIBBİ ÜRÜNÜN İSMİ
POXVAC® Enjeksiyonluk Çözelti Liyofilizatı ve Sulandırıcısı

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM
1 doz (0,5 ml) aşıda,

Etkin madde:
Attenüe koyun keçi çiçeği virus suşu SP(Bk)LK65 suşu $\geq 10^{2,5}$ $TCID_{50}$

Tüm yardımcı maddeler için Bölüm 6.1'e bakınız.

3. FARMASÖTİK ŞEKİL
Enjeksiyonluk Çözelti Liyofilizatı ve Sulandırıcısı

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1. Hedef türler
Sığır, koyun, kuzu, keçi ve oğlak

4.2. Her bir hedef tür için kullanım alanı
POXVAC® Aşısı; koyun ve kuzularda koyun çiçek hastalığına, keçi ve oğlaklarda keçi çiçek hastalığına ve sığırların LSD (Lumpy Skin Disease) hastalığına karşı koruyucu amaçla kullanılır.

4.3 Kontrendikasyonlar
Aşı önerilen dozlarda kullanıldığında etkin maddesi veya aşı muhteviyatına karşı bilinen bir kontraendikasyon bulunmamaktadır.

4.4. Her bir hedef tür için özel uyarılar
Aşı, koyun, kuzu, keçi, oğlak ve sığırlarda kullanılmak üzere hazırlanmıştır. Aşı uygulamasına ilişkin ırk, cinsiyet ve fizyolojik durumla ilgili kısıtlama bulunmamaktadır. Yoğun stres ve kötü bakım koşulları aşıdan elde edilecek bağışıklığın beklenen düzeylere ulaşmasını engelleyebilir. İmmun sistemi baskılayıcı ilaçlar ve kortikosteroidlerle eş veya yakın zamanlı kullanılmamalıdır. Bu durumda aşıdan beklenen korunma düzeyi sağlanamayabilir. Söz konusu etki bazı antibiyotiklerle tedavi sürecindeki hayvanlarda da ortaya çıkabilir. Diğer aşılarla (canlı, inaktif/ viral, bakterin, toksoid) birlikte uygulanmasına yönelik yeteri düzeyde çalışma bulunmamaktadır.

4.5. Kullanıma ilişkin özel uyarılar
(i) **Hayvanlarda kullanımına ilişkin özel uyarılar**
Aşı uygulaması sadece sağlıklı hayvanlara yapılmalıdır. Yüksek ateş ve hastalık bulguları gösteren hayvanlar sürüden ayrılmalı ve aşılanmamalıdır. Enjeksiyon yeri antiseptiklere temizlendikten sonra aşı iyice çalkalanarak uygulanmalıdır.
Kuzular ve oğlaklar da hastalığa duyarlı olduğu için aşılama programına dâhil edilmelidir. Aşılamadan sonra geçici bir ateş yükselmesi ile uygulama bölgesinde sert veya yumuşak şişlikler (0.2-5 cm çapında) ve kuru nekrotik kabukların oluşması normal sayılır.

(ii) Ürünü uygulayana ilişkin özel uyarılar
POXVAC aşısının içeriğinden veya üretim aşamalarındaki uygulamalardan dolayı insanlara (uygulayıcı kişi) yansıyabilecek bir risk bulunmamaktadır. Aşı etkin maddesi olan koyun keçi virusu zoonotik özelliğe sahip değildir. Bu virusların kullanımıyla hazırlanan aşıların uygulandığı ülkelerde uygulayıcılar için bildirilmiş herhangi bir risk bulunmamaktadır. Ancak iyi hekimlik uygulaması gereğince aşılama sırasında cilt, göz ve giysilerin aşı materyaliyle temasından kaçınılmalıdır.

4.6. İstenmeyen etkiler (sıklık ve şiddet)
Aşılamadan sonra geçici bir ateş yükselmesi ile uygulama bölgesinde sert veya yumuşak şişlikler (0.2-5 cm çapında) ve kuru nekrotik kabukların oluşması normal sayılır. Nadir durumlarda ferdi olarak lokal ve genel aşı reaksiyonları görülebilir. Bu reaksiyonlar gecikmiş tip hipersensitivite reaksiyonları olup genellikle aşılama sonrası 4. günde ortaya çıkabilir. Bu tür vakaların beklenen oranı %0,01-0,1 aralığındadır. Aşı yapılan hayvanların takip edilmesi lokal veya genel reaksiyon gösterenlerin ayrılarak Veteriner Hekim gözetiminde anti-alerjik tedaviye alınması önerilir.

4.7. Gebelik, laktasyon ve yumurtlama döneminde kullanım
Gebe hayvanlarda aşı kullanımı genel olarak güvenlidir. İleri gebe hayvanlarla yapılan deneysel çalışmalarda gebeliğe yönelik istenmeyen etki (yavru atma, anomalili doğum vb) gözlenmemiştir. Ancak gebeliğin son 6 haftasında ve doğumdan sonraki ilk ayda, hastalık çıkmayan yerlerde koruyucu aşılama yapılmamalıdır.
Zorunlu durumlarda epidemi önleme ve fayda/zarar ilişkileri gözetilerek aşılama uygulaması önerilir. POXVAC aşılarının tohumlama başarısı ve gebe kalma oranları gibi reprodüktif parametreler üzerine bilinen olumsuz bir etkisi bulunmamaktadır.

4.8. Diğer tıbbi ürünlerle etkileşim ve diğer etkileşim şekilleri
Diğer aşılarla kullanıldığında (aynı gün ya da farklı zamanlarda) bu ürünün güvenliği ve etkinliği bilinmemektedir. Genel bir yaklaşımda aşının uygulanmasından 14 gün önce ve 14 gün sonrasında başka bir tıbbi ürünün uygulanması önerilmez.

4.9. Dozaj ve kullanım yolu
Aşı, 6-12 haftalık sağlıklı kuzu ve oğlaklara 0,2 ml, 3 aylıktan büyüklere 0,5 ml olarak uygulanır. Aşı, koyun ve kuzularda koltuk altına yünsüz bölgeye, keçi ve oğlaklarda kuyruk altına deri altı yolla tatbik edilir. Aşı, sığırlara boyun bölgesinde skapulanın önünden, deri altı yolla 3 ml uygulanır. Aşı, kullanılacağı zaman kuru aşı aseptik olarak diluentinden alınan bir miktar sıvı ile sulandırılır, köpürtmeden çalkalanır, tekrar enjektörle geri çekilerek sulandırma sıvısına ilave edilir.

4.10. Doz aşımı, varsa semptomlar, acil prosedürler, antidotlar (gerekli ise)
10 doz aşı uygulaması yapılan hayvanlarda herhangi bir olumsuz bulgu gözlemlenmemiş olup; 10 doza kadar güvenli bir şekilde kullanılabilir.

4.11. Kalıntı arınma süreleri (sıfır gün olanlar da dâhil)
Sıfır (0) gün.

5. İMMUNOLOJİK ÖZELLİKLER
Farmakoterapötik Grup: Keçi ve koyunlarda canlı viral aşılar, sığırlarda canlı viral aşılar
ATCvet Kodu: QI03AD, QI04AD, QI02AD

Koyun-keçi çiçek virusuyla yapılan aşılamalarda hümoral yanıt ortaya çıkar. Aşıda yer alan virusun attenüe bir etken olması, bu virusun vücutta çoğalarak güçlü bir bağışıklık oluşturmasının temel nedenidir. Nötralizan antikor saptanamayan veya düşük düzeyde bulunan hayvanların patojen çelınç uygulamalarında korunması mümkündür. Bu durum koyun-keçi çiçek virusuna karşı hücresel immunitenin koruyucu olduğuna işaret eder.

6.FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1 Yardımcı maddeler

Liyofilize aşı:
Laktalbumin hidrolizat
Sükroz

Sulandırma sıvısı:
Sodyum Klorür
Potasyum Klorür
Disodyum hidrojen fosfat
Potasyum dihidrojen fosfat
Enjeksiyonluk su

6.2 Geçimsizlikler

Ürünün sulandırıcısı ve ürünle sağlanan diğer komponentler dışında herhangi bir tıbbi ürünle karıştırılmaması önerilir.

6.3 Raf ömrü

Satışa sunulmuş haliyle raf ömrü: 36 ay
Sulandırma sıvısının raf ömrü: 24 ay
Sulandırılan aşının raf ömrü: 2 saat

6.4 Muhafaza şartları

Liyofilize aşı; 2 – 8 °C'de saklanmalıdır ve güneş ışığından korunmalıdır.Dondurulmamalıdır. Sulandırıcı, karanlık ve kuru bir yerde, 25 °C'nin altında buzdolabına konulmadan, dondurulmadan muhafaza edilmelidir.

6.5 Birincil ambalajın niteliği ve kompozisyonu

Karton kutu içerisinde, 20 dozluk liyofilize aşılar 10 ml; 50 dozluk liyofilize aşılar 25 ml, 100 dozluk liyofilize aşılar 50 ml ve 200 dozluk liyofilize aşılar 100 ml sulandırma sıvısı ile birlikte ambalajlanmıştır. Liyofilize kısım için Tip I veya Tip II nötr cam şişe, sulandırma sıvısı şişeleri cam ve/veya polietilen/polipropilen plastik şişeler kullanılmıştır. Şişelerin ağzı butil plastikten yapılmış tıpalar ve alüminyum kapaklar ile kapatılmıştır.

6.6 Kullanılmış veya arta kalan ürünlerin imhasına ilişkin özel önlemler

Kullanılmış veya arta kalan ürün ilgili mevzuata göre imha edilmelidir. İmha işlemi iki aşamada gerçekleşir. İlk olarak 1.2 atm basınç altında 121 ^{o}C'de 1 saat süreyle otoklav işlemi uygulanır. Son olarak biyolojik atık sistemine gönderilir veya foseptik çukurlara gömülür. Kullanılan iğne ve enjektörlerin imhası için otoklavlama, yakma, biyolojik imha prosesi veya foseptik çukurlara gömme işlemi uygulanmalıdır.

7. PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ

VETAL Hayvan Sağlığı Ürünleri A.Ş.
Petrolosb.Mah. 14. Cad.No.1/1 Adıyaman
Telefon: +90 416 223 2030- 223 2488 Faks:+90 416 223 1456
Web: www.vetal.com.tr E-mail: vetal@vetal.com.tr

8. PAZARLAMA İZNİ NUMARASI

-

9. PAZARLAMA İZNİNİN İLK VERİLME VEYA YENİLEME TARİHİ

10.11.2004

10. METİN DEĞİŞİKLİK TARİHİ

11.11.2025

PROSPEKTÜS

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır

POXVAC®

Enjeksiyonluk Çözelti Liyofilizatı ve Sulandırıcısı

Koyun ve keçilerin çiçek hastalığına,ve sığırların LSD (Lumpy Skin Disease) hastalığına karşı koruyucu canlı aşı

BİLEŞİMİ

1 doz (0,5 ml) aşıda:

Etkin madde:

Attenüe koyun keçi çiçeği virus suşu SP(Bk)LK65 suşu	$\geq 10^{2,5}$ $TCID_{50}$

Yardımcı maddeler:

Laktalbumin hidrolizat	0,125 – 1,25 mg
Sükroz	0,25 – 2,5 mg

Sulandırma Sıvısının Bileşimi:

Bir doz sulandırma sıvısı içinde; Sodyum Klorür 8 mg, Potasyum Klorür 0,2 mg, Disodyum hidrojen fosfat 1,15 mg, Potasyum dihidrojen fosfat 0,2 mg, Enjeksiyonluk su (hacim tamamlayıcısı) içerir.

KULLANIM SAHASI/ ENDİKASYONLAR

POXVAC® Aşısı; koyun ve kuzularda koyun çiçek hastalığına, keçi ve oğlaklarda keçi çiçek hastalığına ve sığırların LSD (Lumpy Skin Disease) hastalığına karşı koruyucu amaçla kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Aşı, 6-12 haftalık sağlıklı kuzu ve oğlaklara 0,2 ml, 3 aylıktan büyüklere 0,5 ml olarak uygulanır. Aşı, koyun ve kuzularda koltuk altına yünsüz bölgeye, keçi ve oğlaklarda kuyruk altına deri altı yolla tatbik edilir. Aşı, sığırlara boyun bölgesinde skapulanın önünden, deri altı yolla 3 ml uygulanır. Aşı, kullanılacağı zaman kuru aşı aseptik olarak diluentinden alınan bir miktar sıvı ile sulandırılır, köpürtmeden çalkalanır, tekrar enjektörle geri çekilerek sulandırma sıvısına ilave edilir.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL UYARILAR

Aşı, koyun, kuzu, keçi, oğlak ve sığırlarda kullanılmak üzere hazırlanmıştır. Aşı uygulamasına ilişkin ırk, cinsiyet ve fizyolojik durumla ilgili kısıtlama bulunmamaktadır. Yoğun stres ve kötü bakım koşulları aşıdan elde edilecek bağışıklığın beklenen düzeylere ulaşmasını engelleyebilir. İmmun sistemi baskılayıcı ilaçlar ve kortikosteroidlerle eş veya yakın zamanlı kullanılmamalıdır. Bu durumda aşıdan beklenen korunma düzeyi sağlanamayabilir. Söz konusu etki bazı antibiyotiklerle tedavi sürecindeki hayvanlarda da ortaya çıkabilir. Diğer aşılarla (canlı, inaktif/ viral, bakterin, toksoid) birlikte uygulanmasına yönelik yeteri düzeyde çalışma bulunmamaktadır.

Aşı uygulaması sadece sağlıklı hayvanlara yapılmalıdır. Yüksek ateş ve hastalık bulguları gösteren hayvanlar sürüden ayrılmalı ve aşılanmamalıdır. Enjeksiyon yeri antiseptiklere temizlendikten sonra aşı iyice çalkalanarak uygulanmalıdır.
Kuzular ve oğlaklar da hastalığa duyarlı olduğu için aşılama programına dâhil edilmelidir.
Aşılamadan sonra geçici bir ateş yükselmesi ile uygulama bölgesinde sert veya yumuşak şişlikler (0.2-5 cm çapında) ve kuru nekrotik kabukların oluşması normal sayılır.

Gebelik ve laktasyon döneminde kullanım
Gebe hayvanlarda aşı kullanımı genel olarak güvenlidir. İleri gebe hayvanlarla yapılan deneysel çalışmalarda gebeliğe yönelik istenmeyen etki (yavru atma, anomalili doğum vb) gözlenmemiştir. Ancak gebeliğin son 6 haftasında ve doğumdan sonraki ilk ayda, hastalık çıkmayan yerlerde koruyucu aşılama yapılmamalıdır.
Zorunlu durumlarda epidemi önleme ve fayda/zarar ilişkileri gözetilerek aşılama uygulaması önerilir. POXVAC aşılarının tohumlama başarısı ve gebe kalma oranları gibi reprodüktif parametreler üzerine bilinen olumsuz bir etkisi bulunmamaktadır.

İSTENMEYEN ETKİLER
Aşılamadan sonra geçici bir ateş yükselmesi ile uygulama bölgesinde sert veya yumuşak şişlikler (0.2-5 cm çapında) ve kuru nekrotik kabukların oluşması normal sayılır. Nadir durumlarda ferdi olarak lokal ve genel aşı reaksiyonları görülebilir. Bu reaksiyonlar gecikmiş tip hipersensitivite reaksiyonları olup genellikle aşılama sonrası 4. günde ortaya çıkabilir. Bu tür vakaların beklenen oranı %0,01-0,1 aralığındadır. Aşı yapılan hayvanların takip edilmesi lokal veya genel reaksiyon gösterenlerin ayrılarak Veteriner Hekim gözetiminde anti-alerjik tedaviye alınması önerilir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ
Diğer aşılarla kullanıldığında (aynı gün ya da farklı zamanlarda) bu ürünün güvenliği ve etkinliği bilinmemektedir. Genel bir yaklaşımda aşının uygulanmasından 14 gün önce ve 14 gün sonrasında başka bir tıbbi ürünün uygulanması önerilmez. Ürünün sulandırıcısı ve ürünle sağlanan diğer komponentler dışında herhangi bir tıbbi ürünle karıştırılmaması önerilir.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT
10 doz aşı uygulaması yapılan hayvanlarda herhangi bir olumsuz bulgu gözlemlenmemiş olup; 10 doza kadar güvenli bir şekilde kullanılabilir.

GIDA DEĞERİ OLAN HAYVANLARDA KALINTI UYARILARI
Sıfır (0) gün.

KONTRENDİKASYONLAR
Aşı önerilen dozlarda kullanıldığında etkin maddesi veya aşı muhteviyatına karşı bilinen bir kontraendikasyon bulunmamaktadır.

GENEL UYARILAR
Çocukların ulaşamayacağı yerde bulundurunuz.
Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN ÖNERİLER
POXVAC aşısının içeriğinden veya üretim aşamalarındaki uygulamalardan dolayı insanlara (uygulayıcı kişi) yansıyabilecek bir risk bulunmamaktadır. Aşı etkin maddesi olan koyun keçi virusu zoonotik özelliğe sahip değildir. Bu virusların kullanımıyla hazırlanan aşıların

uygulandığı ülkelerde uygulayıcılar için bildirilmiş herhangi bir risk bulunmamaktadır. Ancak iyi hekimlik uygulaması gereğince aşılama sırasında cilt, göz ve giysilerin aşı materyaliyle temasından kaçınılmalıdır.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ
Satışa sunulmuş haliyle raf ömrü: 36 ay
Sulandırma sıvısının raf ömrü: 24 ay
Sulandırılan aşının raf ömrü: 2 saat
Liyofilize aşı; 2 – 8 °C'de saklanmalıdır ve güneş ışığından korunmalıdır.Dondurulmamalıdır. Sulandırcı,karanlık ve kuru bir yerde, 25 °C'nin altında buzdolabına konulmadan, dondurulmadan muhafaza edilmelidir.

KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR
Kullanılmış veya arta kalan ürün ilgili mevzuata göre imha edilmelidir. İmha işlemi iki aşamada gerçekleşir. İlk olarak 1.2 atm basınç altında 121 ºC'de 1 saat süreyle otoklav işlemi uygulanır. Son olarak biyolojik atık sistemine gönderilir veya foseptik çukurlara gömülür. Kullanılan iğne ve enjektörlerin imhası için otoklavlama, yakma, biyolojik imha prosesi veya foseptik çukurlara gömme işlemi uygulanmalıdır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKİLLERİ
Karton kutu içerisinde, 20 dozluk liyofilize aşılar 10 ml; 50 dozluk liyofilize aşılar 25 ml, 100 dozluk liyofilize aşılar 50 ml ve 200 dozluk liyofilize aşılar 100 ml suladırma sıvısı ile birlikte ambalajlanmıştır. Liyofilize kısım için Tip I veya Tip II nötr cam şişe, sulandırma sıvısı şişeleri cam ve/veya polietilen/polipropilen plastik şişeler kullanımıştır. Şişelerin ağzı butil plastikten yapılmış tıpalar ve alüminyum kapaklar ile kapatılmıştır.

PROSPEKTÜSÜN ONAY TARİHİ:
11.11.2025

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİHİ:
10.11.2004

PAZARLAMA İZİN SAHİBİ / ÜRETİCİ FİRMA ADI VE ADRESİ
VETAL Hayvan Sağlığı Ürünleri A.Ş.
Petrolosb.Mah. 14. Cad.No.1/1 Adıyaman
Telefon: +90 416 223 2030- 223 2488 Faks:+90 416 223 1456
Web: www.vetal.com.tr E-mail: vetal@vetal.com.tr

İÇ AMBALAJ ETİKETİ

LİYOFİLİZAT ETİKET BİLGİLERİ **20, 50, 100, 200 doz**

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır

POXVAC®

Enjeksiyonluk Çözelti Liyofilizatı

Koyun ve keçilerin çiçek hastalığına,ve sığırların LSD (Lumpy Skin Disease) hastalığına karşı koruyucu canlı aşı

BİLEŞİMİ

1 doz aşı en az ≥ $10^{2,5}$ $TCID_{50}$ koyun- keçi çiçek virüsü ve yardımcı madde olarak 0,125 -1,25 mg Laktalbumin hidrolizat ve 0,25 – 2,5 mg Sükroz içerir.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

6-12 haftalık kuzu ve oğlak	: 0,2 mL (S.C)
3 aylıktan büyük kuzu ve oğlak	: 0,5 mL (S.C)
Sığır	: 3 mL (S.C)

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Liyofilize aşı; 2 – 8 °C'de saklanmalıdır ve güneş ışığından korunmalıdır.
Dondurulmamalıdır.
Satışa sunulmuş haliyle raf ömrü: 36 ay
Sulandırılan aşının raf ömrü: 2 saat

GIDA DEĞERİ OLAN HAYVANLARDA KALINTI UYARILARI

Sıfır (0) gün.

Çocukların ulaşamayacağı yerde bulundurunuz.
Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.
Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz.

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİHİ:

10.11.2024

PAZARLAMA İZİN SAHİBİ / ÜRETİCİ FİRMA ADI VE ADRESİ

Vetal Hayvan Sağlığı Ürünleri A.Ş.
Petrolosb Mah.14.Cad. No:1/1 Adıyaman /TÜRKİYE
Telefon : +90 416 223 20 30
Faks : +90 416 223 14 56
e-mail : vetal@vetal.com.tr
web : www.vetal.com.tr

Seri No:
Ü.R.T. :
S.K.T.:

İÇ AMBALAJ ETİKETİ

SULANDIRMA SIVISI ETİKET BİLGİLERİ **10, 25, 50, 100 ml**

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır
POXVAC®
Liyofilizat Sulandırıcısı

BİLEŞİMİ: Sodyum Klorür, Potasyum Klorür, Disodyum hidrojen fosfat, Potasyum dihidrojen fosfat, Enjeksiyonluk su

Karanlık ve kuru bir yerde, 25 °C'nin altında buzdolabına konulmadan, dondurulmadan muhafaza edilmelidir.
Raf ömrü: 24 ay

Çocukların ulaşamayacağı yerde bulundurunuz.
Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.
Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz.

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİHİ:

PAZARLAMA İZİN SAHİBİ / ÜRETİCİ FİRMA ADI VE ADRESİ
Vetal Hayvan Sağlığı Ürünleri A.Ş.
Petrolosb Mah.14.Cad. No:1/1 Adıyaman /TÜRKİYE
Telefon : +90 416 223 20 30
Faks : +90 416 223 14 56
e-mail : vetal@vetal.com.tr
web : www.vetal.com.tr

Seri No:
Ü.R.T. :
S.K.T.:

DIŞ AMBALAJ ETİKETİ (Tüm ambalaj formları için)

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır

POXVAC®

Enjeksiyonluk Çözelti Liyofilizatı ve Sulandırıcısı

Koyun ve keçilerin çiçek hastalığına,ve sığırların LSD (Lumpy Skin Disease) hastalığına karşı koruyucu canlı aşı

BİLEŞİMİ

1 doz aşı en az ≥ $10^{2,5}$ $TCID_{50}$ koyun-keçi çiçek virüsü ve yardımcı madde olarak 0,125 – 1,25 mg Laktalbumin hidrolizat ve 0,25 – 2,5 mg Sükroz içerir.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

6-12 haftalık kuzu ve oğlak	: 0,2 mL (S.C)
3 aylıktan büyük kuzu ve oğlak	: 0,5 mL (S.C)
Sığır	: 3 mL (S.C)

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Liyofilize aşı; 2 – 8 °C'de saklanmalıdır ve güneş ışığından korunmalıdır. Dondurulmamalıdır. Sulandırcı,karanlık ve kuru bir yerde, 25 °C'nin altında buzdolabına konulmadan, dondurulmadan muhafaza edilmelidir.
Satışa sunulmuş haliyle raf ömrü: 36 ay
Sulandırma sıvısının raf ömrü: 24 ay
Sulandırılan aşının raf ömrü: 2 saat

GIDA DEĞERİ OLAN HAYVANLARDA KALINTI UYARILARI

Sıfır (0) gün.

KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR

Kullanılmış veya arta kalan ürün ilgili mevzuata göre imha edilmelidir. İmha işlemi iki aşamada gerçekleşir. İlk olarak 1.2 atm basınç altında 121 ºC'de 1 saat süreyle otoklav işlemi uygulanır. Son olarak biyolojik atık sistemine gönderilir veya foseptik çukurlara gömülür. Kullanılan iğne ve enjektörlerin imhası için otoklavlama, yakma, biyolojik imha prosesi veya foseptik çukurlara gömme işlemi uygulanmalıdır.

Çocukların ulaşamayacağı yerde bulundurunuz.
Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.
Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz.

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİHİ:

10.11.2004

PAZARLAMA İZİN SAHİBİ / ÜRETİCİ FİRMA ADI VE ADRESİ

Vetal Hayvan Sağlığı Ürünleri A.Ş.
Petrolosb Mah.14.Cad. No:1/1 Adıyaman /TÜRKİYE
Telefon : +90 416 223 20 30
Faks : +90 416 223 14 56
e-mail : vetal@vetal.com.tr
web : www.vetal.com.tr

Seri No:
Ü.R.T. :

S.K.T.:
Parekende Satış Fiyatı:
(KDV dahil)