Prospektüs (Tüm ambalaj formları için):

SADECE HAYVAN SAĞLIĞINDA KULLANILIR

NOBILIS® MG 6/85

Süspansiyonluk Liyofilizat

Veteriner Aşı

BİLEŞİM

Stabilizatör içinde, her bir doz en az $10^{6.9}$ CFU canlı zayıflatılmış *Mycoplasma gallisepticum* MG 6/85 suşu içermektedir.

ENDİKASYONLARI

Yumurtaya girmemiş, genç yumurtacı tavukların, *Mycoplasma gallisepticum* enfeksiyonunun klinik belirtilerini azaltmak üzere aktif bağışıklık sağlamak için kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Aeresol uygulama için su ile sulandırıldıktan sonra aşı 6 haftalık ya da daha yaşlı yarkalara her bir hayvan için en az $10^{6.9}$ CFU (1 doz) olarak uygulanır.

DOĞRU UYGULAMA İÇİN TAVSİYELER

Bir çiftlik ya da kanatlı kompleksi için bir aşılama programı belirlemek için çok sayıda faktör göz önünde bulundurulmalıdır. Aşılamanın etkili olması için aşı iyi bakım-idare altında, uygun çevre koşullarında barındırılan sağlıklı hayvanlara aeresol yolla uygulanmalıdır. İhtiyaç duyulan bağışıklığın seviyesi operasyonel uygulamalar ve mikroba maruz kalma seviyesine göre farklılık gösterecektir.

Aşının hazırlanması

Aşı, su içinde çözüldükten sonra iki saat içinde kullanılmalıdır.

1. Temiz, soğuk, klorlanmamış su kullanılmalıdır.
2. Şişe su içinde açılır.
3. Koparılabilir mühür ve kapak flakondan çıkarılır.
4. Aşıyı sprey yolla uygulamak için gerekli miktarda aşı suya (1000 kanatlı başına 400 ml ±) eklenir.

İnce sprey uygulaması

1. Sprey aşılama, 20 mikrondan küçük damlacıklı ince sprey ile olmalıdır.
2. Sprey cihazında herhangi bir dezenfektan ya da kaymağı alınmış süt kullanılmaz.
3. Sprey cihazı sadece aşıların uygulanması için kullanılmalıdır. Kullanıldıktan sonra iyice temizlenmelidir.
4. Sprey aşılaması yapılırken tüm fanlar ve hava girişleri kapatılmalıdır.
5. Sprey cihazı üreticisinin su hacmine ilişkin önerileri göz önünde bulundurulmalıdır.

KONTRENDİKASYONLARI

◆ Bu aşı, yumurta üretiminin başlangıcından önceki 4 hafta süresince ve yumurta üretimi başladıktan sonra uygulanmaz.

◆ Bu aşı, solunum sistemi hastalıklarına (örneğin Newcastle hastalığı, bronşit vb.) karşı herhangi bir canlı aşılamadan sonraki 2 hafta içinde uygulanmamalıdır.

◆ Diğer aşılardan 14 gün önce ve 14 gün sonra uygulamamalıdır.

YAN ETKİLERİ

Yoktur

YASAL ARINMA SÜRESİ

Sıfır gün

MUHAFAZA ŞARTLARI

2–8 ºC'de karanlık ortamda muhafaza edilmelidir. Dondurulmaz. Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 21 aydır.

DAMIZLIKLARDA KULLANILMASI YASAKTIR

NOTLAR

• Yalnızca sağlıklı yarkaları aşılayınız.
• Aynı kümesteki tüm duyarlı yarkalar aynı zamanda aşılanmalıdır.
• Aşılamadan 5 gün öncesinde ve aşılamadan sonraki 2 hafta içerisinde, yarkalara antibakteriyel ilaçlar, özellikle antimikoplazma etkili ilaçlar vermeyiniz.
• Aşılama sırasında ve reaksiyon dönemi boyunca stres koşullarını azaltmaya çalışınız.
• Aşıyı herhangi başka bir maddeyle karıştırmayınız.
• Bu aşıyı seyreltmeyiniz ya da dozajı genişletmeyiniz.
• Açıldığında içeriğin tamamını kullanınız.
• Kısmen kullanılmış aşıları daha sonra kullanmak için saklamayınız ve açılmış ve/veya sulandırılmış aşının tamamını kullanınız.
• Aşılama yaparken gözler, eller ve giysilerle temastan kaçınılması iyi aşılama uygulamasının gereğidir.
• Çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayınız.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

500, 1000, 2000 dozluk liyofilize aşı içeren 20 ml'lik flakonlar halinde satılmaktadır.

PROSPEKTÜSÜN ONAY TARİHİ: 24.04.2025

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZİN TARİH VE NO: 07.12.2010

PAZARLAMA İZİN SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ

İntervet Veteriner İlaçları Paz. ve Tic. Ltd. Şti
Esentepe mah. Büyükdere cad. No:199 Levent 199 Ofis bloğu Kat:13 34394 Şişli/İstanbul

ÜRETİM YERİNİN ADI VE ADRESİ

Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35 NL 5831 AN Boxmeer, Hollanda