ÜRÜN ÖZELLİKLERİ ÖZETİ

1. VETERİNER TIBBİ ÜRÜNÜN İSMİ
PUREVAX RCPCh Enjeksiyonluk Süspansiyon Liyofilizatı ve Çözücüsü

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM
Her 1 ml veya 0.5 ml doz aşının içeriği aşağıdaki gibidir:

Aktif Maddeler:
Liyofilizat:
Attenüe kedi rinotrakeitis herpes virüsü (FHV F2 suşu).....……...…. $\geq 10^{4,9}$ $CCID_{50}$[1]
İnaktif kedi kalisivirüsü (FCV 431 ve G1 suşları) antijenleri…….……..…… ≥ 2.0 ELISA U.
Attenüe *Chlamydophila felis* (905 suşu)…….……...…….. $\geq 10^{3,0}$ EID_{50}[2]
Attenüe kedi panlökopeni virüsü (PLI IV)...…….…..……. $\geq 10^{3,5}$ $CCID_{50}$[1]

[1] %50 Hücre Kültürü Enfektif Doz
[2] %50 Yumurta Enfektif Doz

Yardımcı Madde:
Yardımcı maddelerin tam listesi için bölüm 6.1'e bakınız.

Çözücü:
Enjeksiyonluk su…… 1 ml veya 0,5 ml.

3. FARMASÖTİK ŞEKİL
Enjeksiyonluk Süspansiyon Liyofilizatı ve Çözücüsü

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1 Hedef tür
Kediler

4.2 Her bir hedef tür için kullanım alanı
8 haftalık ve daha yaşlı kedilerin:
- Kedi viral rinotrakeitisine karşı klinik belirtilerin azaltılması için
- Kalisivirüs enfeksiyonuna karşı klinik belirtilerin azaltılması için
- *Chlamydophila felis* enfeksiyonuna karşı klinik belirtilerin azaltılması için
- Kedi panlökopenisine karşı mortalitenin ve klinik belirtilerin önlenmesi için aktif immünizasyonunda kullanılır.

Bağışıklık başlangıcı, rinotrakeitis, kalisivirüs, *Chlamydophila felis* ve panlökopeni bileşenleri için ilk aşılamadan 1 hafta sonra gösterilmiştir.
Son yapılan tekrar aşısından sonra bağışıklığın süresi, rinotrakeitis, kalisivirüs ve panlökopeni bileşenleri için 3 yıl ve *Chlamydophila felis* bileşeni için 1 yıldır.

4.3 Kontrendikasyonlar
Gebe hayvanlarda kullanılmamalıdır.
Laktasyon süresince kullanımı önerilmemektedir.

4.4 Her bir hedef tür için özel uyarılar
Bulunmamaktadır.

4.5 Kullanıma ilişkin özel uyarılar
(i) Hayvanlarda kullanıma ilişkin özel uyarılar
Sadece sağlıklı hayvanları aşılayınız.

(ii) Ürünü uygulayana ilişkin özel uyarılar
Kazara kendine enjeksiyon durumunda derhal tıbbi yardım alınmalıdır ve prospektüs veya etiket doktora gösterilmelidir.
Bu aşı, bağışıklık yetmezliği bulunan veya bağışıklığı baskılayan tıbbi ürünler alan kişilerce uygulanmamalıdır. Uygulayan kişinin kendine enjekte etmesi durumunda, derhal tıbbi yardım alınmalıdır ve canlı klamidya aşısını kendine enjekte etmiş olduğuna dair doktor bilgilendirilmelidir.

(iii) Diğer uyarılar
Bulunmamaktadır.

4.6 İstenmeyen etkiler (sıklık ve şiddet)
Normal kullanım koşullarında, geçici apati ve anoreksinin yanı sıra hipertermi de (genellikle 1 veya 2 gün süren) meydana gelebilir. En fazla 1 veya 2 hafta içerisinde geçen lokal reaksiyon (dokunma ile hissedilen az miktarda ağrı, kaşıntı veya sınırlı ödem) meydana gelebilir.
İstisnai durumlarda, uygun semptomatik tedavi gerektiren hipersensitivite reaksiyonu meydana gelebilir.
Çok nadir durumlarda, yetişkin kedilerde tekrar (booster) aşıyı bir – üç hafta takiben bazen zayıflık ile ilişkili hipertermi ve letarji gözlemlenmiştir. Reaksiyon geçicidir.

Yan etkilerin değerlendirilmesi aşağıdaki sıklık bilgilerine dayalıdır:
- Çok yaygın (10 hayvandan en az birinde görülebilir)
- Yaygın (10 hayvanın birinden az, fakat 100 hayvanın birinden fazla görülebilir)
- Yaygın olmayan (10 hayvanın birinden az, fakat 1.000 hayvanın birinden fazla görülebilir)
- Seyrek (10 hayvanın birinden az, fakat 10.000 hayvanın birinden fazla görülebilir)
- Çok seyrek (10.000 hayvanın birinden az görülebilir)

4.7 Gebelik, laktasyon ve yumurtlama döneminde kullanım
Gebe hayvanlarda kullanılmamalıdır.
Laktasyon süresince kullanımı önerilmemektedir.

4.8 Diğer tıbbi ürünlerle etkileşimi ve diğer etkileşim şekilleri
Bu aşının, kedi lösemisine karşı olan Boehringer Ingelheim'ın adjuvansız aşısı ile karıştırabileceğini ve/veya Boehringer Ingelheim'ın kuduza karşı adjuvanlı aşısı ile karıştırılmadan aynı gün uygulanabileceğini gösteren güvenlik ve etkinlik çalışmaları mevcuttur.

4.9 Dozaj ve kullanım yolu
Aşağıda yer alan aşılama programına göre liyofilizatın 1 ml veya 0.5 ml çözücü ile sulandırılmasını takiben 1 doz aşı deri altına uygulanır:

Birincil aşılama kürü:
- ilk aşılama: 8 haftalık yaştan itibaren
- ikinci aşılama: 3-4 hafta sonra

Rinotrakeitis, kalisivirüs, panlökopeni veya Chlamydophila bileşenlerine karşı anneden gelen antikorların yüksek seviyede olması beklendiğinde (örneğin, gebelik öncesi aşılanmış olan ve/veya daha önceden patojene/patojenlere bilinen veya şüphe edilen maruziyeti bulunan dişi kedilerden doğmuş 9-12 haftalık yaştaki kedi yavrularında), ilk aşılama kediler 12 haftalık olana kadar ertelenmelidir.

Tekrar aşılama:
- İlk tekrar aşısı, birincil aşılamadan bir yıl sonra tüm bileşenler için yapılmalıdır.
- Daha sonraki tekrar aşıları, chlamydiosis bileşeni için her yıl ve rinotrakeitis, kalisivirüs ve panlökopeni bileşenleri için en fazla üç yıllık aralıklarla yapılmalıdır.

4.10 Doz aşımı, varsa semptomlar, acil prosedürler, antidotlar (gerekli ise)
İstisnai olarak 5 gün sürebilen hipertermi dışında 'Bölüm 4.6 İstenmeyen etkiler (sıklık ve şiddet)'de belirtilen etkilerden başka herhangi bir etki gözlenmemiştir.

4.11 Kalıntı arınma süreleri (sıfır gün olanlar da dahil)
Geçerli değildir.

5. İMMÜNOLOJİK ÖZELLİKLER
ATCvet kodu: QI06AJ03
Kedi viral rinotrakeitis, kedi kalisivirozis, chlamydiozis ve kedi panlökopeni bileşenlerine karşı aşı. Kedi rinotrakeitis herpes virüsüne, kedi kalisivirüsüne, *Chlamydophila felis* bileşenine ve kedi panlökopeni virüsüne karşı aktif bağışıklığı stimüle eder.
Ürünün, bağışıklığın başlangıcında ve aşılamadan sonra bir yıl boyunca kedi kalisivirüsünün ekskresyonunu azalttığı gösterilmiştir.

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1 Yardımcı maddeler
Gentamisin
Sükroz
Sorbitol
Dekstran 40
Kasein hidrolizat
Kollajen hidrolizat
Dipotasyum fosfat
Potasyum dihidrojen fosfat
Potasyum hidroksit
Sodyum klorür
Disodyum hidrojen ortofosfat
Monopotasyum fosfat anhidr

6.2 Geçimsizlikler
Boehringer Ingelheim'ın kuduza karşı adjuvanlı aşısı ile karıştırmayınız.

6.3 Raf ömrü
Satış için ambalajlanan veteriner tıbbi ürünün raf ömrü: 18 ay
Talimatlar doğrultusunda sulandırılmış aşının raf ömrü: Hemen kullanılmalıdır.

6.4 Muhafaza şartları
+2°C ile +8°C arasındaki sıcaklıklarda saklayınız ve taşıyınız.
Işıktan koruyunuz.
Dondurmayınız.

6.5 Birincil ambalajın niteliği ve kompozisyonu
1 doz liyofilizat içeren bütil elastomer kapaklı ve alüminyum başlık ile mühürlü Tip I cam şişe ve 1 ml veya 0.5 ml çözücü içeren bütil elastomer kapaklı ve alüminyum başlık ile mühürlü Tip I cam şişe.
Kutu içerisinde;
10 adet 1 dozluk liyofilizat içeren cam şişe ve 10 adet 1 ml çözücü içeren cam şişe
10 adet 1 dozluk liyofilizat içeren cam şişe ve 10 adet 0.5 ml çözücü içeren cam şişe

6.6 Kullanılmış veya arta kalan ürünün imhasına ilişkin özel önlemler
Tüm kullanılmamış veteriner tıbbi ürünleri ya da bu tip veteriner tıbbi ürünlerinden kaynaklanan atık maddeler yerel gereklilikler uyarınca atılmalıdır.

7. PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ
Boehringer Ingelheim İlaç Ticaret A.Ş.
Esentepe Mah. Harman 1 Sokak Nidakule Levent No: 7-9 Kat: 15/16 Şişli-İstanbul
Tel. : +90 212 329 11 00
Faks : +90 212 329 11 01

8. PAZARLAMA İZNİ NUMARASI

9. PAZARLAMA İZNİNİN İLK VERİLME VEYA YENİLEME TARİHİ
05.08.2009

10. METİN DEĞİŞİKLİK TARİHİ
28.08.2025

Prospektüs

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır

PUREVAX RCPCh

Enjeksiyonluk Süspansiyon Liyofilizatı ve Çözücüsü

Kedi viral rinotrakeitis, kedi kalisivirozis, klamidiozis ve kedi panlökopeni bileşenlerine karşı canlı attenüe aşı.

BİLEŞİMİ

Her 1 ml veya 0.5 ml doz aşının içeriği aşağıdaki gibidir:

Liyofilizat:

Etkin Maddeler:

Attenüe Feline rhinotracheitis herpes virus (FHV F2 suşu)……..……....… ≥ $10^{4,9}$ $CCID_{50}$[1]
İnaktif Feline calicivirus (FCV 431 ve FCV G1 suşları) antijenleri..…… ≥ 2,0 ELISA U.
Attenüe *Chlamydophila felis* (905 suşu)…….……...……. ≥ $10^{3,0}$ EID_{50}[2]
Attenüe Feline panleukopenia virus (PLI IV)…….…..... ≥ $10^{3,5}$ $CCID_{50}$[1]

[1] %50 Hücre Kültürü Enfektif Doz
[2] %50 Yumurta Enfektif Doz

Çözücü:

Enjeksiyonluk su…… yeterli miktarda 1 ml veya 0.5 ml.

İMMÜNOLOJİK ÖZELLİKLER

Feline rhinotracheitis herpes virus'a, *Feline calicivirus*'a, *Chlamydophila felis*'e ve *Feline panleukopenia virus*'a karşı aktif bağışıklığı stimüle eder. Ürünün, immünite başlangıcında ve aşılamadan sonra bir yıl süreyle *Feline calicivirus* ekskresyonunu azalttığı gösterilmiştir.

KULLANIM SAHASI/ENDİKASYONLAR

8 haftalık ve daha yaşlı kedilerin:
- Kedi viral rinotrakeitisine karşı klinik belirtilerin azaltılması
- Kalisivirüs enfeksiyonuna karşı klinik belirtilerin azaltılması
- *Chlamydophila felis e*nfeksiyonuna karşı klinik belirtilerin azaltılması
- Kedi panlökopenisine karşı mortalitenin ve klinik belirtilerin önlenmesi için aktif immünizasyonunda kullanılır.

Rinotrakeitis, kalisivirüs, *Chlamydophila felis* ve panlökopeni komponentleri için ilk aşılama sonrası 1 haftada bağışıklık oluştuğu görülmüştür.
Yapılan son tekrar aşılamadan sonra bağışıklık süresi rinotrakeitis, kalisivirüs ve panlökopeni komponentleri için 3 yıl, klamidofil komponenti için 1 yıldır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Aşağıda yer alan aşılama programına göre liyofilizatın 1 ml veya 0.5 ml çözücü ile sulandırılmasını takiben 1 doz aşı deri altına uygulanır:
Birincil aşılama zamanı:
- ilk aşılama: 8 haftalık yaştan itibaren
- ikinci aşılama: 3-4 hafta sonra

Rinotrakeitise, kalisivirüs enfeksiyonuna, panlökopeniye veya Chlamydophila bileşenlerine karşı anneden yavruya geçen antikorların yüksek seviyelerde mevcut olması beklendiğinde, birincil aşılama kürü, kediler 12 haftalık oluncaya kadar ertelenmelidir.
Tekrar aşılama zamanı:
- İlk tekrar aşısı, birincil aşılamadan bir yıl sonra tüm bileşenler için yapılmalıdır.
- Daha sonraki tekrar aşıları, klamidya bileşeni için her yıl ve rinotrakeitis, kalisivirüs ve panlökopeni bileşenleri için en fazla üç yıllık aralıklarla yapılmalıdır.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN UYARILAR
Sadece sağlıklı hayvanlarda kullanılmalıdır.

Gebelik ve Laktasyon Döneminde Kullanım
Gebe hayvanlarda kullanılmamalıdır.
Laktasyon süresince kullanımı önerilmemektedir.

İSTENMEYEN ETKİLER
Normal kullanım koşullarında, geçici apati ve anoreksinin yanı sıra hipertermi de (genellikle 1 veya 2 gün süren) meydana gelebilir. En fazla 1 veya 2 hafta içerisinde geçen lokal reaksiyon (dokunma ile hissedilen az miktarda ağrı, kaşıntı veya sınırlı ödem) meydana gelebilir.
İstisnai durumlarda, uygun semptomatik tedavi gerektiren hipersensitivite reaksiyonu meydana gelebilir.
Çok nadir durumlarda, yetişkin kedilerde tekrar (booster) aşıyı bir – üç hafta takiben bazen zayıflık ile ilişkili hipertermi ve letarji gözlemlenmiştir. Reaksiyon geçicidir.
Yan etkilerin değerlendirilmesi aşağıdaki sıklık bilgilerine dayalıdır:
- Çok yaygın (10 hayvandan en az birinde görülebilir)
- Yaygın (10 hayvanın birinden az, fakat 100 hayvanın birinden fazla görülebilir)
- Yaygın olmayan (10 hayvanın birinden az, fakat 1.000 hayvanın birinden fazla görülebilir)
- Seyrek (10 hayvanın birinden az, fakat 10.000 hayvanın birinden fazla görülebilir)
- Çok seyrek (10.000 hayvanın birinden az görülebilir)

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ
Bu aşının, kedi lösemisine karşı olan Boehringer Ingelheim'ın adjuvansız aşısı ile karıştırabileceğini ve/veya Boehringer Ingelheim'ın kuduza karşı adjuvanlı aşısı ile karıştırılmadan aynı gün uygulanabileceğini gösteren güvenlik ve etkinlik çalışmaları mevcuttur.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT
İstisnai olarak 5 gün sürebilen hipertermi dışında "İstenmeyen Etkiler"de hali hazırda belirtilen etkilerden başka herhangi bir etki gözlenmemiştir.

GIDA DEĞERİ OLAN HAYVANLARDA KALINTI UYARILARI
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s): Sıfır gündür.

KONTRENDİKASYONLAR
Gebe hayvanlarda kullanılmamalıdır.
Laktasyon süresince kullanımı önerilmemektedir.

GENEL UYARILAR
Kullanmadan önce ve beklenmedik bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN ÖNERİLER
Kazara kendine enjeksiyon durumunda derhal tıbbi yardım alınmalıdır ve prospektüs veya etiket doktora gösterilmelidir.
Bu aşı, bağışıklık yetmezliği bulunan veya bağışıklığı baskılayan tıbbi ürünler alan kişilerce uygulanmamalıdır. Uygulayan kişinin kendine enjekte etmesi durumunda, derhal tıbbi yardım alınmalıdır ve canlı klamidya aşısını kendine enjekte etmiş olduğuna dair doktor bilgilendirilmelidir.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ
+2°C ile +8°C arasındaki sıcaklıklarda saklayınız ve taşıyınız.
Işıktan koruyunuz.
Dondurmayınız.
Raf ömrü 18 aydır.
Talimatlara uygun şekilde sulandırıldıktan sonra raf ömrü: Hemen kullanınız.

KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR
Tüm kullanılmamış veteriner tıbbi ürünleri ya da bu tip veteriner tıbbi ürünlerinden kaynaklanan atık maddeler yerel gereklilikler uyarınca atılmalıdır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKİLLERİ
1 doz liyofilizat içeren bütil elastomer kapaklı ve alüminyum başlık ile mühürlü Tip I cam şişe ve 1 ml veya 0.5 ml çözücü içeren bütil elastomer kapaklı ve alüminyum başlık ile mühürlü Tip I cam şişe.
Kutu içerisinde;
10 adet 1 dozluk liyofilizat içeren cam şişe ve 10 adet 1 ml veya 0.5 ml çözücü içeren cam şişe şeklinde satışa sunulmuştur.

PROSPEKTÜSÜN ONAY TARİHİ: 28.08.2025

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİHİ: 05.08.2009

PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ:
Boehringer Ingelheim İlaç Ticaret A.Ş.
Esentepe Mah. Harman 1 Sokak Nidakule Levent No:7-9 Kat:15/16 Şişli-İstanbul
Tel. : +90 212 329 11 00
Faks : +90 212 329 11 01

ÜRETİM YERİ VE ADRESİ
Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS
Rue de l'Aviation
69800 Saint Priest – Fransa

Asgari iç ambalaj etiketi – Liyofilizat içeren Şişe (1 doz)

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır.
PUREVAX RCPCh
Enjeksiyonluk liyofilizat

1 doz
• FHV (F2 suşu) ≥ $10^{4,9}$ $CCID_{50}$
• FCV (431 ve G1 suşları) ≥ 2.0 ELISA U
• *Chlamydophila felis* (905 suşu) ≥ $10^{3,0}$ EID_{50}
• FPV (PLI IV) ≥ $10^{3,5}$ $CCID_{50}$
Deri altı yolla uygulanır.
T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Pazarlama İzni Tarihi: 05.08.2009
Boehringer Ingelheim
Seri No: **Üretim Tarihi:**
S.K.T.:

Asgari iç ambalaj etiketi – Çözücü içeren Şişe (1 ml)

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır.
PUREVAX RCPCh
Çözücü

1 ml
Enjeksiyonluk su y.m. 1 ml
Deri altı yolla uygulanır.
T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Pazarlama İzni Tarihi: 05.08.2009
Boehringer Ingelheim
Seri No: **Üretim Tarihi:**
S.K.T.:

Asgari iç ambalaj etiketi – Çözücü içeren Şişe (0.5 ml)

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır.
PUREVAX RCPCh
Çözücü

0.5 ml
Enjeksiyonluk su y.m. 0.5 ml
Deri altı yolla uygulanır.
T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Pazarlama İzni Tarihi: 05.08.2009
Boehringer Ingelheim
Seri No: **Üretim Tarihi:**
S.K.T.:

<u>Dış Ambalaj Etiketi – (10 doz – 10 x (1 doz liyofilizat + 1 ml çözücü) Şişe içeren karton kutu)</u>

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır

PUREVAX RCPCh

Enjeksiyonluk Süspansiyon Liyofilizatı ve Çözücüsü

Kedi viral rinotrakeitis, kedi kalisivirozis, klamidiozis ve kedi panlökopeni bileşenlerine karşı canlı attenüe aşı.

Her 1 ml doz aşı:

FHV (F2 suşu) $\geq 10^{4,9}$ $CCID_{50}$

FCV (431 ve G1 suşları) $\geq$ 2.0 ELISA U

Chlamydophila felis (905 suşu) $\geq 10^{3,0}$ EID_{50}

FPV (PLI IV) $\geq 10^{3,5}$ $CCID_{50}$

• Deri altı yolla uygulanır.

• Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz.

• Çocukların erişemeyeceği yerlerde bulundurunuz.

• +2 °C ile +8 °C arasında (buzdolabında) saklayınız ve taşıyınız, ışıktan koruyunuz. Dondurmayınız.

• Raf ömrü 18 aydır. Sulandırdıktan sonra hemen kullanılmalıdır.

Ticari Takdim Şekilleri

1 doz liyofilizat içeren bütil elastomer kapaklı ve alüminyum başlık ile mühürlü Tip I cam şişe ve 1 ml veya 0.5 ml çözücü içeren bütil elastomer kapaklı ve alüminyum başlık ile mühürlü Tip I cam şişe.

Kutu içerisinde;

10 adet 1 dozluk liyofilizat içeren cam şişe ve 10 adet 1 ml veya 0.5 ml çözücü içeren cam şişe şeklinde satışa sunulmuştur.

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Pazarlama İzni Tarihi: 05.08.2009

Pazarlama İzni Sahibinin Adı ve Adresi: Boehringer Ingelheim İlaç Tic. A.Ş.
Esentepe Mah. Harman 1 Sokak Nidakule Levent No: 7-9 Kat: 15/16 Şişli-İstanbul

Üretim Yeri ve Adresi: Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS
Rue de l'Aviation, 69800 Saint Priest – Fransa

Seri No:

S.K.T.:

KDV Dahil PSF:

Dış Ambalaj Etiketi – (10 doz – 10 x (1 doz liyofilizat + 0.5 ml çözücü) Şişe içeren karton kutu)

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır
PUREVAX RCPCh
Enjeksiyonluk Süspansiyon Liyofilizatı ve Çözücüsü

Kedi viral rinotrakeitis, kedi kalisivirozis, klamidiozis ve kedi panlökopeni bileşenlerine karşı canlı attenüe aşı.
Her 0.5 ml doz aşı:
FHV (F2 suşu) $\geq 10^{4,9}$ $CCID_{50}$
FCV (431 ve G1 suşları) $\geq$ 2.0 ELISA U
Chlamydophila felis (905 suşu) $\geq 10^{3,0}$ EID_{50}
FPV (PLI IV) $\geq 10^{3,5}$ $CCID_{50}$
• Deri altı yolla uygulanır.
• Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz.
• Çocukların erişemeyeceği yerlerde bulundurunuz.
• +2 °C ile +8 °C arasında (buzdolabında) saklayınız ve taşıyınız, ışıktan koruyunuz. Dondurmayınız.
• Raf ömrü 18 aydır. Sulandırdıktan sonra hemen kullanılmalıdır.
Ticari Takdim Şekilleri
1 doz liyofilizat içeren bütil elastomer kapaklı ve alüminyum başlık ile mühürlü Tip I cam şişe ve 1 ml veya 0.5 ml çözücü içeren bütil elastomer kapaklı ve alüminyum başlık ile mühürlü Tip I cam şişe.
Kutu içerisinde;
10 adet 1 dozluk liyofilizat içeren cam şişe ve 10 adet 1 ml veya 0.5 ml çözücü içeren cam şişe şeklinde satışa sunulmuştur.
T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Pazarlama İzni Tarihi: 05.08.2009
Pazarlama İzni Sahibinin Adı ve Adresi: Boehringer Ingelheim İlaç Tic. A.Ş.
Esentepe Mah. Harman 1 Sokak Nidakule Levent No: 7-9 Kat: 15/16 Şişli-İstanbul
Üretim Yeri ve Adresi: Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS
Rue de l'Aviation, 69800 Saint Priest – Fransa
Seri No:
S.K.T.:
KDV Dahil PSF: