ÜRÜN ÖZELLİKLERİ ÖZETİ

1. VETERİNER TIBBİ ÜRÜNÜN İSMİ:
RESBOVİS-4 Enjeksiyonluk Süspansiyon

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM:
Her bir doz aşı (5 ml) içeriği aşağıdaki gibidir.

Aktif madde	**Miktar**
İnaktif Bovine herpesvirüs Tip-1 (BoHV-1) antijeni	≥ 4 $\log_2$ VNT*
İnaktif Bovine respiratory syncytial virüs (BRSV) antijeni	≥ 4 $\log_2$ VNT*
İnaktif Bovine parainfluenza virüs-3 (BPIV-3) antijeni	≥ 6 $\log_2$ VNT*
İnaktif Bovine viral diarrhea (CP-BVDV) antijeni	≥ 6 $\log_2$ VNT*
İnaktif Bovine viral diarrhea (NCP-BVDV) antijeni	≥ 6 $\log_2$ FAVN**
Yardımcı maddeler	
Alüminyum hidroksit jel (Al^{+3})	1,5 mg/ml
Saponin	0,3 mg/ml

*1/2 doz ile aşılı tavşanlarda VNT ($\log_2$) titresi
**1/2 doz ile aşılı tavşanlarda FAVN ($\log_2$) titresi

Yardımcı maddelerin tam listesi için bölüm 6.1'e bakınız.

3. FARMASÖTİK ŞEKİL:
Enjeksiyonluk Süspansiyon
Pembe renkli süspansiyon

4. KLİNİK ÖZELLİKLER:

4.1. Hedef tür:
Sığır.

4.2. Her bir hedef tür için kullanım alanı:
RESBOVİS-4 Sığırlarda, Enfeksiyöz Sığır Rinotrakeitisi (IBR) virüsü, Sığır İshal (BVD) virüsü, Sığır Solunum Sinsityal (BRSV) virüsü, Sığır Parainfluenza 3 (PI 3) virüsüne karşı inaktif viral aşıdır. Aşılanan hayvanlarda bağışıklık 3 hafta içinde gelişmeye başlar, ilk defa aşılanan hayvanlarda ikinci aşılamayı takiben 2 hafta sonra tam bir immün yanıt oluşturarak bağışıklık oluşur. Aktif bağışıklık 6 ay devam eder. Oluşan aktif bağışıklık bu etkenlerin neden olduğu enfeksiyonlar ve lezyonları azaltır.

4.3. Kontrendikasyonlar:
Bilinen bir kontrendikasyonu yoktur.

4.4. Her bir hedef tür için özel uyarılar:

4.5. Kullanıma ilişkin özel uyarılar

(i) Hayvanlarda kullanıma ilişkin özel uyarılar:

-Hasta ve inkubasyon dönemindeki sirayetten şüpheli hayvanlar ile stres altındaki hayvanlar aşılanmamalıdır.
-Aşı uygulamadan önce vücut sıcaklığına getirilmelidir.
-Aşı kullanılacağı zaman, aşı şişesi her kullanımdan önce hafifçe çalkalanmalıdır.
-Aşılama sırasında aşı şişesi güneşten korunmalı, mümkünse buz içinde bulundurulmalıdır.
-Her uygulamada aseptik iğne ve enjektörler kullanılmalıdır.
-Aşı yalnızca veteriner hekim veya veteriner hekim gözetimindeki veteriner sağlık teknisyenlerince uygulanmalıdır.

(ii) Ürünü uygulayana ilişkin özel uyarılar:

-İnsan sağlığı için bilinen bir olumsuz etkisi yoktur, ancak aşı uygulama sırasında olabilecek yaralanmalarda bölge temizlenerek dezenfekte edilmelidir.
-Aşıyı kazara kendinize enjekte etmeniz hâlinde derhal tıbbi yardıma başvurun ve ürünün kullanma talimatını veya etiketini doktorunuza gösterin.

(iii) Diğer uyarılar:

4.6. İstenmeyen etkiler (sıklık ve şiddet):

Hayvanlarda çok yaygın olarak enjeksiyon yerinde kısa süreli lokal reaksiyonlar (kızarıklık, hafif şişlik ve kabuklanmalar) ve vücut sıcaklıklarında geçici bir artış görülebilir. Çok seyrek olarak duyarlı hayvanlarda anafilaktik reaksiyon gelişebilir. Bu durumda semptomatik tedavi (antihistaminik/antialerjik ilaçlar) uygulanabilir.

-Çok yaygın (10 hayvanda 1'den fazla)
-Yaygın (100 hayvanda 1'den fazla fakat 10'dan az)
-Yaygın olmayan (1.000 hayvanda 1'den fazla fakat 10'dan az)
-Seyrek (10.000 hayvanda 1'den fazla fakat 10'dan az)
-Çok seyrek (10,000 hayvanda 1'den az)

4.7. Gebelik, laktasyon ve yumurtlama döneminde kullanım:

Gebelik ve laktasyon döneminde kullanımı uygundur.

4.8. Diğer tıbbi ürünlerle etkileşimi ve diğer etkileşim şekilleri:

Bu ürünün diğer aşılarla birlikte kullanıldığında geçimliliği hakkında bilgi bulunmamaktadır. Bu nedenle bu ürünün diğer ürünlerle aynı günde veya farklı zamanlarda kullanımının etkili ve güvenilir olduğu ispatlanmamıştır.

4.9. Dozaj ve kullanım yolu:

Tüm sığırlara 2 aylıktan itibaren 5 ml miktarında, boynun yan yüzünün orta kısmına veya omuz gerisindeki hareketsiz bölgeye deri altı (SC) veya kas içi (IM) yolla uygulanır. İlk defa aşılanan hayvanlara 3 hafta sonra ikinci uygulama yapılır. 6 ayda bir tek doz halinde uygulama tavsiye edilir.

4.10. **Doz Aşımı, varsa semptomlar, acil prosedürler, antidotlar:**
İnaktif bir aşı olduğu için doz aşımı çalışması yapılmamıştır.

4.11. Kalıntı Arınma Süreleri (sıfır gün olanlar da dahil):
Aşı uygulamalarından sonra insan tüketimine sunulan et, sakatat ve süt için kalıntı arınma süresi 0 (sıfır) gündür.

5. İMMÜNOLOJİK ÖZELLİKLER:

Farmakoterapotik grup: Sığır için immünolojik inaktif viral aşılar.
ATC Vet kodu: QI02AA
Sığırlarda, Enfeksiyöz Sığır Rinotrakeitisi (IBR) virüsü, Sığır İshal (BVD) virüsü, Sığır Solunum Sinsityal (BRSV) virüsü, Sığır Parainfluenza 3 (PI 3) virüsü antijenlerine karşı antikor üretimini uyararak, bu etkenlerin neden olduğu enfeksiyonlar ve lezyonları azaltır.

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER:

6.1. Yardımcı maddeler:
Alüminyum hidroksit jel
Saponin
Enjeksiyonluk su

6.2. Geçimsizlikler:
Ürünün diğer ürünlerle kullanılmasının güvenliği ve etkinliği bilinmemektedir.

6.3. Raf ömrü:
Satışa sunulmuş haliyle raf ömrü:
Enjeksiyonluk süspansiyon: 24 ay.
İç ambalaj açıldıktan sonraki raf ömrü: 6-8 saat.

6.4. Muhafaza şartları:
Enjeksiyonluk süspansiyon: 2-8 ºC'de ve karanlıkta muhafaza edilmelidir. Dondurmayınız.
Açılan şişeler 6-8 saat içinde kullanılmalıdır.

6.5. Birincil ambalajın niteliği ve kompozisyonu:
Aşı 5 ml Tip I amber renkli cam şişeler ile 25 ml, 50 ml ve 100 ml Tip II amber renkli cam şişeler veya 25 ml, 50 ml, 100 ml ve 250 ml beyaz renkli polipropilen plastik şişelerde ambalajlanır. Cam ve plastik şişeler bromobutil tıpa ve alüminyum kapak ile kapatılmış şekilde etiketlenir.
5 ml şişeler 10x5 ml olarak plastik viyol veya karton kutu içinde, 25 ml, 50 ml, 100 ml ve 250 ml şişeler münferit kutulu veya kutusuz olarak strafor içerisinde piyasaya sunulmaktadır. Tüm ambalaj şekilleri aynı anda piyasaya sunulmayabilir.

6.6 Kullanılmış veya arta kalan ürünün imhasına ilişkin özel önlemler:
Kullanılmamış veya arta kalan ürün ve bu ürünün kullanımıyla ortaya çıkan atık materyaller ilgili mevzuata göre imha edilmelidir. Her türlü atık/artık materyal evsel atıklarla ve atık sularla karıştırılmamalı, drenaj sistemlerine ve çevreye atılmamalıdır.

7. PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ:
DOLLVET BİYOTEKNOLOJİ A.Ş.
Konaklar Mahallesi Akasyalı Sokak No:10 Beşiktaş/İstanbul
E-mail: dollvet@dollvet.com.tr Telefon: +90 212 422 02 01 Faks: +90 212 422 00 72

8. PAZARLAMA İZNİ NUMARASI:

9. PAZARLAMA İZNİNİN İLK VERİLME VEYA YENİLEME TARİHİ:
14.07.2026

10. METİN DEĞİŞİKLİK TARİHİ:

PROSPEKTÜS

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır
RESBOVİS-4
Enjeksiyonluk Süspansiyon
Sığırlarda, Enfeksiyöz Sığır Rinotrakeitisi (IBR) Virüsü, Sığır İshal (BVD) Virüsü, Sığır Solunum Sinsityal (BRSV) Virüsü, Sığır Parainfluenza 3 (PI 3) Virüsüne Karşı İnaktif Aşı

BİLEŞİMİ:
Her bir doz aşı (5 ml) içeriği aşağıdaki gibidir:

Aktif madde	**Miktar**
İnaktif Bovine herpesvirüs Tip-1 (BoHV-1) antijeni	≥ 4 $\log_2$ VNT*
İnaktif Bovine respiratory syncytial virüs (BRSV) antijeni	≥ 4 $\log_2$ VNT*
İnaktif Bovine parainfluenza virüs-3 (BPIV-3) antijeni	≥ 6 $\log_2$ VNT*
İnaktif Bovine viral diarrhea (CP-BVDV) antijeni	≥ 6 $\log_2$ VNT*
İnaktif Bovine viral diarrhea (NCP-BVDV) antijeni	≥ 6 $\log_2$ FAVN**
Yardımcı maddeler	
Alüminyum hidroksit jel (Al^{+3})	1,5 mg/ml
Saponin	0,3 mg/ml

*1/2 doz ile aşılı tavşanlarda VNT ($\log_2$) titresi
**1/2 doz ile aşılı tavşanlarda FAVN ($\log_2$) titresi

İMMÜNOLOJİK ÖZELLİKLER:
Farmakoterapotik Grup: Sığır için immünolojik inaktif viral aşılar.
ATC Vet Kodu: QI02AA

Sığırlarda, Enfeksiyöz Sığır Rinotrakeitisi (IBR) virüsü, Sığır İshal (BVD) virüsü, Sığır Solunum Sinsityal (BRSV) virüsü, Sığır Parainfluenza 3 (PI 3) virüsü antijenlerine karşı antikor üretimini uyararak, bu etkenlerin neden olduğu enfeksiyonlar ve lezyonları azaltır.

KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLAR:
RESBOVİS-4 Sığırlarda, Enfeksiyöz Sığır Rinotrakeitisi (IBR) virüsü, Sığır İshal (BVD) virüsü, Sığır Solunum Sinsityal (BRSV) virüsü, Sığır Parainfluenza 3 (PI 3) virüsüne karşı inaktif viral aşıdır. Aşılanan hayvanlarda bağışıklık 3 hafta içinde gelişmeye başlar, ilk defa aşılanan hayvanlarda ikinci aşılamayı takiben 2 hafta sonra tam bir immün yanıt oluşturarak bağışıklık oluşur. Aktif bağışıklık 6 ay devam eder. Oluşan aktif bağışıklık bu etkenlerin neden olduğu enfeksiyonlar ve lezyonları azaltır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:
Tüm sığırlara 2 aylıktan itibaren 5 ml miktarında, boynun yan yüzünün orta kısmına veya omuz gerisindeki hareketsiz bölgeye deri altı (SC) veya kas içi (IM) yolla uygulanır. İlk defa aşılanan hayvanlara 3 hafta sonra ikinci uygulama yapılır. 6 ayda bir tek doz halinde uygulama tavsiye edilir.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL UYARILAR:
-Hasta ve inkubasyon dönemindeki sirayetten şüpheli hayvanlar ile stres altındaki hayvanlar aşılanmamalıdır.
-Aşı uygulamadan önce vücut sıcaklığına getirilmelidir.
-Aşı kullanılacağı zaman, aşı şişesi her kullanımdan önce hafifçe çalkalanmalıdır.
-Aşılama sırasında aşı şişesi güneşten korunmalı, mümkünse buz içinde bulundurulmalıdır.
-Her uygulamada aseptik iğne ve enjektörler kullanılmalıdır.
-Aşı yalnızca veteriner hekim veya veteriner hekim gözetimindeki veteriner sağlık teknisyenlerince uygulanmalıdır.

Gebelik ve laktasyonda kullanım: Gebelik ve laktasyon döneminde kullanımı uygundur.

İSTENMEYEN ETKİLER:
Hayvanlarda çok yaygın olarak enjeksiyon yerinde kısa süreli lokal reaksiyonlar (kızarıklık, hafif şişlik ve kabuklanmalar) ve vücut sıcaklıklarında geçici bir artış görülebilir. Çok seyrek olarak duyarlı hayvanlarda anafilaktik reaksiyon gelişebilir. Bu durumda semptomatik tedavi (antihistaminik/antialerjik ilaçlar) uygulanabilir.

-Çok yaygın (10 hayvanda 1'den fazla)
-Yaygın (100 hayvanda 1'den fazla fakat 10'dan az)
-Yaygın olmayan (1.000 hayvanda 1'den fazla fakat 10'dan az)
-Seyrek (10.000 hayvanda 1'den fazla fakat 10'dan az)
-Çok seyrek (10,000 hayvanda 1'den az)

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ:
Bu ürünün diğer aşılarla birlikte kullanıldığında geçimliliği hakkında bilgi bulunmamaktadır. Bu nedenle bu ürünün diğer ürünlerle aynı günde veya farklı zamanlarda kullanımının etkili ve güvenilir olduğu ispatlanmamıştır.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT:
İnaktif bir aşı olduğu için doz aşımı çalışması yapılmamıştır.

GIDA DEĞERİ OLAN HAYVANLARDA KALINTI UYARILARI:
Aşı uygulamalarından sonra insan tüketimine sunulan et, sakatat ve süt için kalıntı arınma süresi 0 (sıfır) gündür.

KONTRENDİKASYONLAR:
Bilinen bir kontrendikasyonu yoktur.

GENEL UYARILAR:
"Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz."
"Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız."

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN ÖNERİLER:
-İnsan sağlığı için bilinen bir olumsuz etkisi yoktur, ancak aşı uygulama sırasında olabilecek yaralanmalarda bölge temizlenerek dezenfekte edilmelidir.
-Aşıyı kazara kendinize enjekte etmeniz hâlinde derhal tıbbi yardıma başvurun ve ürünün kullanma talimatını veya etiketini doktorunuza gösterin.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ:
Enjeksiyonluk süspansiyon: 2-8 ºC'de ve karanlıkta muhafaza edilmelidir. Dondurmayınız.
Raf ömrü 24 aydır.
Açılan şişeler 6-8 saat içinde kullanılmalıdır.

KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR:
Kullanılmamış veya arta kalan ürün ve bu ürünün kullanımıyla ortaya çıkan atık materyaller ilgili mevzuata göre imha edilmelidir. Her türlü atık/artık materyal evsel atıklarla ve atık sularla karıştırılmamalı, drenaj sistemlerine ve çevreye atılmamalıdır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKİLLERİ:
Aşı 5 ml Tip I amber renkli cam şişeler ile 25 ml, 50 ml ve 100 ml Tip II amber renkli cam şişeler veya 25 ml, 50 ml, 100 ml ve 250 ml beyaz renkli polipropilen plastik şişelerde ambalajlanır. Cam ve plastik şişeler bromobutil tıpa ve alüminyum kapak ile kapatılmış şekilde etiketlenir.
5 ml şişeler 10x5 ml olarak plastik viyol veya karton kutu içinde, 25 ml, 50 ml, 100 ml ve 250 ml şişeler münferit kutulu veya kutusuz olarak strafor içerisinde piyasaya sunulmaktadır. Tüm ambalaj şekilleri aynı anda piyasaya sunulmayabilir.

PROSPEKTÜSÜN ONAY TARİHİ: 14.07.2026

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİHİ: 14.07.2026

PAZARLAMA İZİN SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ:
DOLLVET BİYOTEKNOLOJİ A.Ş.
Konaklar Mahallesi Akasyalı Sokak No:10 Beşiktaş/İstanbul
E-mail: dollvet@dollvet.com.tr **Telefon:** +90 212 422 02 01 **Faks:** +90 212 422 00 72

ÜRETİCİ FİRMA VE ADRESİ:
DOLLVET BİYOTEKNOLOJİ A.Ş.

Organize Sanayi Bölgesi Koçören OSB Mahallesi 106. Cadde No:6 Eyyübiye/ŞANLIURFA
E-mail: dollvet@dollvet.com.tr **Telefon:** +90 414 369 11 33 **Faks:** +90 414 369 16 92

İç ambalaj etiketi (5 ml)

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır
RESBOVİS-4
Enjeksiyonluk Süspansiyon
Sığırlarda, Enfeksiyöz Sığır Rinotrakeitisi (IBR) Virüsü, Sığır İshal (BVD) Virüsü, Sığır Solunum Sinsityal (BRSV) Virüsü, Sığır Parainfluenza 3 (PI 3) Virüsüne Karşı İnaktif Aşı

Her bir doz aşı (5 ml) içeriği aşağıdaki gibidir:

İnaktif Bovine herpesvirüs Tip-1 (BoHV-1) antijeni	≥ 4 $\log_2$ VNT*
İnaktif Bovine respiratory syncytial virüs (BRSV) antijeni	≥ 4 $\log_2$ VNT*
İnaktif Bovine parainfluenza virüs-3 (BPIV-3) antijeni	≥ 6 $\log_2$ VNT*
İnaktif Bovine viral diarrhea (CP-BVDV) antijeni	≥ 6 $\log_2$ VNT*
İnaktif Bovine viral diarrhea (NCP-BVDV) antijeni	≥ 6 $\log_2$ FAVN**

*1/2 doz ile aşılı tavşanlarda VNT ($\log_2$) titresi
**1/2 doz ile aşılı tavşanlarda FAVN ($\log_2$) titresi

Tüm sığırlara 5 ml miktarında deri altı (SC) veya kas içi (IM) yolla uygulanır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKİLLERİ:
5 ml

SERİ NO:
ÜRETİM TARİHİ:
SON KULLANMA TARİHİ:

İç ambalaj etiketi (25 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml)

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır
RESBOVİS-4
Enjeksiyonluk Süspansiyon
Sığırlarda, Enfeksiyöz Sığır Rinotrakeitisi (IBR) Virüsü, Sığır İshal (BVD) Virüsü, Sığır Solunum Sinsityal (BRSV) Virüsü, Sığır Parainfluenza 3 (PI 3) Virüsüne Karşı İnaktif Aşı

BİLEŞİMİ:
Her bir doz aşı (5 ml) içeriği aşağıdaki gibidir:

İnaktif Bovine herpesvirüs Tip-1 (BoHV-1) antijeni	≥ 4 $\log_2$ VNT*
İnaktif Bovine respiratory syncytial virüs (BRSV) antijeni	≥ 4 $\log_2$ VNT*
İnaktif Bovine parainfluenza virüs-3 (BPIV-3) antijeni	≥ 6 $\log_2$ VNT*
İnaktif Bovine viral diarrhea (CP-BVDV) antijeni	≥ 6 $\log_2$ VNT*

İnaktif Bovine viral diarrhea (NCP-BVDV) antijeni	≥ 6 log_2 FAVN**

*1/2 doz ile aşılı tavşanlarda VNT (log_2) titresi
**1/2 doz ile aşılı tavşanlarda FAVN (log_2) titresi

Yardımcı madde olarak $Al(OH)_3$ ve saponin içerir.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:
Tüm sığırlara 5 ml miktarında deri altı (SC) veya kas içi (IM) yolla uygulanır.

"Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz"
"Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz"

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ:
2-8 ºC'de karanlıkta muhafaza edilmelidir. Dondurmayınız.

TİCARİ TAKDİM ŞEKİLLERİ:
25 ml, 50 ml, 100 ml ve 250 ml

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİH: 14.07.2026

PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ:
DOLLVET BİYOTEKNOLOJİ A.Ş.
Konaklar Mah. Akasyalı Sok. No:10 Beşiktaş /İSTANBUL

SERİ NO:
ÜRETİM TARİHİ:
SON KULLANMA TARİHİ:

<u>Dış ambalaj etiketi (5 ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml)</u>

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır
RESBOVİS-4
Enjeksiyonluk Süspansiyon
Sığırlarda, Enfeksiyöz Sığır Rinotrakeitisi (IBR) Virüsü, Sığır İshal (BVD) Virüsü, Sığır Solunum Sinsityal (BRSV) Virüsü, Sığır Parainfluenza 3 (PI 3) Virüsüne Karşı İnaktif Aşı

BİLEŞİMİ:
Her bir doz aşı (5 ml) içeriği aşağıdaki gibidir:

Aktif madde	**Miktar**
İnaktif Bovine herpesvirüs Tip-1 (BoHV-1) antijeni	≥ 4 log_2 VNT*
İnaktif Bovine respiratory syncytial virüs (BRSV) antijeni	≥ 4 log_2 VNT*
İnaktif Bovine parainfluenza virüs-3 (BPIV-3) antijeni	≥ 6 log_2 VNT*
İnaktif Bovine viral diarrhea (CP-BVDV) antijeni	≥ 6 log_2 VNT*
İnaktif Bovine viral diarrhea (NCP-BVDV) antijeni	≥ 6 log_2 FAVN**
Yardımcı maddeler	

Alüminyum hidroksit jel (Al^{+3})	1,5 mg/ml
Saponin	0,3 mg/ml

*1/2 doz ile aşılı tavşanlarda VNT (log_2) titresi
**1/2 doz ile aşılı tavşanlarda FAVN (log_2) titresi

KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLAR:
Sığırlarda, Enfeksiyöz Sığır Rinotrakeitisi (IBR) virüsü, Sığır İshal (BVD) virüsü, Sığır Solunum Sinsityal (BRSV) virüsü, Sığır Parainfluenza 3 (PI 3) virüsüne karşı kombine inaktif viral aşıdır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:
Tüm sığırlara 2 aylıktan itibaren 5 ml miktarında, boynun yan yüzünün orta kısmına veya omuz gerisindeki hareketsiz bölgeye deri altı (SC) veya kas içi (IM) yolla uygulanır. İlk defa aşılanan hayvanlara 3 hafta sonra ikinci uygulama yapılır. 6 ayda bir tek doz halinde uygulama tavsiye edilir.

GIDA DEĞERİ OLAN HAYVANLARDA KALINTI UYARILARI:
Aşı uygulamalarından sonra insan tüketimine sunulan et, sakatat ve süt için kalıntı arınma süresi 0 (sıfır) gündür.

GENEL UYARILAR:
"Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz"
"Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz"

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ:
2-8 ºC'de ve karanlıkta muhafaza edilmelidir. Dondurmayınız.
Raf ömrü 24 aydır.
Açılan şişeler 6-8 saat içinde kullanılmalıdır.

KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR:
Kullanılmamış veya arta kalan ürün ve bu ürünün kullanımıyla ortaya çıkan atık materyaller ilgili mevzuata göre imha edilmelidir. Her türlü atık/artık materyal evsel atıklarla ve atık sularla karıştırılmamalı, drenaj sistemlerine ve çevreye atılmamalıdır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKİLLERİ:
Aşı 5 ml Tip I amber renkli cam şişeler ile 25 ml, 50 ml ve 100 ml Tip II amber renkli cam şişeler veya 25 ml, 50 ml, 100 ml ve 250 ml beyaz renkli polipropilen plastik şişelerde ambalajlanır. Cam ve plastik şişeler bromobutil tıpa ve alüminyum kapak ile kapatılmış şekilde etiketlenir.
5 ml şişeler 10x5 ml olarak plastik viyol veya karton kutu içinde, 25 ml, 50 ml, 100 ml ve 250 ml şişeler münferit kutulu veya kutusuz olarak strafor içerisinde piyasaya sunulmaktadır. Tüm ambalaj şekilleri aynı anda piyasaya sunulmayabilir.

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİH: 14.07.2026

PAZARLAMA İZİN SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ:
DOLLVET BİYOTEKNOLOJİ A.Ş.
Konaklar Mahallesi Akasyalı Sokak No:10 Beşiktaş/İstanbul
E-mail: dollvet@dollvet.com.tr **Telefon:** +90 212 422 02 01 **Faks:** +90 212 422 00 72

ÜRETİCİ FİRMA VE ADRESİ:
DOLLVET BİYOTEKNOLOJİ A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi Koçören OSB Mahallesi 106. Cadde No:6 Eyyübiye/ŞANLIURFA
E-mail: dollvet@dollvet.com.tr **Telefon:** +90 414 369 11 33 **Faks:** +90 414 369 16 62

SERİ NO:
ÜRETİM TARİHİ:
SON KULLANMA TARİHİ:
KDV DAHİL PERAKENDE SATIŞ FİYATI: