ÜRÜN ÖZELLİKLERİ ÖZETİ

1. VETERİNER TIBBİ ÜRÜNÜN İSMİ:
RESOLİD CAT Enjeksiyonluk Süspansiyon Liyofilizatı ve Çözücüsü

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM:
Her 1 doz aşının içeriği aşağıdaki gibidir:

Enjeksiyonluk süspansiyon liyofilizatı

Aktif madde	**Miktar**	**İşlevi**
Atenüe Feline calicivirüs F9 suşu	$\geq 10^{4,6}$ $DKID_{50}$/doz*	İmmunize eden antijen
Atenüe Feline herpesvirüs tip 1 FVRm suşu	$\geq 10^{5,2}$ $DKID_{50}$/doz*	
Atenüe Feline panleukopenia Philips-Roxane suşu	$\geq 10^{4,0}$ $FAID_{50}$/doz**	
Yardımcı maddeler		
Laktalbumin hidrolizat	0,25 mg/doz	Stabilizatör
Sukroz	0,50 mg/doz	

*Doku Kültürü İnfektif Doz
**Floresan Antikor İnfektif Doz

Parenteral uygulama için çözücü

Bileşenler	**Miktar**	**İşlevi**
Sodyum klorür	8,5 mg/ml	Sulandırma sıvısı
Disodyum hidrojen fosfat heptahidrat	0,18 mg/ml	
Sodyum dihidrojen fosfat dihidrat	0,06 mg/ml	
Enjeksiyonluk su	1 ml q.s.	

Yardımcı maddelerin tam listesi için bölüm 6.1'e bakınız.

3. FARMASÖTİK ŞEKİL:
Enjeksiyonluk süspansiyon liyofilizatı ve çözücüsü
Krem renkli liyofilize pelet ve renksiz berrak çözücü

4. KLİNİK ÖZELLİKLER:
4.1. Hedef tür:
Kedi.

4.2. Her bir hedef tür için kullanım alanı:
RESOLİD CAT kedilerde, Feline herpesvirüs 1 kaynaklı viral rhinotracheitis, Feline calicivirüs kaynaklı calicivirosis ve Feline panleukopenia virüs kaynaklı panleukopenia hastalıklarına karşı koruyucu amaçla uygulanır. Rapeli takiben Feline calicivirüs ve Feline herpesvirüs 1 için 4 hafta sonra, Feline panleukopenia için 3 hafta sonra immun yanıt oluşturarak bağışıklık oluşur. Bağışıklık süresi aşılamayı takiben 1 yıldır.

4.3. Kontrendikasyonlar:
Bilinen bir kontrendikasyonu yoktur.

4.4. Her bir hedef tür için özel uyarılar:
Yalnızca sağlıklı hayvanları aşılayınız.

4.5. Kullanıma ilişkin özel uyarılar
(i) Hayvanlarda kullanıma ilişkin özel uyarılar:
- Hasta ve inkubasyon dönemindeki sirayetten şüpheli hayvanlar ile stres altındaki hayvanlar aşılanmamalıdır.
- Aşı kullanılacağı zaman liyofilize pelet steril enjektörler kullanılarak çözücü ile iyice çözdürülmeli ve aşı şişesi kullanımdan önce hafifçe çalkalanmalıdır.
- Aşı uygulamadan önce vücut sıcaklığına getirilmelidir.
- Aşılama sırasında aşı şişesi güneşten korunmalıdır.
- Uygulamada aseptik iğne ve enjektörler kullanılmalıdır.
- Aşı yalnızca veteriner hekim veya veteriner hekim gözetimindeki veteriner sağlık teknisyenlerince uygulanmalıdır.

(ii) Ürünü uygulayana ilişkin özel uyarılar:
- İnsan sağlığı için bilinen bir olumsuz etkisi yoktur, ancak aşı uygulama sırasında olabilecek yaralanmalarda bölge temizlenerek dezenfekte edilmelidir.
- Aşıyı kazara kendinize enjekte etmeniz hâlinde derhal tıbbi yardıma başvurun ve ürünün kullanma talimatını veya etiketini doktorunuza gösterin.

(iii) Diğer uyarılar:

4.6. İstenmeyen etkiler (sıklık ve şiddet):
Hayvanlarda çok yaygın olarak enjeksiyon yerinde kısa süreli lokal reaksiyonlar (kızarıklık, hafif şişlik ve kabuklanmalar) ve vücut sıcaklıklarında geçici bir artış görülebilir. Çok seyrek olarak duyarlı hayvanlarda anafilaktik reaksiyon gelişebilir. Bu durumda semptomatik tedavi (antihistaminik/antialerjik ilaçlar) uygulanabilir.

- Çok yaygın (10 hayvanda 1'den fazla)
- Yaygın (100 hayvanda 1'den fazla fakat 10'dan az)
- Yaygın olmayan (1.000 hayvanda 1'den fazla fakat 10'dan az)
- Seyrek (10.000 hayvanda 1'den fazla fakat 10'dan az)
- Çok seyrek (10,000 hayvanda 1'den az)

4.7. Gebelik, laktasyon ve yumurtlama döneminde kullanım:
Gebelik ve laktasyon döneminde kullanımı önerilmemektedir.

4.8. Diğer tıbbi ürünlerle etkileşimi ve diğer etkileşim şekilleri:
Bu ürünün diğer aşılarla birlikte kullanıldığında geçimliliği hakkında bilgi bulunmamaktadır. Bu nedenle bu ürünün diğer ürünlerle aynı günde veya farklı zamanlarda kullanımının etkili ve güvenilir olduğu ispatlanmamıştır.

4.9. Dozaj ve kullanım yolu:
Liyofilize pelet üzerine çözücü ilave edilir. Sınırlı köpük oluşumu ile homojen bir süspansiyon elde etmek için aşıyı yavaşça sulandırınız. Sulandırma sonrası pembe renkli ve berrak enjeksiyonluk süspansiyon elde edilir. Enjektöre çekilerek 8 haftalıktan itibaren yavru kedilere ve yetişkin kedilere 1 doz (1 ml) miktarında deri altı (subcutan) yolla uygulanır. Koruyucu düzeyde bağışıklık için 4 hafta ara ile 2 kere aşılama yapılır. Aşılama her yıl tekrarlanmalıdır.

4.10. Doz Aşımı, varsa semptomlar, acil prosedürler, antidotlar:
Güvenlik çalışmalarında normal uygulama dozunun 10 katı dozu uygulamada güvenli olduğu görülmüştür.

4.11. Kalıntı Arınma Süreleri (sıfır gün olanlar da dahil):
Gıda değeri olan hayvanlarda kullanılmaz.

5. İMMUNOLOJİK ÖZELLİKLER:
Farmakoterapotik grup: Atenüe, liyofilize Feline Calicivirüs, Feline herpesvirüs, Feline panleukopenia aşısı.
ATC Vet kodu: QI06AD04

RESOLİD CAT kedilerde, Feline herpesvirüs 1 kaynaklı viral rhinotracheitis, Feline calicivirüs kaynaklı calicivirosis ve Feline panleukopenia virüs kaynaklı panleukopenia hastalıklarına karşı koruyucu amaçla uygulanan atenüe liyofilize aşıdır.

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER:
6.1. Yardımcı maddeler:
Enjeksiyonluk süspansiyon liyofilizatı:
Laktalbumin hidrolizat
Sukroz

Parenteral uygulama için çözücü:
Sodyum klorür
Disodyum hidrojen fosfat heptahidrat
Sodyum dihidrojen fosfat dihidrat
Enjeksiyonluk su

6.2. Geçimsizlikler:
Ürünün diğer ürünlerle kullanılmasının güvenliği ve etkinliği bilinmemektedir.

6.3. Raf ömrü:
Satışa sunulmuş haliyle raf ömrü:
Enjeksiyonluk süspansiyon liyofilizatı: 24 ay.
Parenteral uygulama için çözücü: 24 ay.
İç ambalaj açıldıktan sonraki raf ömrü: 2 saat.

6.4. Muhafaza şartları:
Enjeksiyonluk süspansiyon liyofilizatı: 2-8 ºC'de ve karanlıkta muhafaza edilmelidir. Dondurmayınız.
Parenteral uygulama için çözücü: Buzdolabına konulmadan, karanlıkta ve 25°C'den düşük sıcaklıkta muhafaza edilir. Dondurmayınız.
Sulandırılan aşı 2 saat içinde kullanılmalıdır.

6.5. Birincil ambalajın niteliği ve kompozisyonu:
Aşı 1 dozluk liyofilize pelet içeren 2R Tip I renksiz cam şişelerde; parenteral uygulama için çözücü içeren 1 ml 2R Tip I renksiz cam şişelerde ambalajlanır. Cam şişeler bromobutil tıpa ve alüminyum kapak ile kapatılmış şekilde etiketlenir.
Ürün plastik viyol veya kutu içerisinde 10x1 doz liyofilize pelet ve 10x1 ml parenteral uygulama için çözücü içerecek şekilde piyasaya sunulmaktadır. Tüm ambalaj şekilleri aynı anda piyasaya sunulmayabilir.

6.6 Kullanılmış veya arta kalan ürünün imhasına ilişkin özel önlemler:
Kullanılmış veya arta kalan ürün ve bu ürünün kullanımıyla ortaya çıkan atık materyaller ilgili mevzuata göre imha edilmelidir. Her türlü atık/artık materyal evsel atıklarla ve atık sularla karıştırılmamalı, drenaj sistemlerine ve çevreye atılmamalıdır.

7. PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ:
DOLLVET BİYOTEKNOLOJİ A.Ş.
Konaklar Mahallesi Akasyalı Sokak No:10 Beşiktaş/İstanbul
E-mail: dollvet@dollvet.com.tr Telefon: +90 212 422 02 01 Faks: +90 212 422 00 72

8. PAZARLAMA İZNİ NUMARASI:-

9. PAZARLAMA İZNİNİN İLK VERİLME VEYA YENİLEME TARİHİ:14.10.2025

10. METİN DEĞİŞİKLİK TARİHİ:

PROSPEKTÜS BİLGİLERİ

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır

RESOLİD CAT

Rhinotracheitis, Calicivirosis ve Panleukopenia Enfeksiyonlarına Karşı Kombine Atenüe Aşı Enjeksiyonluk Süspansiyon Liyofilizatı ve Çözücüsü

BİLEŞİMİ:

Her 1 doz aşının içeriği aşağıdaki gibidir:

Enjeksiyonluk süspansiyon liyofilizatı

Aktif madde	**Miktar**	**İşlevi**
Atenüe Feline calicivirüs F9 suşu	$\geq 10^{4,6}$ $DKID_{50}$/doz*	İmmunize eden antijen
Atenüe Feline herpesvirüs tip 1 FVRm suşu	$\geq 10^{5,2}$ $DKID_{50}$/doz*	
Atenüe Feline panleukopenia Philips-Roxane suşu	$\geq 10^{4,0}$ $FAID_{50}$/doz**	
Yardımcı maddeler		
Laktalbumin hidrolizat	0,25 mg/doz	Stabilizatör
Sukroz	0,50 mg/doz	

*Doku Kültürü İnfektif Doz
**Floresan Antikor İnfektif Doz

Parenteral uygulama için çözücü

Bileşenler	**Miktar**	**İşlevi**
Sodyum klorür	8,5 mg/ml	Sulandırma sıvısı
Disodyum hidrojen fosfat heptahidrat	0,18 mg/ml	
Sodyum dihidrojen fosfat dihidrat	0,06 mg/ml	
Enjeksiyonluk su	1 ml q.s.	

İMMULOJİK ÖZELLİKLER:

Farmakoterapotik Grup: Atenüe, liyofilize Feline Calicivirüs, Feline herpesvirüs, Feline panleukopenia aşısı.
ATC Vet Kodu: QI06AD04

RESOLİD CAT kedilerde, Feline herpesvirüs 1 kaynaklı viral rhinotracheitis, Feline calicivirüs kaynaklı calicivirosis ve Feline panleukopenia virüs kaynaklı panleukopenia hastalıklarına karşı koruyucu amaçla uygulanan atenüe liyofilize aşıdır.

KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLAR:

RESOLİD CAT kedilerde, Feline herpesvirüs 1 kaynaklı viral rhinotracheitis, Feline calicivirüs kaynaklı calicivirosis ve Feline panleukopenia virüs kaynaklı panleukopenia hastalıklarına karşı koruyucu amaçla uygulanır. Rapeli takiben Feline calicivirüs ve Feline herpesvirüs 1 için 4 hafta sonra, Feline panleukopenia için 3 hafta sonra immun yanıt oluşturarak bağışıklık oluşur. Bağışıklık süresi aşılamayı takiben 1 yıldır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:
Liyofilize pelet üzerine çözücü ilave edilir. Sınırlı köpük oluşumu ile homojen bir süspansiyon elde etmek için aşıyı yavaşça sulandırınız. Sulandırma sonrası pembe renkli ve berrak enjeksiyonluk süspansiyon elde edilir. Enjektöre çekilerek 8 haftalıktan itibaren yavru kedilere ve yetişkin kedilere 1 doz (1 ml) miktarında deri altı (subcutan) yolla uygulanır. Koruyucu düzeyde bağışıklık için 4 hafta ara ile 2 kere aşılama yapılır. Aşılama her yıl tekrarlanmalıdır.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL UYARILAR:
- Hasta ve inkubasyon dönemindeki sirayetten şüpheli hayvanlar ile stres altındaki hayvanlar aşılanmamalıdır.
- Aşı kullanılacağı zaman liyofilize pelet steril enjektörler kullanılarak çözücü ile iyice çözdürülmeli ve aşı şişesi kullanımdan önce hafifçe çalkalanmalıdır.
- Aşı uygulamadan önce vücut sıcaklığına getirilmelidir.
- Aşılama sırasında aşı şişesi güneşten korunmalıdır.
- Uygulamada aseptik iğne ve enjektörler kullanılmalıdır.
- Aşı yalnızca veteriner hekim veya veteriner hekim gözetimindeki veteriner sağlık teknisyenlerince uygulanmalıdır.

Gebelik ve laktasyonda kullanım: Gebelik ve laktasyon döneminde kullanımı önerilmemektedir.

İSTENMEYEN ETKİLER:
Hayvanlarda çok yaygın olarak enjeksiyon yerinde kısa süreli lokal reaksiyonlar (kızarıklık, hafif şişlik ve kabuklanmalar) ve vücut sıcaklıklarında geçici bir artış görülebilir. Çok seyrek olarak duyarlı hayvanlarda anafilaktik reaksiyon gelişebilir. Bu durumda semptomatik tedavi (antihistaminik/antialerjik ilaçlar) uygulanabilir.

- Çok yaygın (10 hayvanda 1'den fazla)
- Yaygın (100 hayvanda 1'den fazla fakat 10'dan az)
- Yaygın olmayan (1.000 hayvanda 1'den fazla fakat 10'dan az)
- Seyrek (10.000 hayvanda 1'den fazla fakat 10'dan az)
- Çok seyrek (10,000 hayvanda 1'den az)

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ:
Bu ürünün diğer aşılarla birlikte kullanıldığında geçimliliği hakkında bilgi bulunmamaktadır. Bu nedenle bu ürünün diğer ürünlerle aynı günde veya farklı zamanlarda kullanımının etkili ve güvenilir olduğu ispatlanmamıştır.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT:
Güvenlik çalışmalarında normal uygulama dozunun 10 katı dozu uygulamada güvenli olduğu görülmüştür.

GIDA DEĞERİ OLAN HAYVANLARDA KALINTI UYARILARI:
Gıda değeri olan hayvanlarda kullanılmaz.

KONTRENDİKASYONLAR:
Bilinen bir kontrendikasyonu yoktur.

GENEL UYARILAR:
"Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz."
"Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız."

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN ÖNERİLER:
- İnsan sağlığı için bilinen bir olumsuz etkisi yoktur, ancak aşı uygulama sırasında olabilecek yaralanmalarda bölge temizlenerek dezenfekte edilmelidir.
- Aşıyı kazara kendinize enjekte etmeniz hâlinde derhal tıbbi yardıma başvurun ve ürünün kullanma talimatını veya etiketini doktorunuza gösterin.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ:
Enjeksiyonluk süspansiyon liyofilizatı: 2-8 ºC'de ve karanlıkta muhafaza edilmelidir. Dondurmayınız.
Raf ömrü 24 aydır.
Parenteral uygulama için çözücü: Buzdolabına konulmadan, karanlıkta ve 25°C'den düşük sıcaklıkta muhafaza edilir. Dondurmayınız.
Raf ömrü 24 aydır.
Sulandırılan aşı 2 saat içinde kullanılmalıdır.

KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR:
Kullanılmış veya arta kalan ürün ve bu ürünün kullanımıyla ortaya çıkan atık materyaller ilgili mevzuata göre imha edilmelidir. Her türlü atık/artık materyal evsel atıklarla ve atık sularla karıştırılmamalı, drenaj sistemlerine ve çevreye atılmamalıdır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKİLLERİ:
Aşı 1 dozluk liyofilize pelet içeren 2R Tip I renksiz cam şişelerde; parenteral uygulama için çözücü içeren 1 ml 2R Tip I renksiz cam şişelerde ambalajlanır. Cam şişeler bromobutil tıpa ve alüminyum kapak ile kapatılmış şekilde etiketlenir.
Ürün plastik viyol veya kutu içerisinde 10x1 doz liyofilize pelet ve 10x1 ml parenteral uygulama için çözücü içerecek şekilde piyasaya sunulmaktadır. Tüm ambalaj şekilleri aynı anda piyasaya sunulmayabilir.

PROSPEKTÜSÜN ONAY TARİHİ: 14.10.2025

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİHİ:14.10.2025

PAZARLAMA İZİN SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ:
DOLLVET BİYOTEKNOLOJİ A.Ş.
Konaklar Mahallesi Akasyalı Sokak No:10 Beşiktaş/İstanbul
E-mail: dollvet@dollvet.com.tr **Telefon:** +90 212 422 02 01 **Faks:** +90 212 422 00 72

ÜRETİCİ FİRMA VE ADRESİ:
DOLLVET BİYOTEKNOLOJİ A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi Koçören OSB Mahallesi 106. Cadde No:6 Eyyübiye/ŞANLIURFA
E-mail: dollvet@dollvet.com.tr **Telefon:** +90 414 369 11 33 **Faks:** +90 414 369 16 92

DIŞ AMBALAJ ETİKET BİLGİLERİ
Dış ambalaj etiketi (1 doz)

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır
RESOLİD CAT
Rhinotracheitis, Calicivirosis ve Panleukopenia Enfeksiyonlarına Karşı Kombine Atenüe Aşı Enjeksiyonluk Süspansiyon Liyofilizatı ve Çözücüsü

BİLEŞİMİ:

Aktif madde	**Miktar**
Atenüe Feline calicivirüs F9 suşu	$\geq 10^{4,6}$ $DKID_{50}$/doz*
Atenüe Feline herpesvirüs tip 1 FVRm suşu	$\geq 10^{5,2}$ $DKID_{50}$/doz*
Atenüe Feline panleukopenia Philips-Roxane suşu	$\geq 10^{4,0}$ $FAID_{50}$/doz**
Yardımcı maddeler	
Laktalbumin hidrolizat	0,25 mg/doz
Sukroz	0,50 mg/doz

*Doku Kültürü İnfektif Doz
**Floresan Antikor İnfektif Doz

KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLAR:
Kedilerde, Feline herpesvirüs 1 kaynaklı viral rhinotracheitis, Feline calicivirüs kaynaklı calicivirosis ve Feline panleukopenia virüs kaynaklı panleukopenia hastalıklarına karşı koruyucu amaçla uygulanır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:
Liyofilize pelet üzerine çözücü ilave edilir. Sınırlı köpük oluşumu ile homojen bir süspansiyon elde etmek için aşıyı yavaşça sulandırınız. Sulandırma sonrası pembe renkli ve berrak enjeksiyonluk süspansiyon elde edilir. Enjektöre çekilerek 8 haftalıktan itibaren yavru kedilere ve yetişkin kedilere 1 doz (1 ml) miktarında deri altı (subcutan) yolla uygulanır. Koruyucu düzeyde bağışıklık için 4 hafta ara ile 2 kere aşılama yapılır. Aşılama her yıl tekrarlanmalıdır.

GIDA DEĞERİ OLAN HAYVANLARDA KALINTI UYARILARI:
Gıda değeri olan hayvanlarda kullanılmaz.

GENEL UYARILAR:
"Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz"
"Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz"

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ:
Enjeksiyonluk süspansiyon liyofilizatı: 2-8 ºC'de ve karanlıkta muhafaza edilmelidir. Dondurmayınız.
Raf ömrü 24 aydır.

Parenteral uygulama için çözücü: Buzdolabına konulmadan, karanlıkta ve 25°C'den düşük sıcaklıkta muhafaza edilir. Dondurmayınız.
Raf ömrü 24 aydır.
Sulandırılan aşı 2 saat içinde kullanılmalıdır.

KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR:
Kullanılmış veya arta kalan ürün ve bu ürünün kullanımıyla ortaya çıkan atık materyaller ilgili mevzuata göre imha edilmelidir. Her türlü atık/artık materyal evsel atıklarla ve atık sularla karıştırılmamalı, drenaj sistemlerine ve çevreye atılmamalıdır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKİLLERİ:
Aşı 1 dozluk liyofilize pelet içeren 2R Tip I renksiz cam şişelerde; parenteral uygulama için çözücü içeren 1 ml 2R Tip I renksiz cam şişelerde ambalajlanır. Cam şişeler bromobutil tıpa ve alüminyum kapak ile kapatılmış şekilde etiketlenir.
Ürün plastik viyol veya kutu içerisinde 10x1 doz liyofilize pelet ve 10x1 ml parenteral uygulama için çözücü içerecek şekilde piyasaya sunulmaktadır. Tüm ambalaj şekilleri aynı anda piyasaya sunulmayabilir.

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİH:14.10.2025

PAZARLAMA İZİN SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ:
DOLLVET BİYOTEKNOLOJİ A.Ş.
Konaklar Mahallesi Akasyalı Sokak No:10 Beşiktaş/İstanbul
E-mail: dollvet@dollvet.com.tr **Telefon:** +90 212 422 02 01 **Faks:** +90 212 422 00 72

ÜRETİCİ FİRMA VE ADRESİ:
DOLLVET BİYOTEKNOLOJİ A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi Koçören OSB Mahallesi 106. Cadde No:6 Eyyübiye/ŞANLIURFA
E-mail: dollvet@dollvet.com.tr **Telefon:** +90 414 369 11 33 **Faks:** +90 414 369 16 92

SERİ NO:
ÜRETİM TARİHİ:
SON KULLANMA TARİHİ:
KDV DAHİL PERAKENDE SATIŞ FİYATI:

Parenteral Uygulama İçin Çözücü asgari iç ambalaj etiketi (1 ml)

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır
RESOLİD CAT
Parenteral Uygulama İçin Çözücü

Steril tamponlu fizyolojik tuzlu su

Liyofilize pelet üzerine çözücü ilave edilir. Köpürtmeden çalkalanır. Enjektöre çekilerek uygulama yapılır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKİLLERİ:
2R Tip I renksiz cam şişe 1 ml

SERİ NO:
ÜRETİM TARİHİ:
SON KULLANMA TARİHİ:

İÇ ve DIŞ AMBALAJ ETİKET BİLGİLERİ
İÇ AMBALAJ ETİKET BİLGİLERİ
Enjeksiyonluk Süspansiyon Liyofilizatı için asgari iç ambalaj etiketi (1 doz)

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır
RESOLİD CAT
Rhinotracheitis, Calicivirosis ve Panleukopenia Enfeksiyonlarına Karşı Kombine Atenüe Aşı
Enjeksiyonluk Süspansiyon Liyofilizatı

Atenüe Feline calicivirüs F9 suşu	$\geq 10^{4,6}$ $DKID_{50}$/doz*
Atenüe Feline herpesvirüs tip 1 FVRm suşu	$\geq 10^{5,2}$ $DKID_{50}$/doz*
Atenüe Feline panleukopenia Philips-Roxane suşu	$\geq 10^{4,0}$ $FAID_{50}$/doz**

*Doku Kültürü İnfektif Doz
**Floresan Antikor İnfektif Doz

8 haftalıktan itibaren yavru kedilere ve yetişkin kedilere 1 doz (1 ml) miktarında deri altı (subcutan) yolla uygulanır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKİLLERİ:
2R Tip I renksiz cam şişe 1 doz

SERİ NO:
ÜRETİM TARİHİ:
SON KULLANMA TARİHİ: