ÜRÜN ÖZELLİKLERİ ÖZETİ

1. VETERİNER TIBBİ ÜRÜNÜN İSMİ
SYVA-BAX Enjeksiyonluk Süspansiyon

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM
Bir doz (5 ml/2 ml) için;
Aktif maddeler:
Cl. perfringens tip A α Toksoidi . . . . . ≥0.3 I.U. α antitoksini*
Cl. perfringens tip B ve C β Toksoidi . . . . . ≥ 10 I.U. β antitoksini*
Cl. perfringens tip B ve D ε Toksoidi . . . . . ≥5 I.U. ε antitoksini*
Cl. septicumα Toksoidi . . . . . ≥2.5 I.U. α antitoksini*
Cl. novyi tip B α Toksoidi . . . . . ≥3.5 I.U. α antitoksini*
Cl. tetani Toksoidi . . . . . ≥2.5 I.U. antitoksini*
Cl. sordellii Toksoidi . . . . . 100% koruma (kobaylarda)**
Cl. chauvoei Anakültürü. . . . . ..100% koruma (kobaylarda)**
* Avrupa farmakopesinde belirtilen tavşan serumunun her ml'sinde nötralize eden antikor düzeylerini elde etmek için yeterli miktar.
** Kobaylarda %100 korumayı sağlamak için farklı antijenlerin yeterli miktarı.

Yardımcı Maddeler : Alüminyum hidroksit (Al^{3}+)(Adjuvan). . . . . 5.18 mg(2 ml için)
Alüminyum hidroksit (Al^{3}+)(Adjuvan). . . . . 12.95 mg(5 ml için)
Fenol (Koruyucu) . . . . . 5.4 mg(2 ml için)
Fenol(Koruyucu) . . . . . .13.5 mg(5 ml için)

Tüm yardımcı maddeler için Bölüm 6.1'e bakınız.

3. FARMASÖTİK ŞEKİL
Enjeksiyonluk Süspansiyon

4. KLİNİK ÖZELLİKLER
4.1 Hedef türler
Sığır, koyun ve keçi

4.2 Her bir hedef tür için kullanım alanı
Aşağıdaki hastalıklara karşı sığırların, koyunların ve keçilerin aktif bağışıklanması için kullanılır:
• Kuzularda Clostridium Perfringes Tip A α toksininin neden olduğu enterotoksemi ve ikterik enterotoksemi.
• Clostridium Perfringes Tip B ve C β toksininin neden olduğu enterotoksemi, hemorajik enterit ve dizanteri.
• Clostridium Perfringes Tip B ve D ε toksininin neden olduğu enterotoksemi veya yumuşak böbrek hastalığı.
• Clostridium septikum toksininin neden olduğu malign ödem ve karbunküler ateş.
• Clostridium novyi tip B toksininin neden olduğu nekrotik enfeksiyöz hepatit.
• Clostridium tetani toksininin neden olduğu tetanoz.
• Clostridium sordellii toksininin neden olduğu enterotoksemi.
• Clostridium chauvoei'nin neden olduğu semptomatik karbonkül.

Yukarıda bahsedilen Clostridial etkenlerin sebep olduğu enfeksiyonlara karşı aşılanmış analardan doğan yavrularda pasif bağışıklık sağlanmasında endikedir.
Aşılanmış hayvanlar Cl.sordellii toksininin neden olduğu enterotoksemi ve Cl.Chauvoei 'nin neden olduğu semptomatik karbonkülde ilk aşılamanın ikinci dozundan itibaren 2 hafta sonra, diğer hastalıklara karşı bağışıklık ise üç hafta sonra kazanılır.Bu aktif bağışıklık 6 ay boyunca korunur.
Aşılanmış annelerden yeni doğan hayvanlarda pasif bağışıklık , uygun kolostrumun alınmasıyla elde edilir ve 50 günlük olana kadar korunur.

4.3 Kontrendikasyonlar
Bulunmamaktadır.

4.4 Her bir hedef tür için özel uyarılar
Bulunmamaktadır.

4.5 Kullanıma ilişkin özel uyarılar
i)Hayvanlarda kullanıma ilişkin özel uyarılar
Yalnızca sağlıklı hayvanlar aşılanmalıdır.
Aşılama aseptik koşullar altında yapılmalıdır.

ii)Ürünü uygulayana ilişkin özel uyarılar
Ürün dikkatli bir şekilde uygulanmalıdır.
Yanlışlıkla kendi kendine enjeksiyon durumunda, derhal tıbbi yardım alınmalı ve prospektüs veya etiketi doktora gösterilmelidir.

iii)Diğer
--

4.6 İstenmeyen etkiler (Sıklık ve şiddet)
Nadir durumlarda, yatkınlığı olan hayvanlarda alerjik reaksiyonlar gelişebilir, bu durumda antihistaminikler veya kortikosteroidlerle tedavi önerilir.

İstenmeyen etkilerin sıklığı aşağıdaki gruplara göre sınıflandırılmalıdır:
- Çok yaygın (her 10 hayvanda 1'den fazla)
- Yaygın (100 hayvanda 1'den fazla fakat 10'dan az)
- Yaygın olmayan (1.000 hayvanda 1'den fazla fakat 10'dan az)
- Seyrek (10.000 hayvanda 1'den fazla fakat 10'dan az)
- Çok seyrek (10.000 hayvanda 1'den az).

4.7 Gebelik, laktasyon veya yumurtlama döneminde kullanım
Gebelik ve laktasyonda kullanılabilir.

4.8 Diğer tıbbi ürünlerle etkileşim ve diğer etkileşim şekilleri
Bu aşının başka herhangi bir veteriner tıbbi ürün ile birlikte kullanıldığında güvenliği ve etkinliği hakkında hiçbir bilgi mevcut değildir. Bu nedenle, bu aşının diğer herhangi bir veteriner tıbbi ürününden önce veya sonra kullanılmasına vaka bazında ayrı ayrı karar verilmelidir.

4.9 Dozaj ve kullanım yolu
Kullanmadan önce çalkalayınız.

Deri altı olarak uygulanır.
Sığır,buzağı: 5 ml
Koyun, keçi, kuzu, oğlak: 2 ml

AŞI PROGRAMI
Buzağı, kuzu ve oğlaklar için:
İlk aşılama: 4 hafta arayla iki doz aşılama.
Yavrular aşısız annelerden doğmuş ise, doğumlarının 2. haftasından sonra; aşılı annelerden doğmuşlar ise 12. Haftasından sonra 4 hafta arayla iki ayrı doz uygulanması önerilir.
Tekrar aşılama: Her 6 ayda bir.

Erginler (Gebe olmayan dişiler dahil)
İlk aşılama: 4 hafta arayla iki aşılama.
Tekrar aşılama: Her 6 ayda bir tek doz aşılama.

Gebe Hayvanlar:
Dişi hayvanların gebelik dönemlerinde aktif olarak bağışıklık kazanmaları ,onlardan doğacak yavruların yaşamlarının ilk 3 ayında pasif olarak korunmasını sağlar.
- İlk aşılama: Beklenen doğum tarihinden 8 hafta önce birinci ve 4 hafta önce ikinci (rapel) aşılama yapılmalıdır.
- Tekrar aşılama: Sonraki her doğumdan 3 hafta önce tek doz ile tek uygulama yapılmalıdır.

4.10. Doz aşımı,varsa semptomlar,acil prosedürler,antidotlar(Gerekli ise)
Zararsızlık testleri, önerilen dozun iki kez uygulanmasının hiçbir yan etkisi olmadığını göstermiştir.

4.11Kalıntı arınma süreleri
0(sıfır)gündür.

5. İMMÜNOLOJİK ÖZELLİKLER
ATC Vet Kodu: QI02AB01
Grup :Sığırlar için inaktive edilmiş bakteriyel aşılar

ATC Vet Kodu: QI03AB
Grup :Keçiler için inaktive edilmiş bakteriyel aşılar(Mikoplazma,toksoid ve klamidia dahil)

ATC Vet Kodu: QI04AB01
Grup :Koyunlar için inaktive edilmiş bakteriyel aşılar

SYVA-BAX hedef türlerde Clostridium perfringens (A, B, C ve D tipleri), Clostridium septicum, Clostridium novyi (Tip B), Clostridium chauvoei, Clostridium tetani ve Clostridium sordellii bakterilerinin neden olduğu enfeksiyonlara karşı aktif bağışıklık oluşturulması amacıyla kullanılır.
Ayrıca aşılanmış annelerden yeni doğan hayvanların kolostrum yoluyla pasif bağışıklanması için endikedir.

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1 Yardımcı maddeler

Alüminyum hidroksit
Fenol
Potasyum dihidrojen fosfat
Sodyum klorid
Potasyum klorid
Disodium hidrojen fosfat
Enjeksiyonluk su

6.2 Geçimsizlikler

Diğer veteriner tıbbi ürünlerle karıştırılmamalıdır.

6.3 Raf ömrü

- Ürünün satışa sunulmuş hali ile raf ömrü: 2 yıl
- İç ambalajın ilk açıldıktan sonraki raf ömrü :10 saat

6.4. Muhafaza şartları

2-8 C° arasında buzdolabında, ışıktan korumak için orjinal ambalajında muhafaza edilmeli ve taşınmalıdır. Dondurulmamalıdır.

6.5 Birincil ambalajın niteliği ve kompozisyonu

50 ml(10 sığır dozu,25 koyun-keçi dozu), 100 ml(20 sığır dozu,50 koyun-keçi dozu), 250 ml'lik(50 sığır dozu,125 koyun-keçi dozu) Tip I bromobutil tıpalı ve alüminyum kapaklı Tip II cam şişelerde ve 100 ml ve 250 ml'lik Tip I bromobutil tıpalı ve alüminyum kapaklı polipropilen flakonlarda karton kutu içerisinde satışa sunulmuştur.

6.6 Kullanılmış veya arta kalan ürünün imhasın ilişkin özel önlemler

Kullanılmış veya arta kalan ürün ve atık maddeler ilgili mevzuata göre imha edilmelidir.

7.PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ

SYVA VETERİNER İLAÇLARI SAN. TİC. LTD. ŞTİ
Ataturk Mah. Ertugrul Gazi Sok. Metropol Istanbul C1 Blok No:2 B/34 Atasehir-İSTANBUL

8.PAZARLAMA İZNİ NUMARASI

15.12.2011

9.PAZARLAMA İZNİNİN İLK VERİLME VEYA YENİLEME TARİHİ

15.12.2011

10.METİN DEĞİŞİKLİK TARİHİ

04.08.2026

Prospektüs

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır
SYVA-BAX
Enjeksiyonluk Süspansiyon
9'lu Polivalan İnaktif Klostridial Aşı

BİLEŞİMİ:
Bir doz (5 ml/2 ml) için;
Aktif maddeler:
Cl. perfringens tip A α Toksoidi . . . . . ≥0.3 I.U. α antitoksini*
Cl. perfringens tip Bve C β Toksoidi . . . . . ≥ 10 I.U. β antitoksini*
Cl. perfringens tip Bve D ε Toksoidi . . . . . ≥5 I.U. ε antitoksini*
Cl. Septicum α Toksoidi . . . . . ≥2.5 I.U. α antitoksini*
Cl. novyi tip B α Toksoidi . . . . . ≥3.5 I.U. α antitoksini*
Cl. tetani Toksoidi . . . . . ≥2.5 I.U. antitoksini*
Cl. sordellii Toksoidi . . . . . 100% koruma (kobaylarda)**
Cl. chauvoei Anakültürü. . . . . 100% koruma (kobaylarda)**
* Avrupa farmakopesinde belirtilen tavşan serumunun her ml'sinde nötralize eden antikor düzeylerini elde etmek için yeterli miktar.
** Kobaylarda %100 korumayı sağlamak için farklı antijenlerin yeterli miktarı.
Yardımcı Maddeler : Alüminyum hidroksit ($Al^{3}+$)(Adjuvan). . . . . 5.18 mg(2 ml için)
Alüminyum hidroksit ($Al^{3}+$)(Adjuvan). . . . . 12.95 mg(5 ml için)
Fenol(Koruyucu) . . . . . 5.4 mg(2 ml için)
Fenol(Koruyucu) . . . . . .13.5mg(5 ml için)

İMMÜNOLOJİK ÖZELLİKLER
ATC Vet Kodu: QI02AB01
Grup : Sığırlar için inaktive edilmiş bakteriyel aşılar

ATC Vet Kodu: QI03AB
Grup : Keçiler için inaktive edilmiş bakteriyel aşılar(Mikoplazma,toksoid ve klamidia dahil)

ATC Vet Kodu: QI04AB01
Grup : Koyunlar için inaktive edilmiş bakteriyel aşılar

SYVA-BAX hedef türlerde Clostridium perfringens (A, B, C ve D tipleri), Clostridium septicum, Clostridium novyi (Tip B), Clostridium chauvoei, Clostridium tetani ve Clostridium sordellii bakterilerinin neden olduğu enfeksiyonlara karşı aktif bağışıklık oluşturulması amacıyla kullanılır.
Ayrıca aşılanmış annelerden yeni doğan hayvanların kolostrum yoluyla pasif bağışıklanması için endikedir.

KULLANIM SAHASI/ENDİKASYONLARI
Aşağıdaki hastalıklara karşı sığır, koyun ve keçilerin aktif bağışıklanması için kullanılır:
• Kuzularda Clostridium Perfringes Tip A α toksininin neden olduğu enterotoksemi ve ikterik enterotoksemi.
• Clostridium Perfringes Tip B ve C β toksininin neden olduğu enterotoksemi, hemorajik enterit ve dizanteri.

• Clostridium Perfringes Tip B ve C ε toksininin neden olduğu enterotoksemi veya yumuşak böbrek hastalığı.
• Clostridium septikum toksininin neden olduğu malign ödem ve karbunküler ateş.
• Clostridium novyi tip B toksininin neden olduğu nekrotik enfeksiyöz hepatit.
• Cllostridium tetani toksininin neden olduğu tetanozda.
• Clostridium sordellii toksininin neden olduğu enterotoksemi.
• Clostridium chauvoei'nin neden olduğu semptomatik karbonkül.
Yukarıda bahsedilen Clostridial etkenlerin sebep olduğu enfeksiyonlara karşı aşılanmış analardan doğan yavrularda pasif bağışıklık sağlanmasında endikedir.
Aşılanmış hayvanlar Cl.sordellii toksininin neden olduğu enterotoksemi ve Cl.Chauvoei 'nin neden olduğu semptomatik karbonkülde ilk aşılamanın ikinci dozundan itibaren 2 hafta sonra, diğer hastalıklara karşı bağışıklık ise üç hafta sonra kazanılır. Bu aktif bağışıklık 6 ay boyunca korunur.
Aşılanmış annelerden yeni doğan hayvanlarda pasif bağışıklık, uygun kolostrumun alınmasıyla elde edilir ve 50 günlük olana kadar korunur.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Kullanmadan önce çalkalayınız.
Deri altı olarak uygulanır.
Sığır,buzağı: 5 ml
Koyun, keçi,kuzu,oğlak: 2 ml

AŞI PROGRAMI
Buzağı, kuzu ve oğlaklar için:
İlk aşılama: 4 hafta arayla iki doz aşılama.
Yavrular aşısız annelerden doğmuş ise, doğumlarının 2. haftasından sonra, aşılı annelerden doğmuşlar ise 12. Haftasından sonra 4 hafta arayla iki ayrı doz uygulanması önerilir.
Tekrar aşılama: Her 6 ayda bir.

Erginler (Gebe olmayan dişiler dahil)
İlk aşılama: 4 hafta arayla iki aşılama.
Tekrar aşılama: Her 6 ayda bir tek doz aşılama.

Gebe Hayvanlar:
Dişi hayvanların gebelik dönemlerinde aktif olarak bağışıklık kazanmaları onlardan doğacak yavruların yaşamlarının ilk 3 ayında pasif olarak korunmasını sağlar.
- İlk aşılama: Beklenen doğum tarihinden 8 hafta önce birinci ve 4 hafta önce ikinci (rapel) aşılama yapılmalıdır.
- Tekrar aşılama: Sonraki her doğumdan 3 hafta önce tek doz ile tek uygulama yapılmalıdır.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL UYARILAR
Yalnızca sağlıklı hayvanlar aşılanmalıdır.
Aşılama aseptik koşullar altında yapılmalıdır.
Gebelik ve laktasyon döneminde kullanım
Gebelik ve laktasyonda kullanılabilir.

İSTENMEYEN ETKİLER
Nadir durumlarda, yatkınlığı olan hayvanlarda alerjik reaksiyonlar gelişebilir, bu durumda antihistaminikler veya kortikosteroidlerle tedavi önerilir.
İstenmeyen etkilerin sıklığı aşağıdaki gruplara göre sınıflandırılmalıdır:

- Çok yaygın (10 hayvanın 1'den fazla)
- Yaygın (100 hayvanda 1'den fazla fakat 10'dan az)
- Yaygın olmayan (1.000 hayvanda 1'den fazla fakat 10'dan az)
- Seyrek (10.000 hayvanda 1'den fazla fakat 10'dan az)
- Çok seyrek (10.000 hayvanda 1'den az).

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ
Bu aşının başka herhangi bir veteriner tıbbi ürün ile birlikte kullanıldığında güvenliği ve etkinliği hakkında hiçbir bilgi mevcut değildir. Bu nedenle, bu aşının diğer herhangi bir veteriner tıbbi ürününden önce veya sonra kullanılmasına vaka bazında ayrı ayrı karar verilmelidir.
Diğer veteriner tıbbi ürünlerle karıştırılmamalıdır.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT
Zararsızlık testleri, önerilen dozun iki kez uygulanmasının hiçbir yan etkisi olmadığını göstermiştir.

GIDA DEĞERİ OLAN HAYVANLARDA KALINTI UYARILARI
İ.K.A.S: 0 (sıfır) gündür.

KONTRENDİKASYONLAR
Bulunmamaktadır.

GENEL UYARILAR
Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz.
Beklenmeyen bir etki görüldüğünde Veteriner Hekime danışınız.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN ÖNERİLER
Ürün dikkatli bir şekilde uygulanmalıdır.
Yanlışlıkla kendi kendine enjeksiyon durumunda, derhal tıbbi yardım alınmalı ve prospektüs veya etiketi doktora gösterilmelidir.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ
2-8 C° arasında buzdolabında, ışıktan korumak için orjinal ambalajında muhafaza edilmeli ve taşınmalıdır. Dondurulmamalıdır.
- Ürünün satışa sunulmuş hali ile raf ömrü: 2 yıl
- İç ambalajın ilk açıldıktan sonraki raf ömrü :10 saat

KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR
Kullanılmış veya arta kalan ürün ve atık maddeler ilgili mevzuata göre imha edilmelidir.

TİCARİ TAKDİM ŞEKİLLERİ
50 ml(10 sığır dozu, 25 koyun-keçi dozu), 100 ml(20 sığır dozu, 50 koyun-keçi dozu), 250 ml'lik(50 sığır dozu, 125 koyun-keçi dozu) Tip I bromobutil tıpalı ve alüminyum kapaklı Tip II cam şişelerde ve 100 ml ve 250 ml'lik Tip I bromobutil tıpalı ve alüminyum kapaklı polipropilen flakonlarda karton kutu içerisinde satışa sunulmuştur.

PROSPEKTÜSÜN ONAY TARİHİ:04.08.2026

T.C.TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİH VE NO: 15.12.2011

PAZARLAMA İZİN SAHİBİNİN ADI, ADRESİ
SYVA VETERİNER İLAÇLARI SAN. TİC. LTD. ŞTİ
Atatürk Mah. Ertuğrul Gazi Sok. Metropol Istanbul C1 Blok No:2 B/34 Ataşehir-İSTANBUL

ÜRETİCİ FİRMA VE ADRESİ
LABORATORİOS SYVA,S.A.U
Parque Tecnológico de León
Calle Nicostrato Vela,M15-M16 Parcelas 15-16 24009 León SPAIN

Dış Ambalaj Etiketi (50 ml-100 ml-250 ml)

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır
SYVA-BAX
Enjeksiyonluk Süspansiyon
İnaktif Klostridial Aşı

BİLEŞİMİ:
Bir doz (5 ml/2 ml) için;
Aktif maddeler:
Cl. perfringens tip A α Toksoidi . . . . . ≥0.3 I.U. α antitoksini*
Cl. perfringens tip B ve C β Toksoidi . . . . . ≥ 10 I.U. β antitoksini*
Cl. perfringens tip B ve D ε Toksoidi . . . . . ≥5 I.U. ε antitoksini*
Cl. septicum α Toksoidi . . . . . ≥2.5 I.U. α antitoksini*
Cl. novyi tip B α Toksoidi . . . . . ≥3.5 I.U. α antitoksini*
Cl. tetani Toksoidi . . . . . ≥2.5 I.U. antitoksini*
Cl. sordellii Toksoidi . . . . . 100% koruma (kobaylarda)**
Cl. chauvoei Anakültürü. . . . . 100% koruma (kobaylarda)**
* Avrupa farmakopesinde belirtilen tavşan serumunun her ml'sinde nötralize eden antikor düzeylerini elde etmek için yeterli miktar.
** Kobaylarda %100 korumayı sağlamak için farklı antijenlerin yeterli miktarı.
Yardımcı Maddeler : Alüminyum hidroksit (Al^{3}+)(Adjuvan). . . . . 5.18 mg(2 ml için)
Alüminyum hidroksit (Al^{3}+)(Adjuvan). . . . . 12.95 mg(5 ml için)
Fenol(Koruyucu) . . . . . 5.4 mg(2 ml için)
Fenol(Koruyucu) . . . . . .13.5mg(5 ml için)

KULLANIM SAHASI/ENDİKASYONLARI
Sığır, koyun ve keçilerde *Clostridium perfringens (A, B, C ve D tipleri), Clostridium septicum, Clostridium novyi (Tip B), Clostridiumchauvoei, Clostridiumtetani ve Clostridium sordellii* bakterilerinin sebep olduğu enfeksiyonlara karşı aktif bağışıklık oluşturulması amacıyla kullanılır.
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Kullanmadan önce çalkalayınız.
Deri altı olarak uygulanır.
Sığır,buzağı: 5 ml
Koyun, keçi,kuzu, oğlak: 2 ml
Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz.
GIDA DEĞERİ OLAN HAYVANLARDA KALINTI UYARILARI
İ.K.A.S : 0 (sıfır) gündür.

GENEL UYARILAR
Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz.
Beklenmeyen bir etki görüldüğünde Veteriner Hekime danışınız.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ
2-8 C° arasında buzdolabında, ışıktan korumak için orjinal ambalajında muhafaza edilmeli ve taşınmalıdır. Dondurulmamalıdır.
- Ürünün satışa sunulmuş hali ile raf ömrü: 2 yıl
- İç ambalajın ilk açıldıktan sonraki raf ömrü :10 saat

TİCARİ TAKDİM ŞEKİLLERİ
50 ml(10 sığır dozu,25 koyun-keçi dozu), 100 ml(20 sığır dozu,50 koyun-keçi dozu), 250 ml'lik(50 sığır dozu,125 koyun-keçi dozu) Tip I bromobutil tıpalı ve alüminyum kapaklı Tip II cam şişelerde ve 100 ml ve 250 ml'lik Tip I bromobutil tıpalı ve alüminyum kapaklı polipropilen flakonlarda karton kutu içerisinde satışa sunulmuştur.

T.C.TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİH VE NO: 15.12.2011
PAZARLAMA İZİN SAHİBİ
SYVA VETERİNER İLAÇLARI SAN. TİC. LTD. ŞTİ
Ataşehir-İSTANBUL

ÜRETİCİ FİRMA
LABORATORİOS SYVA, S.A.U
Leon- Spain

Üretim tarihi:
Son.kul.tarihi :
Seri no :
KDV Dahil Per.Sat.Fiyatı:

İç Ambalaj Etiketi (50 ml-100 ml-250 ml)

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır
SYVA-BAX
Enjeksiyonluk Süspansiyon
İnaktif Klostridial Aşı

BİLEŞİMİ:
Cl. perfringens tip A α Toksoidi,Cl. perfringens tip B ve C β Toksoidi ,Cl. perfringens tip B ve D ε Toksoidi , Cl. septicumα Toksoidi, Cl. novyi tip B α Toksoidi ,Cl. tetani Toksoidi Cl. sordellii Toksoidi ,Cl. chauvoei Anakültürü ihtiva eder.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Sığır,buzağı : 5 ml
Koyun,keçi,kuzu,oğlak : 2 ml deri altı olarak uygulanır.
Kullanmadan önce şişeyi çalkalayınız.
İ.K.A.S : 0 (sıfır) gündür.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ
2-8 C° arasında buzdolabında, ışıktan korumak için orjinal ambalajında muhafaza edilmeli ve taşınmalıdır. Dondurulmamalıdır.

T.C.TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİH VE NO: 15.12.2011
PAZARLAMA İZİN SAHİBİ
SYVA VETERİNER İLAÇLARI SAN. TİC. LTD. ŞTİ
Atasehir-İSTANBUL

ÜRETİCİ FİRMA
LABORATORİOS SYVA, S.A.U
Leon- Spain

Üretim tarihi:
Son.kul.tarihi :
Seri no :
KDV Dahil Per.Sat.Fiyatı: