ÜRÜN ÖZELLİKLERİ ÖZETİ

1. VETERİNER TIBBİ ÜRÜNÜN İSMİ:
ULTRAPAST Enjeksiyonluk Süspansiyon

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM:
Her bir doz aşı (2 ml) içeriği aşağıdaki gibidir:

Aktif Maddeler:	
Clostridium perfringens β toksoid	≥ 10 IU/ml *
Clostridium perfringens ε toksoid	≥ 5 IU/ml *
Clostridium novyi Tip B α toksoid	≥ 3,5 IU/ml *
Clostridium septicum α toksoid	≥ 2,5 IU/ml *
Clostridium tetani toksoid	≥ 2,5 IU/ml *
İnaktif Clostridium chauvoei antijeni	≥ %90 koruma **
İnaktif Clostridium haemolyticum antijeni	≥ %75 koruma ***
İnaktif Pasteurella multocida antijeni	≥ 1/40 ELISA seropozitif ****
İnaktif Mannheimia haemolytica A1 antijeni ve lökotoksini	≥ 1/40 ELISA seropozitif ****
Yardımcı Maddeler:	
Al^{+3} (Alüminyum hidroksit olarak) (Adjuvan)	3 mg
Fenol (%80) (Koruyucu)	0,003 ml

* 1 koyun dozu ile aşılanmış tavşan kan serumundaki antitoksin miktarı
** 1 koyun dozu ile aşılanmış kobay eprüvasyon sonucu
***1/5 buzağı dozu ile aşılanmış kobay eprüvasyon sonucu
**** 1 koyun dozu ile aşılı tavşanlarda ELISA titresi

Yardımcı maddelerin tam listesi için bölüm 6.1'e bakınız.

3. FARMASÖTİK ŞEKİL:
Enjeksiyonluk Süspansiyon
Açık kahve renkli süspansiyon

4. KLİNİK ÖZELLİKLER:
4.1. Hedef tür:
Sığır, koyun, keçi, buzağı, kuzu ve oğlaklar.

4.2. Her bir hedef tür için kullanım alanı:
Sığır, buzağı, koyun, kuzu, keçi ve oğlaklarda Pasteurella multocida ve Mannheimia haemolytica A1 enfeksiyonlarına, Clostridium chauvoei'nin neden olduğu yanıkara, Clostridium haemolyticum'un neden olduğu basiller ikterohemoglobünüri, Clostridium septicum'un neden olduğu malignant ödem ve bradzot, Clostridium novyi'nin neden olduğu gazlı gangren (miyonekroz) ve enfeksiyöz nekrotik hepatit, Clostridium tetani'nin neden olduğu tetanoz, Clostridium perfringens tip B, C ve D'nin neden olduğu kuzu dizanterisi, enterotoksemi, hemorajik enterotoksemi, struck ve yumuşak böbrek hastalığı enfeksiyonlarına karşı koruyucu amaçla kullanılan inaktif bakterin toksoid bir aşıdır.
ULTRAPAST ile aşılanmış gebe hayvanlardan doğan buzağı, kuzu ve oğlaklarda kolostrum almak koşulu ile Pasteurella multocida ve Mannheimia haemolytica hastalıklarına karşı pasif bağışıklığın 3 haftaya kadar sürmesi beklenir.
Aktif koruyucu bağışıklık 2.aşılamadan 14 gün sonra başlar ve 6 ay boyunca bağışıklık sağlar.

4.3. Kontrendikasyonlar:

Bilinen bir kontrendikasyonu bulunmamaktadır.

4.4. Her bir hedef tür için özel uyarılar:

4.5. Kullanıma ilişkin özel uyarılar:
(i) Hayvanlarda kullanıma ilişkin özel uyarılar:
- Hasta ve inkubasyon dönemindeki sirayetten şüpheli hayvanlar ile stres altındaki hayvanlar aşılanmamalıdır.
- Aşılama sırasında aşı şişesi güneşten korunmalı, mümkünse buz içinde bulundurulmalıdır.
- Aşı uygulamadan önce vücut sıcaklığına getirilmelidir.
- Aşı kullanılacağı zaman, aşı şişesi her kullanımdan önce hafifçe çalkalanmalıdır.
- Her uygulamada aseptik iğne ve enjektörler kullanılmalıdır.
- Aşı yalnızca veteriner hekim veya veteriner hekim gözetimindeki veteriner sağlık teknisyenlerince uygulanmalıdır.

(ii) Ürünü uygulayana ilişkin özel uyarılar:
- İnsan sağlığı için bilinen bir olumsuz etkisi yoktur, ancak aşı uygulama sırasında olabilecek yaralanmalarda bölge temizlenerek dezenfekte edilmelidir.
- Aşıyı kazara kendinize enjekte etmeniz hâlinde derhal tıbbi yardıma başvurun ve ürünün kullanma talimatını veya etiketini doktorunuza gösterin.

(iii) Diğer uyarılar:

4.6. İstenmeyen etkiler (sıklık ve şiddet):
Hayvanlarda çok yaygın olarak enjeksiyon yerinde kısa süreli lokal reaksiyonlar (kızarıklık, hafif şişlik ve kabuklanmalar) ve vücut sıcaklıklarında geçici bir artış görülebilir. Çok seyrek olarak duyarlı hayvanlarda anafilaktik reaksiyon gelişebilir. Bu durumda semptomatik tedavi (antihistaminik/antialerjik ilaçlar) uygulanabilir.
- Çok yaygın (10 hayvanda 1'den fazla)
- Yaygın (100 hayvanda 1'den fazla fakat 10'dan az)
- Yaygın olmayan (1.000 hayvanda 1'den fazla fakat 10'dan az)
- Seyrek (10.000 hayvanda 1'den fazla fakat 10'dan az)
- Çok seyrek (10,000 hayvanda 1'den az)

4.7. Gebelik, laktasyon ve yumurtlama döneminde kullanım:
Gebelik ve laktasyon döneminde kullanımı uygundur.

4.8. Diğer tıbbi ürünlerle etkileşimi ve diğer etkileşim şekilleri:
Ürünün diğer ürünlerle kullanılmasının güvenliği ve etkinliği bilinmemektedir. Dolayısıyla, bu aşının başka herhangi bir veteriner tıbbi üründen önce veya sonra kullanımı konusunda karar alınırken vaka bazında değerlendirme yapılmalıdır.

4.9. Dozaj ve kullanım yolu:
Aşı 2. ayından itibaren; koyunlarda 2 ml ve kuzularda 1 ml arka bacak iç kısmına, keçilerde 2 ml ve oğlaklarda 1 ml kuyruk altına, sığırlarda 4 ml ve buzağılarda 2 ml boynun yan yüzünün orta kısmına veya omuz gerisindeki hareketsiz bölgeye deri altı yolla uygulanır.
İlk kez aşılanan hayvanlar, aşılamadan 21 gün sonra ikinci bir doz ile aşılanmalıdır.

Aşısız gebe hayvanlarda doğumdan 6-9 hafta önce 21 gün aralık ile 2 aşılama yapılmalıdır. Aşılı gebe hayvanlarda ise doğumdan 3-6 hafta önce tek doz aşılama yapılmalıdır.
Aşılı hayvanlara 6 ayda bir tek doz halinde uygulama tavsiye edilir.

4.10. Doz aşımı, varsa semptomlar, acil prosedürler, antidotlar (gerekli ise):
İnaktif bir aşı olduğu için doz aşımı çalışması yapılmamıştır.

4.11. Kalıntı arınma süreleri (sıfır gün olanlar da dahil):
Aşı uygulamalarından sonra insan tüketimine sunulan et, sakatat ve süt için kalıntı arınma süresi 0 (sıfır) gündür.

5. İMMUNOLOJİK ÖZELLİKLER:
Farmakoterapotik grup: İmmünolojikler (İnaktif Bakteriyel Aşı)
ATCvet code: : QI02AB, QI03AB, QI04AB
Clostridium perfringens β toksin, Clostridium perfringens ε toksin, Cl. novyi Tip B α toksin, Cl. septicum α toksin, Clostridium tetani toksin, Clostridium chauvoei, Clostridium haemolyticum, Pasteurella multocida ve Mannheimia haemolytica tip A1 antijenlerine karşı antikor üretimini uyararak, bu etkenlerin neden olduğu enfeksiyonlara karşı immun yanıt oluşturur.

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER:
6.1. Yardımcı maddeler:
Alüminyum hidroksit (Al+3)
Fenol (%80)
Formaldehit (%37)
Sodyum klorür
Potasyum klorür
Disodyum hidrojen fosfat heptahidrat
Potasyum dihidrojen fosfat
Enjeksiyonluk su

6.2. Geçimsizlikler:
Ürün uygulanması sırasında herhangi başka bir ürünle karıştırılmamalıdır.

6.3. Raf ömrü:
Satışa sunulmuş haliyle raf ömrü:
Enjeksiyonluk süspansiyon: 24 ay.
İç ambalaj açıldıktan sonraki raf ömrü: 6-8 saat.

6.4. Muhafaza şartları:
2-8 ºC'de ve karanlıkta muhafaza edilmelidir. Dondurmayınız.
Açılan şişeler 6-8 saat içinde kullanılmalıdır.

6.5. Birincil ambalajın niteliği ve kompozisyonu:
20, 50 ve 100 ml amber renkli cam şişeler veya 20, 50, 100 ve 250 ml beyaz polipropilen plastik şişeler bromobutil tıpa ve alüminyum kapak ile kutulu veya kutusuz olarak strafor içerisinde satışa sunulur. Tüm ambalaj şekilleri aynı anda piyasaya sunulmayabilir.

6.6. Kullanılmış veya arta kalan ürünün imhasına ilişkin özel önlemler:

Kullanılmamış veya arta kalan ürün ve bu ürünün kullanımıyla ortaya çıkan atık materyaller ilgili mevzuata göre imha edilmelidir. Her türlü atık/artık materyal evsel atıklarla ve atık sularla karıştırılmamalı, drenaj sistemlerine ve çevreye atılmamalıdır.

7. PAZARLAMA İZİN SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ:
DOLLVET BİYOTEKNOLOJİ A.Ş.
Konaklar Mah. Akasyalı Sok. No:10 Beşiktaş /İSTANBUL

8. PAZARLAMA İZNİ NUMARASI:

9. PAZARLAMA İZNİNİN İLK VERİLME VEYA YENİLEME TARİHİ:
05.08.2026

10. METİN DEĞİŞİKLİK TARİHİ:

PROSPEKTÜS BİLGİLERİ

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır

ULTRAPAST

Klostridium enfeksiyonları ve Pastörellozise karşı Kombine İnaktif Bakterin-Toksoid Aşı Enjeksiyonluk Süspansiyon

BİLEŞİMİ:

Her bir doz aşı (2 ml) içeriği aşağıdaki gibidir:

Aktif Maddeler:	
Clostridium perfringens β toksoid	≥ 10 IU/ml *
Clostridium perfringens ε toksoid	≥ 5 IU/ml *
Clostridium novyi Tip B α toksoid	≥ 3,5 IU/ml *
Clostridium septicum α toksoid	≥ 2,5 IU/ml *
Clostridium tetani toksoid	≥ 2,5 IU/ml *
İnaktif Clostridium chauvoei antijeni	≥ %90 koruma **
İnaktif Clostridium haemolyticum antijeni	≥ %75 koruma ***
İnaktif Pasteurella multocida antijeni	≥ 1/40 ELISA seropozitif ****
İnaktif Mannheimia haemolytica A1 antijeni ve lökotoksini	≥ 1/40 ELISA seropozitif ****
Yardımcı Maddeler:	
Al^{+3} (Alüminyum hidroksit olarak) (Adjuvan)	3 mg
Fenol (%80) (Koruyucu)	0,003 ml

* 1 koyun dozu ile aşılanmış tavşan kan serumundaki antitoksin miktarı
** 1 koyun dozu ile aşılanmış kobay eprüvasyon sonucu
***1/5 buzağı dozu ile aşılanmış kobay eprüvasyon sonucu
**** 1 koyun dozu ile aşılı tavşanlarda ELISA titresi

İMMÜNOLOJİK ÖZELLİKLER:

Farmakoterapotik grup: İmmünolojikler (İnaktif Bakteriyel Aşı)
ATC Vet Kod: QI02AB, QI03AB, QI04AB

Clostridium perfringens β toksin, Clostridium perfringens ε toksin, Cl. novyi Tip B α toksin, Cl. septicum α toksin, Clostridium tetani toksin, Clostridium chauvoei, Clostridium haemolyticum, Pasteurella multocida ve Mannheimia haemolytica tip A1 antijenlerine karşı antikor üretimini uyararak, bu etkenlerin neden olduğu enfeksiyonlara karşı immun yanıt oluşturur.

KULLANIM SAHASI/ENDİKASYONLAR:

Sığır, buzağı, koyun, kuzu, keçi ve oğlaklarda Pasteurella multocida ve Mannheimia haemolytica A1 enfeksiyonlarına, Clostridium chauvoei'nin neden olduğu yanıkara, Clostridium haemolyticum'un neden olduğu basiller ikterohemoglobünüri, Clostridium septicum'un neden olduğu malignant ödem ve bradzot, Clostridium novyi'nin neden olduğu gazlı gangren (miyonekroz) ve enfeksiyöz nekrotik hepatit, Clostridium tetani'nin neden olduğu tetanoz, Clostridium perfringens tip B, C ve D'nin neden olduğu kuzu dizanterisi, enterotoksemi, hemorajik enterotoksemi, struck ve yumuşak böbrek hastalığı enfeksiyonlarına karşı koruyucu amaçla kullanılan inaktif bakterin toksoid bir aşıdır.

ULTRAPAST ile aşılanmış gebe hayvanlardan doğan buzağı, kuzu ve oğlaklarda kolostrum almak koşulu ile Pasteurella multocida ve Mannheimia haemolytica hastalıklarına karşı pasif bağışıklığın 3 haftaya kadar sürmesi beklenir.

Aktif koruyucu bağışıklık 2.aşılamadan 14 gün sonra başlar ve 6 ay boyunca bağışıklık sağlar.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:
Aşı 2. ayından itibaren; koyunlarda 2 ml ve kuzularda 1 ml arka bacak iç kısmına, keçilerde 2 ml ve oğlaklarda 1 ml kuyruk altına, sığırlarda 4 ml ve buzağılarda 2 ml boynun yan yüzünün orta kısmına veya omuz gerisindeki hareketsiz bölgeye deri altı yolla uygulanır.
İlk kez aşılanan hayvanlar, aşılamadan 21 gün sonra ikinci bir doz ile aşılanmalıdır.
Aşısız gebe hayvanlarda doğumdan 6-9 hafta önce 21 gün aralık ile 2 aşılama yapılmalıdır.
Aşılı gebe hayvanlarda ise doğumdan 3-6 hafta önce tek doz aşılama yapılmalıdır.
Aşılı hayvanlara 6 ayda bir tek doz halinde uygulama tavsiye edilir.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL UYARILAR:
- Hasta ve inkubasyon dönemindeki sirayetten şüpheli hayvanlar ile stres altındaki hayvanlar aşılanmamalıdır.
- Aşılama sırasında aşı şişesi güneşten korunmalı, mümkünse buz içinde bulundurulmalıdır.
- Aşı uygulamadan önce vücut sıcaklığına getirilmelidir.
- Aşı kullanılacağı zaman, aşı şişesi her kullanımdan önce hafifçe çalkalanmalıdır.
- Her uygulamada aseptik iğne ve enjektörler kullanılmalıdır.
- Aşı yalnızca veteriner hekim veya veteriner hekim gözetimindeki veteriner sağlık teknisyenlerince uygulanmalıdır.

Gebelik ve laktasyonda kullanım: Gebelik ve laktasyon döneminde kullanımı uygundur.

İSTENMEYEN ETKİLER:
Hayvanlarda çok yaygın olarak enjeksiyon yerinde kısa süreli lokal reaksiyonlar (kızarıklık, hafif şişlik ve kabuklanmalar) ve vücut sıcaklıklarında geçici bir artış görülebilir. Çok seyrek olarak duyarlı hayvanlarda anafilaktik reaksiyon gelişebilir. Bu durumda semptomatik tedavi (antihistaminik/antialerjik ilaçlar) uygulanabilir.
- Çok yaygın (10 hayvanda 1'den fazla)
- Yaygın (100 hayvanda 1'den fazla fakat 10'dan az)
- Yaygın olmayan (1.000 hayvanda 1'den fazla fakat 10'dan az)
- Seyrek (10.000 hayvanda 1'den fazla fakat 10'dan az)
- Çok seyrek (10,000 hayvanda 1'den az)

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ:
Ürünün diğer ürünlerle kullanılmasının güvenliği ve etkinliği bilinmemektedir. Dolayısıyla, bu aşının başka herhangi bir veteriner tıbbi üründen önce veya sonra kullanımı konusunda karar alınırken vaka bazında değerlendirme yapılmalıdır. Ürün uygulanması sırasında herhangi başka bir ürünle karıştırılmamalıdır.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT:
İnaktif bir aşı olduğu için doz aşımı çalışması yapılmamıştır.

GIDA DEĞERİ OLAN HAYVANLARDA KALINTI UYARILARI:
Aşı uygulamalarından sonra insan tüketimine sunulan et, sakatat ve süt için kalıntı arınma süresi 0 (sıfır) gündür.

KONTRENDİKASYONLAR:
Bilinen bir kontrendikasyonu bulunmamaktadır.

GENEL UYARILAR:
Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz.
Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN ÖNERİLER:
- İnsan sağlığı için bilinen bir olumsuz etkisi yoktur, ancak aşı uygulama sırasında olabilecek yaralanmalarda bölge temizlenerek dezenfekte edilmelidir.
- Aşıyı kazara kendinize enjekte etmeniz hâlinde derhal tıbbi yardıma başvurun ve ürünün kullanma talimatını veya etiketini doktorunuza gösterin.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ:
Enjeksiyonluk süspansiyon: 2-8 ºC'de ve karanlıkta muhafaza edilmelidir. Dondurmayınız.
Raf ömrü 24 aydır.
Açılan şişeler 6-8 saat içinde kullanılmalıdır.

KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR:
Kullanılmamış veya arta kalan ürün ve bu ürünün kullanımıyla ortaya çıkan atık materyaller ilgili mevzuata göre imha edilmelidir. Her türlü atık/artık materyal evsel atıklarla ve atık sularla karıştırılmamalı, drenaj sistemlerine ve çevreye atılmamalıdır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKİLLERİ:
20, 50 ve 100 ml amber renkli cam şişeler veya 20, 50, 100 ve 250 ml beyaz polipropilen plastik şişeler bromobutil tıpa ve alüminyum kapak ile kutulu veya kutusuz olarak strafor içerisinde satışa sunulur. Tüm ambalaj şekilleri aynı anda piyasaya sunulmayabilir.

PROSPEKTÜSÜN ONAY TARİHİ: 05.08.2026

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİH: 05.08.2026

PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ:
DOLLVET BİYOTEKNOLOJİ A.Ş.
Konaklar Mahallesi Akasyalı Sokak No:10 Beşiktaş / İSTANBUL
Telefon: +90 212 422 02 01 **Faks:** +90 212 422 00 72
E-mail: dollvet@dollvet.com.tr

ÜRETİCİ FİRMA ADI VE ADRESİ:
DOLLVET BİYOTEKNOLOJİ A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi Koçören OSB Mah. 106. Cadde No:6 Eyyübiye / ŞANLIURFA
Telefon: +90 414 369 11 33 **Faks:** +90 414 369 16 62
E-mail: dollvet@dollvet.com.tr

İç Ambalaj Etiketi <u>(20 ml)</u>

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır
ULTRAPAST
Klostridium enfeksiyonları ve Pastörellozise karşı Kombine İnaktif Bakterin-Toksoid Aşı
Enjeksiyonluk Süspansiyon

Her bir doz aşı (2 ml) içeriği aşağıdaki gibidir:

Clostridium perfringens β toksoid	≥ 10 IU/ml *
Clostridium perfringens ε toksoid	≥ 5 IU/ml *
Clostridium novyi Tip B α toksoid	≥ 3,5 IU/ml *
Clostridium septicum α toksoid	≥ 2,5 IU/ml *
Clostridium tetani toksoid	≥ 2,5 IU/ml *
İnaktif Clostridium chauvoei antijeni	≥ %90 koruma **
İnaktif Clostridium haemolyticum antijeni	≥ %75 koruma ***
İnaktif Pasteurella multocida antijeni	≥ 1/40 ELISA seropozitif ****
İnaktif Mannheimia haemolytica A1 antijeni ve lökotoksini	≥ 1/40 ELISA seropozitif ****

* 1 koyun dozu ile aşılanmış tavşan kan serumundaki antitoksin miktarı
** 1 koyun dozu ile aşılanmış kobay eprüvasyon sonucu
***1/5 buzağı dozu ile aşılanmış kobay eprüvasyon sonucu
**** 1 koyun dozu ile aşılı tavşanlarda ELISA titresi

Aşı, koyun ve keçilerde 2 ml, kuzu ve oğlaklarda 1 ml, sığırda 4 ml, buzağılarda 2 ml deri altı yolla uygulanır.

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİH: 05.08.2026

SERİ NO:
ÜRETİM TARİHİ:
SON KULLANMA TARİHİ:

İç Ambalaj Etiketi <u>(50 ml, 100 ml, 250 ml)</u>

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır
ULTRAPAST
Klostridium enfeksiyonları ve Pastörellozise karşı Kombine İnaktif Bakterin-Toksoid Aşı
Enjeksiyonluk Süspansiyon

Her bir doz aşı (2 ml) içeriği aşağıdaki gibidir:

Clostridium perfringens β toksoid	≥ 10 IU/ml *
Clostridium perfringens ε toksoid	≥ 5 IU/ml *
Clostridium novyi Tip B α toksoid	≥ 3,5 IU/ml *
Clostridium septicum α toksoid	≥ 2,5 IU/ml *
Clostridium tetani toksoid	≥ 2,5 IU/ml *
İnaktif Clostridium chauvoei antijeni	≥ %90 koruma **
İnaktif Clostridium haemolyticum antijeni	≥ %75 koruma ***
İnaktif Pasteurella multocida antijeni	≥ 1/40 ELISA seropozitif ****
İnaktif Mannheimia haemolytica A1 antijeni ve lökotoksini	≥ 1/40 ELISA seropozitif ****

* 1 koyun dozu ile aşılanmış tavşan kan serumundaki antitoksin miktarı
** 1 koyun dozu ile aşılanmış kobay eprüvasyon sonucu

***1/5 buzağı dozu ile aşılanmış kobay eprüvasyon sonucu
**** 1 koyun dozu ile aşılı tavşanlarda ELISA titresi

Adjuvan olarak $Al(OH)_3$ ve koruyucu olarak fenol içerir.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:
Aşı, koyun ve keçilerde 2 ml, kuzu ve oğlaklarda 1 ml, sığırda 4 ml, buzağılarda 2 ml deri altı yolla uygulanır.

"Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz"
"Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz"

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ:
2-8ºC'de ve karanlıkta muhafaza edilmelidir. Dondurmayınız. Raf ömrü 24 aydır.
Açılan şişeler 6-8 saat içinde kullanılmalıdır.

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİH: 05.08.2026

PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ:
DOLLVET BİYOTEKNOLOJİ A.Ş.
Konaklar Mahallesi Akasyalı Sokak No:10 Beşiktaş / İSTANBUL

SERİ NO:
ÜRETİM TARİHİ:
SON KULLANMA TARİHİ:

<u>Dış ambalaj etiketi (20 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml)</u>

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır
ULTRAPAST
Klostridium enfeksiyonları ve Pastörellozise karşı Kombine İnaktif Bakterin-Toksoid Aşı
Enjeksiyonluk Süspansiyon

BİLEŞİMİ:
Her bir doz aşı (2 ml) içeriği aşağıdaki gibidir:

Aktif Maddeler:	
Clostridium perfringens β toksoid	≥ 10 IU/ml *
Clostridium perfringens ε toksoid	≥ 5 IU/ml *
Clostridium novyi Tip B α toksoid	≥ 3,5 IU/ml *
Clostridium septicum α toksoid	≥ 2,5 IU/ml *
Clostridium tetani toksoid	≥ 2,5 IU/ml *
İnaktif Clostridium chauvoei antijeni	≥ %90 koruma **
İnaktif Clostridium haemolyticum antijeni	≥ %75 koruma ***
İnaktif Pasteurella multocida antijeni	≥ 1/40 ELISA seropozitif ****
İnaktif Mannheimia haemolytica A1 antijeni ve lökotoksini	≥ 1/40 ELISA seropozitif ****
Yardımcı Maddeler:	
Al^{+3} (Alüminyum hidroksit olarak) (Adjuvan)	3 mg
Fenol (%80) (Koruyucu)	0,003 ml

* 1 koyun dozu ile aşılanmış tavşan kan serumundaki antitoksin miktarı
** 1 koyun dozu ile aşılanmış kobay eprüvasyon sonucu
***1/5 buzağı dozu ile aşılanmış kobay eprüvasyon sonucu
**** 1 koyun dozu ile aşılı tavşanlarda ELISA titresi

KULLANIM SAHASI/ENDİKASYONLAR:
Sığır, buzağı, koyun, kuzu, keçi ve oğlaklarda Pasteurella multocida ve Mannheimia haemolytica A1 enfeksiyonlarına, Clostridium chauvoei'nin neden olduğu yanıkara, Clostridium haemolyticum'un neden olduğu basiller ikterohemoglobünüri, Clostridium septicum'un neden olduğu malignant ödem ve bradzot, Clostridium novyi'nin neden olduğu gazlı gangren (miyonekroz) ve enfeksiyöz nekrotik hepatit, Clostridium tetani'nin neden olduğu tetanoz, Clostridium perfringens tip B, C ve D'nin neden olduğu kuzu dizanterisi, enterotoksemi, hemorajik enterotoksemi, struck ve yumuşak böbrek hastalığı enfeksiyonlarına karşı koruyucu amaçla kullanılan inaktif bakterin toksoid bir aşıdır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:
Aşı 2. ayından itibaren; koyunlarda 2 ml ve kuzularda 1 ml arka bacak iç kısmına, keçilerde 2 ml ve oğlaklarda 1 ml kuyruk altına, sığırlarda 4 ml ve buzağılarda 2 ml boynun yan yüzünün orta kısmına veya omuz gerisindeki hareketsiz bölgeye deri altı yolla uygulanır.

GIDA DEĞERİ OLAN HAYVANLARDA KALINTI UYARILARI:
Aşı uygulamalarından sonra insan tüketimine sunulan et, sakatat ve süt için kalıntı arınma süresi 0 (sıfır) gündür.

"Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz"
"Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz"

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ:
Enjeksiyonluk süspansiyon: 2-8 ºC'de ve karanlıkta muhafaza edilmelidir. Dondurmayınız.
Raf ömrü 24 aydır.
Açılan şişeler 6-8 saat içinde kullanılmalıdır.

KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR:
Kullanılmamış veya arta kalan ürün ve bu ürünün kullanımıyla ortaya çıkan atık materyaller ilgili mevzuata göre imha edilmelidir. Her türlü atık/artık materyal evsel atıklarla ve atık sularla karıştırılmamalı, drenaj sistemlerine ve çevreye atılmamalıdır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKİLLERİ:
20, 50 ve 100 ml amber renkli cam şişeler veya 20, 50, 100 ve 250 ml beyaz polipropilen plastik şişeler bromobutil tıpa ve alüminyum kapak ile kutulu veya kutusuz olarak strafor içerisinde satışa sunulur. Tüm ambalaj şekilleri aynı anda piyasaya sunulmayabilir.

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİH: 05.08.2026

PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ:
DOLLVET BİYOTEKNOLOJİ A.Ş.
Konaklar Mahallesi Akasyalı Sokak No:10 Beşiktaş / İSTANBUL
Telefon: +90 212 422 02 01 **Faks:** +90 212 422 00 72
E-mail: dollvet@dollvet.com.tr

ÜRETİCİ FİRMA ADI VE ADRESİ:
DOLLVET BİYOTEKNOLOJİ A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi Koçören OSB Mah. 106. Cadde No:6 Eyyübiye / ŞANLIURFA
Telefon: +90 414 369 11 33 **Faks:** +90 414 369 16 62
E-mail: dollvet@dollvet.com.tr

SERİ NO:
ÜRETİM TARİHİ:
SON KULLANMA TARİHİ:
KDV DAHİL PERAKENDE SATIŞ FİYATI: