ÜRÜN ÖZELLİKLERİ ÖZETİ

1. VETERİNER TIBBİ ÜRÜNÜN İSMİ
VAC-SULES FEEDLOT Enjeksiyonluk çift emülsiyon (su/yağ/su)

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ
1 ml aşı:
Aktif maddeler:
Enfeksiyöz Bovine Rhinotracheitis Virus tip 1 (IBR-1) ..... ≥ 2.0 x 10^6 $DICT_{\%50}$/ml
Enfeksiyöz Bovine Rhinotracheitis Virus tip 5 (IBR-V) ..... ≥ 2.0 x 10^6 $DICT_{\%50}$/ml
Bovine Viral Diyare virus tip 1 (BVD-1) ..... ≥ 2.0 x 10^4 $DICT_{\%50}$/ml
Bovine Viral Diyare virus tip 2 (BVD-2) ..... ≥ 2.0 x 10^4 $DICT_{\%50}$/ml
Bovine Respiratorik Sinsityal Virus (BRSV)..... ≥ 2.0 x 10^4 $DICT_{\%50}$/ml
Bovine Parainfluenza tip 3 ..... ≥ 2.0 x 10^4 $DICT_{\%50}$/ml
Pasteurella multocida multocida..... ≥ %80
Mannheimia haemolytica serotip 1 ..... ≥ %80
Haemophilus somnus ..... ≥ %75 (1/40 seyreltme)
Moraxella bovis ..... ≥ %75 (1/40 seyreltme)
Moraxella bovoculi ..... ≥ %75 (1/40 seyreltme)
Yardımcı maddeler:
Timerosal …….. 1/10000 ml
Adjuvant (Ticari marka MARCOL 52) ..... 0.3 ml
Formaldehit…….. 0.001 g

3.FARMASÖTİK ŞEKLİ
Enjeksiyonluk çift emülsiyon (su/yağ/su)
Beyazımsı yağlı steril

4.KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1 Hedef türler
Sığır

4.2 Hedef türlere özel kullanım endikasyonları
Sığırlarda Viral Diyare, Enfeksiyöz Rhinotracheitis, Parainfluenza tip 3, Respiratorik Sinsityal Hastalığı (BRSV) ve aşı içeriğinde yer alan ilgili bakterilerin neden olduğu solunum ve göz hastalıklarının önlenmesinde kullanılır.

4.3 Kontrendikasyonları
Parazitli, hasta, stresli veya kötü kondisyona sahip hayvanlar aşılanmamalıdır.

4.4 Her bir hedef tür için özel uyarılar
Bulunmamaktadır.

4.5 Kullanım için özel uyarılar

(i)Hayvanlarda kullanım için özel uyarılar
Ürün direkt kullanım için hazırlanmıştır. Kullanmadan önce iyice çalkalanmalıdır.
Steril tek kullanımlık iğneler kullanılmalı ve her hayvanda iğne ucu değiştirilmelidir. Aşılanmamış hayvanlar ilk yıl 4 hafta arayla iki defa ve sonrasında yılda bir defa tek doz olacak şekilde aşılanmalıdır.

(ii)Veteriner tıbbi ürünü hayvanlara uygulayan kişinin alması gereken özel önlemler
Özel önlemler alarak, yanlışlıkla kendi kendine enjeksiyonu, cilt veya gözlerle teması önleyiniz. Ürünün kullanımı esnasında koruyucu amaçlı eldiven ve gözlük kullanınız. Ürünü uygularken bir şey yemeyiniz ve içmeyiniz. Ürünü uyguladıktan sonra ellerinizi yıkayınız.
Kazara kendi kendine enjeksiyon, göze veya deriye temas söz konusu ise ürünün prospektüsü ve etiketi ile birlikte acilen bir medikal tedavi alınması gereklidir. Ürün bileşimindeki maddelere karşı duyarlılığı olduğu bilinen kişiler ürünle temastan kaçınmalıdır.
Kullanıcının dikkatine: Bu ürün mineral yağ içerir. Kazara insana enjeksiyon şiddetli ağrı ve şişliğe neden olabilir, özellikle enjeksiyon eklem içine veya parmağa yapılmışsa acilen medikal tedavi uygulanmayanlarda nadiren de olsa etkilenen parmağın kaybı söz konusu olabilir. Kazara insana enjeksiyon durumunda, enjeksiyon miktarı çok az olsa bile, ürünün etiketi ve prospektüsü ile birlikte acilen medikal tedavi alınması önerilir. Medikal tedaviden 12 saat sonra bile ağrı geçmemişse tekrar tedavi alınmalıdır.
Doktorun dikkatine: Bu ürün mineral yağ içerir. Küçük miktarlarda enjekte edilse bile kazara insana yapılan enjeksiyonlar şiddetli şişmeye ve bunun sonucunda iskemik nekroza ve parmağın kaybına neden olabilir. Acilen cerrahi bakım gereklidir ve özellikle parmak pulpası veya tendona yayılım varsa enjeksiyon bölgesinin acilen ensizyonu ve irrigasyonu gerekebilir.

(iii) Diğer uyarılar
-

4.6 İstenmeyen etkiler (Sıklığı ve şiddeti)
Bazı hayvanlar, aşılama yerinde yangısal bir reaksiyon geliştirebilir. Aşılamadan sonra bazı hayvanlarda bazı aşırı duyarlılık reaksiyonları istisnai olarak ortaya çıkabilir; bu durumlarda hemen adrenalin, epinefrin veya antihistaminikler ile tedavi edin.
Aşılamadan sonra vücut sıcaklığında hafif bir artış görülebilir.

4.7 Gebelik, laktasyon ve yumurtlama döneminde kullanımı
Güvenlik çalışmalarının yapılmamış olması nedeniyle gebe ve laktasyondaki hayvanlarda kullanılmamalıdır.

4.8 Diğer tıbbi ürünlerle etkileşim ve diğer etkileşim şekilleri
Bu ürün diğer Veteriner Tıbbi Ürünlerle birlikte kullanılmamalıdır.

4.9 Dozaj ve kullanım yolu
Sığırlara (tüm yaş aralığında) deri altı yolla 5 ml dozunda uygulanır.
Aşılanmamış hayvanlar: 1 aylıktan büyük hayvanlara 4 hafta arayla iki defa aşılama yapılır.
Daha önce aşılanmış olan genç ve yetişkin hayvanlar: İlk aşılama programından sonra her yıl bir defa tek doz aşı yapılır.

4.10 Doz aşımı, varsa semptomlar, acil prosedürler, antidotlar (gerekli ise)
Hedef türlerde iki kat fazla doz uygulamasının etkisi üzerine yapılan çalışmalar, enjeksiyon bölgesinde hafif bir lokal reaksiyonun oluşabileceğini göstermiştir.
Alerjik hayvanlarda, anafilaktik şok veya alerjik reaksiyonlar ortaya çıkabilir. Veteriner endikasyonlarına göre hemen adrenalin, epinefrin veya antihistaminiklerle tedavi edilir.

4.11 Kalıntı arınma süresi
Et ve Süt için 0 (sıfır) gün.

5. İMMÜNOLOJİK ÖZELLİKLER
Farmakoterapötik grup: İmmunobiyolojik ürün

5.1 Farmakodinamik özellikler
VAC-SULES FEEDLOT, inaktif bakteri ve inaktif virusların enjekte edilebilir bir süspansiyonudur.
Etki Mekanizması: Sığırlarda Viral Diyare, Enfeksiyöz Rhinotracheitis, Parainfluenza tip 3, Respiratorik Sinsityal Hastalığı (BRSV) ve aşı içeriğinde yer alan ilgili bakterilerin neden olduğu solunum ve oküler hastalıkların önlenmesini sağlar. Aşıya karşı tam bir bağışıklık oluşması için hayvanlar 4 hafta arayla iki aşılama yapılır, sonraki yıllarda aşı bir defa uygulanır.

5.2 Farmkokinetik özellikler
İmmun yanıt için plazma antikorları ürünün 2. dozunun aşılanmasından sonra oluşur ve 12 ay boyunca koruyuculuğu devam eder.

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1 Yardımcı maddeler
Çift emülsiyonlu adjuvan (Mineral yağ)
Timerosal
Formaldehit

6.2 Geçimsizlikler
Bu ürün diğer Veteriner Tıbbi Ürünlerle birlikte kullanılmamalıdır.

6.3 Raf ömrü
Raf ömrü: Üretim tarihinden itibaren 2 yıldır (24 ay).
İç ambalajı açıldıktan sonra hemen kullanılmalıdır.

6.4. Muhafaza şartları
Buzdolabında (2-8°C) arasında orijinal ambalajında muhafaza edilmelidir. Dondurulmamalıdır. Kullanıma kadar soğuk zincir devam ettirilmelidir.

6.5 Birincil ambalajın niteliği ve kompozisyonu
50 ml (10 doz), 100 ml (20 doz) ve 250 ml'lik (50doz) beyaz renkli polipropilen şişeler, gri renkli butil kauçuk tıpa ve flip-off sistemli gümüş renkli kapakla kapatılmış ve karton kutu içerisinde satışa sunulmuştur.

6.6 Kullanılmış veya arta kalan ürünün imhasına ilişkin özel önlemler
Kullanılmayan ürün atık su veya evsel atıklar yolu ile atılmamalıdır. Kullanılmamış ürünlerin imhası ile ilgili olarak veteriner hekime danışınız. Bu önlemler çevre sağlığını korumada yardımcı olacaktır.

7. PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ
SİMURG BİYOTEKNOLOJİ A.Ş.
Çınarlı Mah. Ozan Abay Cad. No: 8/Z17 Konak/İZMİR
8. PAZARLAMA İZNİ NUMARASI
…….

9. PAZARLAMA İZNİNİN İLK VERİLME VEYA YENİLEME TARİHİ: 17.08.2021

10. METİN DEĞİŞİKLİK TARİHİ: 09.04.2026

PROSPEKTÜS

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır
VAC SULES FEEDLOT
Enjeksiyonluk çift emülsiyon (su/yağ/su)
Bovine Viral Diarrhea, Infectious Rhinotracheitis, Bovine Parainfluenza tip 3, Bovine Respiratory Syncytial Disease (BRSV) ve ilişkili bakterilerin neden olduğu solunum ve göz hastalıklarına karşı inaktif aşı

BİLEŞİMİ: Beyazımsı yağlı steril 1 ml aşı;
Aktif maddeler:
Enfeksiyöz Bovine Rhinotracheitis Virus tip 1 (IBR-1) ..... ≥ 2.0 x 10^6 $DICT_{\%50}$/ml
Enfeksiyöz Bovine Rhinotracheitis Virus tip 5 (IBR-V) ..... ≥ 2.0 x 10^6 $DICT_{\%50}$/ml
Bovine Viral Diyare virus tip 1 (BVD-1) ..... ≥ 2.0 x 10^4 $DICT_{\%50}$/ml
Bovine Viral Diyare virus tip 2 (BVD-2) ..... ≥ 2.0 x 10^4 $DICT_{\%50}$/ml
Bovine Respiratorik Sinsityal Virus (BRSV)..... ≥ 2.0 x 10^4 $DICT_{\%50}$/ml
Bovine Parainfluenza tip 3 ..... ≥ 2.0 x 10^4 $DICT_{\%50}$/ml
Pasteurella multocida multocida..... ≥ %80
Mannheimia haemolytica serotip 1 ..... ≥ %80
Haemophilus somnus ..... ≥ %75 (1/40 seyreltme)
Moraxella bovis ..... ≥ %75 (1/40 seyreltme)
Moraxella bovoculi ..... ≥ %75 (1/40 seyreltme)
Yardımcı maddeler:
Timerosal …….. 1/10000 ml
Adjuvant (Ticari marka MARCOL 52) ..... 0.3 ml
Formaldehit…….. 0.001 g

İMMÜNOLOJİK ÖZELLİKLER:
Farmakodinamik özellikler:
VAC-SULES FEEDLOT, inaktif bakteri ve inaktif virusların enjekte edilebilir bir süspansiyonudur.
Etki Mekanizması: Sığırlarda Viral Diyare, Enfeksiyöz Rhinotracheitis, Parainfluenza tip 3, Respiratorik Sinsityal Hastalığı (BRSV) ve aşı içeriğinde yer alan ilgili bakterilerin neden olduğu solunum ve oküler hastalıkların önlenmesini sağlar. Aşıya karşı tam bir bağışıklık oluşması için hayvanlar 4 hafta arayla iki aşılama yapılır, sonraki yıllarda aşı bir defa uygulanır.
Farmakokinetik özellikler:
İmmun yanıt için plazma antikorları ürünün 2. dozunun aşılanmasından sonra oluşur ve 12 ay boyunca koruyuculuğu devam eder.

KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLAR: Sığırlarda Viral Diyare, Enfeksiyöz Rhinotracheitis, Parainfluenza tip 3, Respiratorik Sinsityal Hastalığı (BRSV) ve aşı içeriğinde yer alan ilgili bakterilerin neden olduğu solunum ve göz hastalıklarının önlenmesinde kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Sığırlara (tüm yaş aralığında) deri altı yolla 5 ml dozunda uygulanır.
Aşılanmamış hayvanlar: 1 aylıktan büyük hayvanlara 4 hafta arayla iki defa aşılama yapılır.

Daha önce aşılanmış olan genç ve yetişkin hayvanlar: İlk aşılama programından sonra her yıl bir defa tek doz aşı yapılır.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL UYARILAR

Ürün direkt kullanım için hazırlanmıştır. Kullanmadan önce iyice çalkalanmalıdır.
Steril tek kullanımlık iğneler kullanılmalı ve her hayvanda iğne ucu değiştirilmelidir. Aşılanmamış hayvanlar ilk yıl 4 hafta arayla iki defa ve sonrasında yılda bir defa tek doz olacak şekilde aşılanmalıdır.

Gebelik ve Laktasyonda kullanım

Gebe ve laktasyondaki hayvanlarda kullanılmamalıdır.

İSTENMEYEN ETKİLER

Bazı hayvanlarda enjeksiyon yerinde yangısal bir reaksiyon gelişebilir. Aşılamadan sonra bazı hayvanlarda aşırı duyarlılık reaksiyonları istisnai olarak ortaya çıkabilir. Bu durumlarda hemen adrenalin, epinefrin veya antihistaminikler ile tedavi uygulayınız.
Aşılama sonrasında vücut sıcaklığında hafif bir artış görülebilir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Bu ürün diğer Veteriner Tıbbi Ürünlerle birlikte kullanılmamalıdır.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT

Hedef türlerde iki kat fazla doz uygulamasının etkisi üzerine yapılan çalışmalar, enjeksiyon bölgesinde hafif bir lokal reaksiyonun oluşabileceğini göstermiştir.
Alerjik hayvanlarda, anafilaktik şok veya alerjik reaksiyonlar ortaya çıkabilir. Veteriner endikasyonlarına göre hemen adrenalin, epinefrin veya antihistaminiklerle tedavi edilir.

GIDA DEĞERİ OLAN HAYVANLARDA KALINTI UYARILARI

İlaç Kalıntı Arınma Süresi: Et ve Süt için 0 (sıfır) gün

KONTRENDİKASYONLAR

Parazitli, hasta, stresli veya genel durumu kötü olan hayvanlarda kullanılmamalıdır.

GENEL UYARILAR

Çocukların ulaşamayacağı ve göremeyeceği bir yerde muhafaza ediniz. Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN ÖNERİLER

Özel önlemler alarak, yanlışlıkla kendi kendine enjeksiyonu, cilt veya gözlerle teması önleyiniz. Ürünün kullanımı esnasında koruyucu amaçlı eldiven ve gözlük kullanınız. Ürünü uygularken bir şey yemeyiniz ve içmeyiniz. Ürünü uyguladıktan sonra ellerinizi yıkayınız.
Kazara kendi kendine enjeksiyon, göze veya deriye temas söz konusu ise ürünün prospektüsü ve etiketi ilebirlikte acilen bir medikal tedavi alınması gereklidir. Ürün bileşimindeki maddelere karşı duyarlılığı olduğu bilinen kişiler ürünle temastan kaçınmalıdır.
Kullanıcının dikkatine: Bu ürün mineral yağ içerir. Kazara insana enjeksiyon şiddetli ağrı ve şişliğe neden olabilir, özellikle enjeksiyon eklem içine veya parmağa yapılmışsa acilen medikal tedavi uygulanmayanlarda nadiren de olsa etkilenen parmağın kaybı söz konusu olabilir. Kazara

insana enjeksiyon durumunda, enjeksiyon miktarı çok az olsa bile, ürünün etiketi ve prospektüsü ile birlikte acilen medikal tedavi alınması önerilir. Medikal tedaviden 12 saat sonra bile ağrı geçmemişse tekrar tedavi alınmalıdır.
Doktorun dikkatine: Bu ürün mineral yağ içerir. Küçük miktarlarda enjekte edilse bile kazara insana yapılan enjeksiyonlar şiddetli şişmeye ve bunun sonucunda iskemik nekroza ve parmağın kaybına neden olabilir. Acilen cerrahi bakım gereklidir ve özellikle parmak pulpası veya tendona yayılım varsa enjeksiyon bölgesinin acilen ensizyonu ve irrigasyonu gerekebilir.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ
Buzdolabında (2-8°C) arasında orijinal ambalajında muhafaza edilmelidir. Dondurulmamalıdır. Kullanıma kadar soğuk zincir devam ettirilmelidir.
Raf ömrü 2 yıldır (24 ay). İç ambalajı açıldıktan sonra hemen kullanılmalıdır.

KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR
Kullanılmayan ürün atık su veya evsel atıklar yolu ile atılmamalıdır. Kullanılmamış ürünlerin imhası ile ilgili olarak veteriner hekime danışınız. Bu önlemler çevre sağlığını korumada yardımcı olacaktır. Hedef olmayan türlerde kullanılmamalıdır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKİLLERİ
50 ml (10 doz), 100 ml (20 doz) ve 250 ml'lik (50 doz) beyaz renkli polipropilen şişeler, gri renkli butil kauçuk tıpa ve flip-off sistemli gümüş renkli kapakla kapatılmış ve karton kutu içerisinde satışa sunulmuştur.

PROSPEKTÜSÜN ONAY TARİHİ: 09.04.2026

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZİN TARİHİ: 17.08.2021

PAZARLAMA İZİN SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ: SİMURG BİYOTEKNOLOJİ A.Ş.
Çınarlı Mah. Ozan Abay Cad. No:8/Z17 KONAK / İZMİR

ÜRETİCİ FİRMA VE ADRESİ: LABORATORIOS MİCROSULES URUGUAY S.A
Cna. AI Paso Escoba S/N Ruta 101 km. 28. Canelones-URUGUAY

DIŞ AMBALAJ ETİKETİ (50 ml, 100 ml ve 250 ml için)

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır
VAC SULES FEEDLOT
Enjeksiyonluk çifte emülsiyon (su/yağ/su)
Bovine Viral Diarrhea, Infectious Rhinotracheitis, Bovine Parainfluenza tip 3, Bovine Respiratory Syncytial Disease (BRSV) ve ilişkili bakterilerin neden olduğu solunum ve göz hastalıklarına karşı inaktif aşı

BİLEŞİMİ
Beyazımsı yağlı steril 1 ml aşı;
Aktif maddeler:
Enfeksiyöz Bovine Rhinotracheitis Virus tip 1 (IBR-1) ..... ≥ 2.0 x 10^6 $DICT_{\%50}$/ml
Enfeksiyöz Bovine Rhinotracheitis Virus tip 5 (IBR-V) ..... ≥ 2.0 x 10^6 $DICT_{\%50}$/ml
Bovine Viral Diyare virus tip 1 (BVD-1) ..... ≥ 2.0 x 10^4 $DICT_{\%50}$/ml
Bovine Viral Diyare virus tip 2 (BVD-2) ..... ≥ 2.0 x 10^4 $DICT_{\%50}$/ml
Bovine Respiratorik Sinsityal Virus (BRSV)..... ≥ 2.0 x 10^4 $DICT_{\%50}$/ml
Bovine Parainfluenza tip 3 ..... ≥ 2.0 x 10^4 $DICT_{\%50}$/ml
Pasteurella multocida multocida..... ≥ %80
Mannheimia haemolytica serotip 1 ..... ≥ %80
Haemophilus somnus ..... ≥ %75 (1/40 seyreltme)
Moraxella bovis ..... ≥ %75 (1/40 seyreltme)
Moraxella bovoculi ..... ≥ %75 (1/40 seyreltme)
Yardımcı maddeler:
Timerosal …….. 1/10000 ml
Adjuvant (Ticari marka MARCOL 52) ..... 0.3 ml
Formaldehit…….. 0.001 g

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Sığırlara (tüm yaş aralığında) deri altı yolla 5 ml dozunda uygulanır.
Aşılanmamış hayvanlar: 1 aylıktan büyük hayvanlara 4 hafta arayla iki defa aşılama yapılır.
Daha önce aşılanmış olan genç ve yetişkin hayvanlar: İlk aşılama programından sonra her yıl bir defa tek doz aşı yapılır.
Ürünü kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz.

GIDA DEĞERİ OLAN HAYVANLARDA KALINTI UYARILARI
İlaç Kalıntı Arınma Süresi: Et ve Süt için 0 (sıfır) gün

GENEL UYARILAR
Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz. Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ
Buzdolabında (2-8°C) arasında orijinal ambalajında muhafaza edilmelidir. Dondurulmamalıdır. Kullanıma kadar soğuk zincir devam ettirilmelidir. Raf ömrü 2 yıldır (24 ay). İç ambalajı açıldıktan sonra hemen kullanılmalıdır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKİLLERİ
50 ml (10 doz), 100 ml (20 doz) ve 250 ml'lik (50 doz) beyaz renkli polipropilen şişeler, gri renkli butil kauçuk tıpa ve flip-off sistemli gümüş renkli kapakla kapatılmış ve karton kutu içerisinde satışa sunulmuştur.

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZİN TARİHİ: 17.08.2021

PAZARLAMA İZİN SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ
SİMURG BİYOTEKNOLOJİ A.Ş. Çınarlı Mah. Ozan Abay Cad. No:8/Z17 KONAK / İZMİR

ÜRETİCİ FİRMA VE ADRESİ
LABORATORIOS MİCROSULES URUGUAY S.A Cna. AI Paso Escoba S/N Ruta 101 km. 28. Canelones-URUGUAY

Seri numarası:
Üretim tarihi:
SKT:

İÇ AMBALAJ ETİKETİ (50 ml, 100 ml ve 250 ml için)

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır
VAC SULES FEEDLOT
Enjeksiyonluk çifte emülsiyon (su/yağ/su)
Bovine Viral Diarrhea, Infectious Rhinotracheitis, Bovine Parainfluenza tip 3, Bovine Respiratory Syncytial Disease (BRSV) ve ilişkili bakterilerin neden olduğu solunum ve göz hastalıklarına karşı inaktif aşı

BİLEŞİMİ
Beyazımsı yağlı steril 1 ml aşı;
Aktif maddeler:
Enfeksiyöz Bovine Rhinotracheitis Virus tip 1 (IBR-1) ..... ≥ 2.0 x 10^6 $DICT_{\%50}$/ml
Enfeksiyöz Bovine Rhinotracheitis Virus tip 5 (IBR-V) ..... ≥ 2.0 x 10^6 $DICT_{\%50}$/ml
Bovine Viral Diyare virus tip 1 (BVD-1) ..... ≥ 2.0 x 10^4 $DICT_{\%50}$/ml
Bovine Viral Diyare virus tip 2 (BVD-2) ..... ≥ 2.0 x 10^4 $DICT_{\%50}$/ml
Bovine Respiratorik Sinsityal Virus (BRSV)..... ≥ 2.0 x 10^4 $DICT_{\%50}$/ml
Bovine Parainfluenza tip 3 ..... ≥ 2.0 x 10^4 $DICT_{\%50}$/ml
Pasteurella multocida multocida..... ≥ %80
Mannheimia haemolytica serotip 1 ..... ≥ %80
Haemophilus somnus ..... ≥ %75 (1/40 seyreltme)
Moraxella bovis ..... ≥ %75 (1/40 seyreltme)
Moraxella bovoculi ..... ≥ %75 (1/40 seyreltme)
Yardımcı maddeler:
Timerosal …….. 1/10000 ml
Adjuvant (Ticari marka MARCOL 52) ..... 0.3 ml
Formaldehit…….. 0.001 g

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Sığırlara (tüm yaş aralığında) deri altı yolla 5 ml dozunda uygulanır.
Aşılanmamış hayvanlar: 1 aylıktan büyük hayvanlara 4 hafta arayla iki defa aşılama yapılır.
Daha önce aşılanmış olan genç ve yetişkin hayvanlar: İlk aşılama programından sonra her yıl bir defa tek doz aşı yapılır.
Ürünü kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz.

GIDA DEĞERİ OLAN HAYVANLARDA KALINTI UYARILARI
İlaç Kalıntı Arınma Süresi: Et ve Süt için 0 (sıfır) gün

GENEL UYARILAR
Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz. Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ
Buzdolabında (2-8°C) arasında orijinal ambalajında muhafaza edilmelidir. Dondurulmamalıdır. Kullanıma kadar soğuk zincir devam ettirilmelidir. Raf ömrü 2 yıldır (24 ay). İç ambalajı açıldıktan sonra hemen kullanılmalıdır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKİLLERİ
50 ml (10 doz), 100 ml (20 doz) ve 250 ml (50 doz)
T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZİN TARİHİ: 17.08.2021
PAZARLAMA İZİN SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ
SİMURG BİYOTEKNOLOJİ A.Ş. Çınarlı Mah. Ozan Abay Cad. No:8/Z17 KONAK / İZMİR
ÜRETİCİ FİRMA VE ADRESİ
LABORATORIOS MİCROSULES URUGUAY S.A Cna. AI Paso Escoba S/N Ruta 101 km. 28. Canelones-URUGUAY
Seri numarası:
Üretim tarihi:
SKT: