ÜRÜN ÖZELLİKLERİ ÖZETİ

1. VETERİNER TIBBI ÜRÜNÜN İSMİ
VAXXITEK HVT+IBD+ILT Dondurulmuş Enjeksiyonluk Süspansiyon ve Seyrelticisi

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM
Kullanıma hazır aşı süspansiyonunun her bir doz içeriği:
HVT, IBD VP2 & ILTV gD, en az ..... 5640 pfu
DMSO/Dondurma Çözeltisi ..... %7,5
*Dondurma Ortamı ..... 1 doz için y.m.
*Hücre süspansiyonu adımı sırasında eklenen buzağı serumu, seri hacminin %15'lik nihai konsantrasyonunun elde edilmesi için seriye ek buzağı serumu ile takviye edilir.
Koruyucu maddeler:
Bakteriyostatik ajan olarak Streptomisin Sülfat, bakterisid ajan olarak Penisilin ve fungistatik ajan olarak Amfoterisin B içerir.
Kullanılan antibiyotikler Penisilin (≤ 30.0 ünite/mL), Streptomisin (≤ 30.0 mcg/ml) ve Amfoterisin B (≤ 2.5 mcg/ml)'dir.

Steril Diluent: Sükroz, kazein hidrolizat, dipotasyum fosfat, monopotasyum fosfat, fenol kırmızısı, sodyum hidroksit veya konsantre hidroklorik asit, enjeksiyonluk su içerir.

Yardımcı maddelerin tüm listesi için bölüm 6.1'e bakınız.

3. FARMASÖTİK ŞEKİL
Dondurulmuş enjeksiyonluk süspansiyon ve seyrelticisi

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1 Hedef tür
Tavuk (bir günlük civciv) ve embriyolu tavuk yumurtaları.

4.2 Her bir hedef tür için kullanım alanı
Sağlıklı 18-19 günlük tavuk embriyolarında ve 1 günlük civcivlerde standart ve varyant Bursal Hastalığına, Tavuk Laringotrakeitine ve Marek Hastalığına karşı aktif immünizasyonda endikedir.

4.3 Kontrendikasyonlar
Hastalıklı embriyonlanmış yumurtalar veya hastalıklı tavuklar aşılanmamalıdır.

4.4 Her bir hedef tür için özel uyarılar
Sadece sağlıklı embriyolu yumurtalar ve civcivler aşılanmalıdır.

4.5 Kullanıma ilişkin özel uyarılar
(i) Hayvanlarda kullanıma ilişkin özel uyarılar
Tesiste bulunan tüm hayvanlar bir seferde aşılanmalıdır. Her bir embriyolu yumurtaya ya da her bir hayvana bir tam doz uygulanmalıdır. Aşılama sırasında ve sonrasında hayvanların stres altında olmamasına dikkat edilmelidir. Hayvanlar kontamine tesislerde barındırılmamalıdır. Hastalığa maruz kalım mümkün olduğunca aza indirilmelidir.

(ii) Ürünü uygulayana ilişkin özel uyarılar
VAXXITEK HVT+IBD+ILT cam ampullere doldurulmuş olarak sıvı nitrojen içinde saklanan bir donmuş enjeksiyonluk süspansiyondur. Bu nedenle sıvı azot kapları ve aşılar yalnızca uygun eğitim almış personel tarafından kullanılmalıdır. Sıvı azot son derece soğuktur. Deriyle veya gözlerle kazara temas etmesi ciddi soğuk ısırığına neden olabilir. Gözler gözlük veya siperlik kullanılarak korunmalıdır. Donmuş ampulleri çıkarırken ve tutarken veya kaba sıvı azot eklerken eldiven ve uzun kolluklar kullanınız. Sıvı azot kaplarını saklama ve tutma işlemleri iyi havalandırılan bir alanda yapılmalıdır. Aşırı miktarda azot, havalandırılmayan bir ortamdaki havada bulunan oksijen konsantrasyonunu azaltır ve oksijensiz kalmaya neden olabilir. Uyuklama olduğu takdirde derhal taze hava alınmalı ve alanın tamamı havalandırılmalıdır. Sıvı azot ile çalışma esnasında halsizlik veya bilinç bulanıklığı görüldüğü takdirde kişi derhal iyi havalandırılan bir yere alınmalıdır. Maruz kalma durumunda prospektüs ile birlikte hemen bir doktora başvurulmalıdır. Solunum durmuşsa suni solunum başlatınız ve derhal bir hekimle iletişime geçiniz. Ürün ile insan teması durumunda, ürün prospektüsü veya etiketi ile birlikte bir doktora danışınız.

4.6 İstenmeyen etkiler (sıklık ve şiddet)
Bulunmamaktadır.

4.7 Gebelik, laktasyon ve yumurtlama döneminde kullanım
Geçerli değildir.

4.8 Diğer tıbbi ürünlerle etkileşim ve diğer etkileşim şekilleri
Bu aşının başka bir veteriner tıbbi ürünle etkileşimine dair bir bilgi mevcut değildir. Etiket üzerinde belirtilen ürünler haricinde diğer ürünler ile karıştırılmamalıdır.

4.9 Dozaj ve kullanım yolu
Deri altı ya da in-ovo yolla kullanılır. Sadece tavsiye edilen şekilde uygulayınız.
In-ovo Uygulama:
Her 4000 doz aşı için 200 ml steril seyreltici kullanılır. Her embriyo için 0,05 ml doz enjekte edilir. Steril seyreltici ile seyreltilen aşı karışımının tamamı 1 saat içerisinde kullanılmalıdır.
Deri altı Uygulama:
Her 1000 doz aşı için 200 ml steril seyreltici kullanılır. Her kanatlı için 0,2 ml doz enjekte edilir. Kanatlı başın hemen altında enselerinden tutularak, ensedeki gevşek derinin altından (subkutan yoldan) enjekte edilir. Bu alandaki gevşek deri baş parmak ve işaret parmağıyla nazikçe tutularak kaldırılır. Boyundaki kaslara ve kemiklere çarpmaktan kaçınılır. Steril seyreltici ile seyreltilen aşı karışımının tamamı 1 saat içerisinde kullanılmalıdır.

4.10 Doz aşımı, varsa semptomlar, acil prosedürler, antidotlar (gerekli ise)
Bulunmamaktadır.

4.11 Kalıntı arınma süreleri (sıfır gün olanlar da dahil)
Aşılama sonrası tavuklar 21 gün gün geçmeden kesime sevk edilmemelidir.

5. İMMUNOLOJİK ÖZELLİKLER
Farmakoterapötik grup: Kanatlılar için immünolojik ürünler, evcil kümes hayvanları için canlı viral aşılar.
ATCvet kodu: QI01AD18
Bu dondurulmuş aşı, bursal hastalıktan bir gen eki ve tavuk laringotrakeitinden bir gen eki içeren bir Marek hastalığı serotip 3 vektör temelli virüsünü içerir.

5.1 Farmakodinamik özellikler

-

5.2 Farmakokinetik özellikler

-

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1 Yardımcı maddeler

vHVT-IBD-ILT dondurulmuş enjeksiyonluk süspansiyon:
DMSO/FS
Buzağı Serumu
Medium 199
Penisilin
Streptomisin
Amfoterisin B
Steril Diluent:
Sükroz
Kazein hidrolizat
Dipotasyum fosfat
Monopotasyum fosfat
Fenol kırmızısı
Sodyum hidroksit veya konsantre hidroklorik asit
Enjeksiyonluk su

6.2 Geçimsizlikler

Diğer bir veteriner tıbbi ürünle karıştırmayınız.

6.3 Raf ömrü

Satışa sunulmak üzere ambalajlanmış;
Dondurulmuş konsantratın raf ömrü: Sıvı nitrojen içinde (- 196°C'de) 36 ay.
Steril Diluent'in raf ömrü üretim tarihinden itibaren 36 ay.
Talimatlara göre hazırlanan aşı süspansiyonunun raf ömrü: 1 saat.

6.4 Muhafaza Şartları

Dondurulmuş enjeksiyonluk süspansiyon, sıvı nitrojen içinde (-196°C'de) saklanmalı ve transfer edilmelidir.
Sıvı nitrojen içeren ambalajlar güvenli bir biçimde dik olarak temiz, kuru ve iyi havalandırılan bir yerde saklanmalıdır.
Steril diluentin muhafaza şartları ve raf ömrü: Raf ömrü 36 aydır. Steril diluent, orijinal ambalajında, 25°C'nin altında, buzdolabına konulmadan, dondurulmadan ve güneş ışığından korunarak saklanmalıdır.

6.5 Birincil ambalajın niteliği ve kompozisyonu

1.000 doz, 2.000 doz ya da 4.000 dozluk aşı içeren cam ampuller içinde pazarlanmaktadır. Aynı doza sahip cam ampuller, dört (5 ml'lik ampul kullanılıyor ise) ya da beş (2 ml'lik ampul kullanılıyor ise) adet olacak şekilde bir çubuğa yerleştirilir ve sıvı nitrojen içinde saklanır ve transfer edilir.
Steril Diluent, birbirinden bağımsız, biri doldurma diğeri delinme için ayarlanmış bitişik iki bağlantı borusu bulunan, 400 ml ve 800 ml'lik Avrupa Farmakopesi gerekliliklerine uygun ısı yalıtımlı polivinilklorür (PVC) torbalara doldurulur. Her torba daha sonra bir Polietilen Tereftalat Metal

(PETmet)/Dökme Polipropilen (CPP)/ Polietilen (PE) koruyucu üst torbaya yerleştirilir ve daha sonra ısıyla kapatılır.

6.6 Kullanılmış veya arta kalan ürünün imhasına ilişkin özel önlemler

Kullanılmış veya arta kalan ürün ilgili mevzuata göre imha edilmelidir. Kullanılmayan ürünler imha edilmeden önce inaktive edilmelidir. Kullanım dışı her türlü artık/atık ürün su ve drenaj sistemlerine atılmamalıdır.

7 PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI ve ADRESİ

Boehringer Ingelheim İlaç Ticaret A.Ş. Esentepe Mah. Harman 1 Sok. Nidakule Levent No. 7-9 Kat. 15-16, 34394 Şişli, İstanbul

8 PAZARLAMA İZNİ NUMARASI

9 PAZARLAMA İZNİNİN İLK VERİLME VEYA YENİLEME TARİHİ

15.03.2024

10 METİN DEĞİŞİKLİK TARİHİ

20.10.2025

Prospektüs (1000, 2000 ve 4000 doz)

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır
VAXXITEK HVT+IBD+ILT
Dondurulmuş Enjeksiyonluk Süspansiyon ve Seyrelticisi
Bursal Hastalık – Enfeksiyöz Laringotrakeit – Marek Hastalığı Aşısı, Serotip 3, Canlı Marek Hastalığı Vektörü

BİLEŞİMİ

Kullanıma hazır aşı süspansiyonunun her bir doz içeriği:
HVT, IBD VP2 & ILTV gD, en az 5640 pfu
DMSO/Dondurma Çözeltisi %7,5
*Dondurma Ortamı 1 doz için y.m.
*Hücre süspansiyonu adımı sırasında eklenen buzağı serumu, seri hacminin %15'lik nihai konsantrasyonunun elde edilmesi için seriye ek buzağı serumu ile takviye edilir.

Koruyucu maddeler:

Bakteriyostatik ajan olarak Streptomisin Sülfat, bakterisid ajan olarak Penisilin ve fungistatik ajan olarak Amfoterisin B içerir.
Kullanılan antibiyotikler Penisilin (≤ 30.0 ünite/mL), Streptomisin (≤ 30.0 mcg/ml) ve Amfoterisin B (≤ 2.5 mcg/ml)'dir.
Steril Diluent: Sükroz, kazein hidrolizat, dipotasyum fosfat, monopotasyum fosfat, fenol kırmızısı, sodyum hidroksit veya konsantre hidroklorik asit, enjeksiyonluk su içerir.

İMMÜNOLOJİK ÖZELLİKLER

Farmakoterapötik grup: Kanatlılar için immünolojik ürünler, evcil kümes hayvanları için canlı viral aşılar.
ATCvet kodu: QI01AD18
Bu dondurulmuş aşı, bursal hastalıktan bir gen eki ve tavuk laringotrakeitinden bir gen eki içeren bir Marek hastalığı serotip 3 vektör temelli virüsünü içerir.

KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLAR

Sağlıklı olan 18 ila 19 günlük tavuk embriyolarının ve bir günlük yaştaki civcivlerin standart ve varyant Bursal Hastalığına, Tavuk Laringotrakeitine ve Marek Hastalığına karşı aktif immünizasyonda endikedir.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Deri altı ya da *in-ovo* yolla kullanılır.

In-ovo Uygulama:

Her 4000 doz aşı için 200 ml steril seyreltici kullanılır. Her embriyo için 0,05 ml doz enjekte edilir. Steril seyreltici ile seyreltilen aşı karışımının tamamı 1 saat içerisinde kullanılmalıdır.

Deri altı Uygulama:

Her 1000 doz aşı için 200 ml steril seyreltici kullanılır. Her kanatlı için 0,2 ml doz enjekte edilir. Kanatlı başın hemen altında enselerinden tutularak, ensedeki gevşek derinin altından (subkutan yoldan) enjekte edilir. Bu alandaki gevşek deri baş parmak ve işaret parmağıyla nazikçe tutularak kaldırılır. Boyundaki kaslara ve kemiklere çarpmaktan kaçınılır. Steril seyreltici ile seyreltilen aşı karışımının tamamı 1 saat içerisinde kullanılmalıdır.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL UYARILAR

Sadece sağlıklı embriyolu yumurtalar ve civcivler aşılanmalıdır. Tesiste bulunan tüm hayvanlar bir seferde aşılanmalıdır. Her bir embriyolu yumurtaya ya da her bir hayvana bir tam doz uygulanmalıdır. Aşılama sırasında ve sonrasında hayvanlarda stres altında olmamasına dikkat

edilmelidir. Hayvanlar kontamine tesislerde barındırılmamalıdır. Hastalığa maruz kalım mümkün olduğunca aza indirilmelidir.

İSTENMEYEN ETKİLER
Bulunmamaktadır.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ
Bu aşının başka bir veteriner tıbbi ürünle etkileşimine dair bir bilgi mevcut değildir. Etiket üzerinde belirtilen ürünler haricinde diğer ürünler ile karıştırılmamalıdır.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT
Bulunmamaktadır.

GIDA DEĞERİ OLAN HAYVANLARDA KALINTI UYARILARI
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s): Aşılama sonrası tavuklar 21 gün geçmeden kesime sevk edilmemelidir.

KONTRENDİKASYONLAR
Hastalıklı embriyolanmış yumurtaları veya hastalıklı tavukları aşılamayınız.

GENEL UYARILAR
Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerde bulundurunuz.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN ÖNERİLER
İnsan maruziyeti durumunda, bir doktora danışılmalıdır.
Sadece tavsiye edilen şekilde uygulanmalıdır.
İlk açıldığında aşı içeriğinin tamamı kullanılmalıdır.
Sıvı Azot Önlemleri
Sıvı azot kapları ve aşılar yalnızca uygun eğitimi almış personel tarafından kullanılmalıdır. Sıvı azot son derece soğuktur. Deriyle veya gözlerle kazara temas etmesi ciddi soğuk ısırığına neden olabilir. Gözler gözlük veya siperlik kullanılarak korunmalıdır. Donmuş ampulleri çıkarırken ve tutarken veya kaba sıvı azot eklerken eldiven ve uzun kolluklar kullanınız. Sıvı azot kaplarını saklama ve tutma işlemleri iyi havalandırılan bir alanda yapılmalıdır. Aşırı miktarda azot, havalandırılmayan bir ortamdaki havada bulunan oksijen konsantrasyonunu azaltır ve oksijensiz kalmaya neden olabilir. Uyuklama olduğu takdirde derhal taze hava alınmalı ve alanın tamamı havalandırılmalıdır. Sıvı azot ile çalışma esnasında halsizlik veya bilinç bulanıklığı görüldüğü takdirde kişi derhal iyi havalandırılan bir yere alınmalıdır. Solunum durmuşsa suni solunum başlatınız ve derhal bir hekimle iletişime geçiniz. Ürün ile insan teması durumunda, ürün prospektüsü veya etiketi ile birlikte bir doktora danışınız.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ
Dondurulmuş enjeksiyonluk süspansiyon, sıvı nitrojen içinde (-196°C'de) saklanmalı ve transfer edilmelidir.
Sıvı nitrojen içeren ambalajlar güvenli bir biçimde dik olarak temiz, kuru ve iyi-havalandırılan bir yerde saklanmalıdır.
Steril diluentin muhafaza şartları ve raf ömrü: Raf ömrü 36 aydır. Steril Diluent, orijinal ambalajında, 25°C'nin altında, buzdolabına konulmadan, dondurulmadan ve güneş ışığından korunarak saklanmalıdır.
Satışa sunulmak üzere ambalajlanmış; dondurulmuş konsantratın raf ömrü:

Sıvı nitrojen içinde (- 196°C'de) 36 ay.
Talimatlara göre hazırlanan aşı süspansiyonunun raf ömrü: 1 saat.

KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR
Kullanılmamış veya arta kalan ürün ilgili mevzuata göre imha edilmelidir. Kullanılmayan ürünler imha edilmeden önce inaktive edilmelidir. Kullanım dışı her türlü artık/atık ürün su ve drenaj sistemlerine atılmamalıdır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKİLLER
1000 doz, 2000 doz veya 4000 doz aşı içeren cam ampul içinde pazarlanmaktadır.
Aynı dozajda dört (eğer 5 ml ampul kullanılıyorsa) veya beş (eğer 2 ml ampul kullanılıyorsa) ampul bir taşıma çubuğunun içine yerleştirilir ve sıvı nitrojen içinde (-196°C'de) saklanır ve gönderilir.
Steril diluentin ticari takdim şekli
Steril Diluent, birbirinden bağımsız, biri doldurma diğeri delinme için ayarlanmış bitişik iki bağlantı borusu bulunan, 400 ml ve 800 ml'lik Avrupa Farmakopesi gerekliliklerine uygun ısı yalıtımlı polivinilklorür (PVC) torbalara doldurulur. Her torba daha sonra bir Polietilen Tereftalat Metal (PETmet)/Dökme Polipropilen (CPP)/ Polietilen (PE) koruyucu üst torbaya yerleştirilir ve daha sonra ısıyla kapatılır.

PROSPEKTÜSÜN ONAY TARİHİ: 20.10.2025

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİHİ VE NO.: 15.03.2024

PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ
Boehringer Ingelheim İlaç Ticaret A.Ş. Esentepe Mah. Harman 1 Sok. Nidakule Levent No. 7-9 Kat. 15-16, 34394 Şişli, İstanbul
Tel.: +90 212 329 11 00
Faks: +90 212 329 11 01

ÜRETİCİ FİRMA VE ADRESİ
Boehringer Ingelheim Animal Health USA Inc., 1168 Airport Parkway, SW Gainesville, GA 30501 USA

Dış Ambalaj Etiketi – (1000-200-4000 doz) (Azot tankı yanında sunulacak Türkçe dış etiket)

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır
VAXXITEK HVT+IBD+ILT
Dondurulmuş Enjeksiyonluk Süspansiyon ve Seyrelticisi
Bursal Hastalığı – Enfeksiyöz Laringotrakeitis – Marek Hastalığı Aşısı, Serotip 3, Canlı Marek Hastalık Vektörü

BİLEŞİMİ

Kullanıma hazır aşı süspansiyonunun her bir doz içeriği:

HVT, IBD VP2 & ILTV gD, en az	5640 pfu
DMSO/Dondurma Çözeltisi	%7,5
*Dondurma Ortamı	1 doz için y.m.

*Hücre süspansiyonu adımı sırasında eklenen buzağı serumu, seri hacminin %15'lik nihai konsantrasyonunun elde edilmesi için seriye ek buzağı serumu ile takviye edilir.

Koruyucu maddeler: Bakteriyostatik ajan olarak Streptomisin Sülfat, bakterisid ajan olarak Penisilin ve fungistatik ajan olarak Amfoterisin B içerir.

Kullanılan antibiyotikler Penisilin (≤ 30.0 ünite/mL), Streptomisin (≤ 30.0 mcg/ml) ve Amfoterisin B (≤ 2.5 mcg/ml)'dir.

HEDEF TÜR

Tavuk (bir günlük civciv) ve embriyolu tavuk yumurtaları.

KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLAR:

Sağlıklı olan 18 ila 19 günlük tavuk embriyolarının ve bir günlük yaştaki civcivlerin standart ve varyant Bursal Hastalığına, Tavuk Laringotrakeitine ve Marek Hastalığına karşı aktif immünizasyonda endikedir.

UYGULAMA ŞEKLİ

Deri altı (subkutan) enjeksiyonla veya *in ovo* uygulama yoluyla uygulanır.

GIDA DEĞERİ OLAN HAYVANLARDA KALINTI UYARILARI:

Aşılama sonrası tavuklar 21 gün geçmeden kesime sevk edilmemelidir.

GENEL UYARILAR:

Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde bulundurunuz.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Dondurulmuş enjeksiyonluk süspansiyon, sıvı nitrojen içinde (-196°C'de) saklanmalı ve transfer edilmelidir.

Sıvı nitrojen içeren ambalajlar güvenli bir biçimde dik olarak temiz, kuru ve iyi-havalandırılan bir yerde saklanmalıdır.

Steril diluentin muhafaza şartları ve raf ömrü: Raf ömrü 36 aydır. Steril Diluent, orijinal ambalajında, 25°C'nin altında, buzdolabına konulmadan, dondurulmadan ve güneş ışığından korunarak saklanmalıdır.

Dondurulmuş konsantratın raf ömrü: Sıvı nitrojen içinde (- 196°C'de) 36 ay.

Talimatlara göre hazırlanan aşı süspansiyonunun raf ömrü: 1 saat.

TİCARİ TAKDİM ŞEKİLLERİ

1000 doz, 2000 doz veya 4000 doz aşı içeren cam ampul içinde pazarlanmaktadır.

Aynı dozajda dört (eğer 5 ml ampul kullanılıyorsa) veya beş (eğer 2 ml ampul kullanılıyorsa) ampul bir taşıma çubuğunun içine yerleştirilir ve sıvı nitrojen içinde (-196°C'de) saklanır ve gönderilir.

Steril diluent 400 ml ve 800 ml'lik PVC torbada ve PETmet/CPP/PE koruyucu üst torba içinde sunulur.

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİHİ: 15.03.2024
PAZARLAMA İZNİ SAHİBİ
Boehringer Ingelheim İlaç Ticaret A.Ş. Esentepe Mah. Harman 1 Sok. Nidakule Levent No. 7-9 Kat. 15-16, 34394 Şişli, İstanbul
ÜRETİCİ FİRMA VE ADRESİ
Boehringer Ingelheim Animal Health USA Inc., 1168 Airport Parkway, SW Gainesville, GA 30501, Amerika Birleşik Devletleri
Seri No:
Son Kull. Ta.:
KDV Dahil Sa. Fi.:

İç- Dış Etiket

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır
STERİL DİLUENT
400 ML

BİLEŞİMİ: Sükroz, kazein hidrolizat, dipotasyum fosfat, monopotasyum fosfat, fenol kirmizisi, sodyum hidroksit veya konsantre hidroklorik asit, enjeksiyonluk su içerir.
Raf Ömrü: 36 ay
Steril Diluent, orijinal ambalajında, 25°C'nin altında, buzdolabına konulmadan, dondurulmadan ve güneş ışığından korunarak saklanmalıdır. Bulanık ise kullanmayınız.
TİCARİ TAKDİM ŞEKİLLERİ: 400 ml'lik polivinilklorür torbalarda.
Üretici Firma: Boehringer Ingelheim Animal Health Fransa SCS Rue de I'Avition 69800St. Priest Fransa
Seri No:
Son Kull. Ta.:

İç- Dış Etiket

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır
STERİL DİLUENT
800 ML

BİLEŞİMİ: Sükroz, kazein hidrolizat, dipotasyum fosfat, monopotasyum fosfat, fenol kirmizisi, sodyum hidroksit veya konsantre hidroklorik asit, enjeksiyonluk su içerir.
Raf Ömrü: 36 ay
Steril Diluent, orijinal ambalajında, 25°C'nin altında, buzdolabına konulmadan, dondurulmadan ve güneş ışığından korunarak saklanmalıdır. Bulanık ise kullanmayınız.
TİCARİ TAKDİM ŞEKİLLERİ: 800 ml'lik polivinilklorür torbalarda.
Üretici Firma: Boehringer Ingelheim Animal Health Fransa SCS Rue de I'Avition 69800St. Priest Fransa
Seri No:
Son Kull. Ta.:

Asgari İç Ambalaj Etiketi (1000 doz)

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır
1000 doz
VAXXITEK HVT+IBD+ILT
HVT, IBD VP2 & ILTV gD, en az 5640 pfu
Deri altı ve in ovo
Sıvı azot içinde saklanmalıdır
Diğer açıklamalar için prospektüse bakınız
Kullanılmayan içerikleri imha etmeden önce etkisiz hale getiriniz
BI AH USA Gainesville, GA 30501
VLN/PCN 124/1J81.R0
Seri No:
Son Kull. Ta.:

Asgari İç Ambalaj Etiketi (2000 doz)

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır
2000 doz
VAXXITEK HVT+IBD+ILT
HVT, IBD VP2 & ILTV gD, en az 5640 pfu
Deri altı ve in ovo
Sıvı azot içinde saklanmalıdır
Diğer açıklamalar için prospektüse bakınız
Kullanılmayan içerikleri imha etmeden önce etkisiz hale getiriniz
BI AH USA Gainesville, GA 30501
VLN/PCN 124/1J81.R0
Seri No:
Son Kull. Ta.:

Asgari İç Ambalaj Etiketi (4000 doz)

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır
4000 doz
VAXXITEK HVT+IBD+ILT
HVT, IBD VP2 & ILTV gD, en az 5640 pfu
Deri altı ve in ovo
Sıvı azot içinde saklanmalıdır
Diğer açıklamalar için prospektüse bakınız
Kullanılmayan içerikleri imha etmeden önce etkisiz hale getiriniz
BI AH USA Gainesville, GA 30501
VLN/PCN 124/1J81.R0
Seri No:
Son Kull. Ta.: