ÜRÜN ÖZELLİKLERİ ÖZETİ

1. VETERİNER TIBBİ ÜRÜNÜNÜN İSMİ
Versican Plus DHPPi/L4 Köpekler İçin Enjeksiyonluk Süspansiyon İçin Liyofilize Kısım ve Çözücüsü

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ
1 ml (1 doz) üründe;

Aktif maddeler:

Liyofilizat (canlı atenüe)	**Minimum**	**Maksimum**
Köpek distemper virüsü, suş CDV Bio 11/A	$10^{3.1}$ $TCID_{50}$*	$10^{5.1}$ $TCID_{50}$
Köpek adenovirüsü tip 2, suş CAV-2 Bio 13	$10^{3.6}$ $TCID_{50}$*	$10^{5.3}$ $TCID_{50}$
Köpek parvovirüsü tip 2b, suş CPV-2b Bio 12/B	$10^{4.3}$ $TCID_{50}$*	$10^{6.6}$ $TCID_{50}$
Köpek parainfluenza virüsü tip 2, suş CPiV-2 Bio 15	$10^{3.1}$ $TCID_{50}$*	$10^{5.1}$ $TCID_{50}$

Çözücü (inaktif)

Leptospira interrogans serogrup Icterohaemorrhagiae serovar Icterohaemorrhagiae suş MSLB 1089	ALR** titre $\geq$ 1:51
Leptospira interrogans serogrup Canicola serovar Canicola, suş MSLB 1090	ALR** titre $\geq$ 1:51
Leptospira kirschneri serogrup Grippotyphosa serovar Grippotyphosa, suş MSLB 1091	ALR** titre $\geq$ 1:40
Leptospira interrogans serogrup Australis serovar Bratislava, suş MSLB 1088	ALR** titre $\geq$ 1:51

* Doku kültürü enfeksiyöz dozu %50
** Antikor mikro aglütinasyon-litik reaksiyonu

Adjuvant:

Alüminyum hidroksit	1.8–2.2 mg.

Yardımcı maddelerin tam listesi için bkz. bölüm Farmasötik özellikler

3. FARMASÖTİK ŞEKİL
Enjeksiyonluk süspansiyon liyofilizatı ve çözücüsü.

Görsel inceleme ile görünüş aşağıdaki gibidir:
Liyofilizat: beyaz renkli süngerimsi madde.
Çözücü: ince sedimentli beyazımsı renkli.

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1. Hedef türler
Köpek

4.2. Her bir hedef tür için kullanım alanı
6 haftalık yaştan daha büyük köpeklerin aşağıdaki enfeksiyonlar için aktif immünizasyonunda kullanılır

- köpek distemper virüsünün (CDV) neden olduğu mortalitenin ve klinik belirtilerin önlenmesi
- köpek adenovirüsü tip 1'in (CAV-1) neden olduğu mortalitenin ve klinik belirtilerin önlenmesi
- köpek adenovirüsü tip 2'nin (CAV-2) neden olduğu klinik belirtilerin önlenmesi ve viral saçılımın azaltılması
- köpek parvovirüsünün neden olduğu klinik belirtilerin, lökopeninin ve viral saçılımın önlenmesi
- köpek parainfluenza virüsünün (CPiV) neden olduğu klinik belirtilerin (nazal ve oküler akıntı) önlenmesi ve viral saçılımın azaltılması
- *L.interrogans* serogrup Australis serovar Bratislava'nın neden olduğu klinik belirtilerin, enfeksiyonun ve idrarla atılımın önlenmesi
- *L.interrogans* serogrup Canicola serovar Canicola ve *L.interrogans* serogrup Icterohaemorrhagiae serovar Icterohaemorrhagiae'nin neden olduğu klinik belirtilerin ve idrarla atılımın önlenmesi ve enfeksiyonun azaltılması
- *L.interrogans* serogrup Grippotyphosa serovar Grippotyphosa'nın neden olduğu klinik belirtilerin önlenmesi ve enfeksiyonun ve idrarla atılımın azaltılması

Bağışıklığın başlaması
- CDV, CAV, CPV için ilk aşılamadan 3 hafta sonra.
- CPiV için primer aşılamaların tamamlanmasından 3 hafta sonra
- Leptospira bileşenleri için primer aşılamaların tamamlanmasından 4 hafta sonra.

Bağışıklığın süresi:
CDV, CAV-1, CAV-2 ve CPV için primer aşılamaların tamamlanmasını takiben en az üç yıldır. CAV-2'ye karşı immünitenin süresi epruvasyonla belirlenmemiştir. Aşılamadan 3 yıl sonra CAV-2 antikorlarının hâlâ mevcut olduğu gösterilmiştir. CAV-2 ile ilişkili solunum hastalığına karşı koruyucu immün yanıtın en az 3 yıl sürdüğü düşünülmektedir. CPiV ve *Leptospira* bileşenleri için primer aşılamaların tamamlanmasını takiben en az bir yıldır.

4.3. Kontrendikasyonlar
Yoktur.

4.4. Her bir hedef tür için özel uyarılar
İyi bir immün yanıt, sağlıklı ve fonksiyonel bir immün sisteme bağlıdır. Hayvanın immün sisteminin yeterliliği; sağlık durumunun kötü olması, beslenme durumu, genetik faktörler, eşzamanlı ilaç tedavisi ve stres dahil olmak üzere çeşitli faktörler nedeniyle kötüleşebilir.

Aşının CDV, CAV ve CPV bileşenlerine immünolojik yanıtlar, maternal antikor interferansı nedeniyle gecikebilir. Bununla birlikte, aşının, CDV, CAV ve CPV'ye karşı maternal antikorların saha koşulları altında karşılaşılması olası olan düzeylere eşit ya da onlardan yüksek düzeylerde mevcut olmaları durumunda virülan eprüvasyona karşı koruyucu olduğu kanıtlanmıştır. Maternal antikor düzeylerinin yüksek olmalarının beklendiği durumlarda, aşılama protokolü buna uygun şekilde planlanmalıdır.

4.5. Kullanıma ilişkin özel uyarılar
i) Hayvanlarda kullanıma ilişkin özel uyarılar
Yalnızca sağlıklı hayvanlar aşılanmalıdır.

Aşılamadan sonra, aşılanan hayvanlardan canlı atenüe virüs aşısı suşları CAV-2, CPiV ve CPV-2b'nin saçılımı söz konusu olabilir; CPV saçılımının 10 güne kadar sürdüğü

gösterilmiştir. Bununla birlikte, bu suşların patojenitesi düşük olduğundan, aşılanan köpeklerin aşılanmamış köpeklerden ayrı tutulması gerekli değildir. Aşı virüsü suşu CPV-2b evcil kedilerde ve köpek parvovirüslerine duyarlı oldukları bilinen diğer karnivorlarda (köpekler haricinde) test edilmemiştir. Dolayısıyla, aşılanan köpekler, aşılamadan sonra diğer köpekgillerden ve kedigillerden ayrılmalıdır.

(ii) Ürünü uygulayana ilişkin özel uyarılar
Kişi kaza sonucu kendi kendine enjeksiyon yaptığı takdirde derhal tıbbi yardıma başvurulmalı ve hekime kullanma talimatı ya da etiket gösterilmelidir.

(iii) Diğer uyarılar
-

4.6. İstenmeyen etkiler (sıklık ve şiddet)
Köpeklere deri altı yolla uygulamayı takiben enjeksiyon bölgesinde geçici şişlik (5 cm'ye kadar) sıklıkla gözlenebilmektedir. Şişlikler ağrılı ve sıcak olup, kızarıklık görülebilir. Bu tür şişlikler, aşılamadan sonraki 14 gün içinde ya kendiliğinden ortadan kalkar ya da büyük oranda küçülür. Anoreksi ve azalmış aktivite nadiren gözlenebilir. Nadiren enjeksiyon bölgesinde şişlik, kitle, nodül görülebilir. Nadiren hipersensitivite reaksiyonları (yani gastrointestinal belirtiler, diyare ve kusma gibi, anafilaksi, anjioödem, dispne, dolaşım şoku, kollaps) görülebilir. Bu tür reaksiyonların görülmesi durumunda derhal uygun tedavi uygulanmalıdır. Bu tür reaksiyonlar yaşamı tehdit edebilen daha şiddetli bir rahatsızlığa dönüşebilir. Çok nadiren letarji, hipertermi, ve genel keyifsizlik gibi sistemik reaksiyonlar görülebilir. Çok nadiren hemolitik anemi, trombositopeni veya poliartrit gibi bağışıklıkla ilişkili hastalıklar görülebilir. İstenmeyen etkilerin sıklığı aşağıdaki reaksiyon sıklığına göre tanımlanmaktadır:
- Çok sık (bir tedavi uygulaması sırasında 10 hayvanın 1'den fazlasında istenmeyen etki görülmesi)
- Sık (100 hayvanın 1'den fazlasında ama 10'dan azında istenmeyen etki görülmesi)
- Seyrek (1000 hayvanın 1'den fazlasında ama 10'dan azında istenmeyen etki görülmesi)
- Nadir (10,000 hayvanın 1'den fazlasında ama 10'dan azında istenmeyen etki görülmesi)
- Çok nadir (10,000 hayvanın 1'den azında, izole raporlar dahil istenmeyen etki görülmesi)

4.7. Gebelik, laktasyon ve yumurtlama döneminde kullanım
Gebeliğin ikinci ve üçüncü dönemlerinde kullanılabilir. Gebeliğin erken döneminde ve laktasyon dönemindeki güvenliliği araştırılmadığı için kullanılmamalıdır.

4.8. Diğer tıbbi ürünlerle etkileşim ve diğer etkileşim biçimleri
Bu aşının başka herhangi bir veteriner tıbbi ürünü ile birlikte kullanıldığı durumdaki güvenliliği ve etkililiği hakkında bilgi mevcut değildir. Bu nedenle, bu aşının başka herhangi bir veteriner tıbbi ürününden önce ya da sonra kullanılmasına dair karar veteriner tarafından vaka bazında verilmelidir.

4.9. Dozaj ve kullanım yolu
Deri altı yolla uygulanmalıdır.

Doz ve uygulama yolu:
Liyofilizat çözücü ile aseptik koşullar altında sulandırılarak hazırlanır. İyice çalkalanır ve hazırlanmış ürün içeriğinin tamamı (1 ml) hemen uygulanır.

Sulandırılarak hazırlanmış aşı: pembemsi ya da sarımsı renkte, hafif opak görünümdedir.

Primer aşılama: 6 haftalık yaştan itibaren 3–4 hafta arayla iki doz Versican Plus DHPPi/L4 uygulanır.

Tekrar aşılama:
Versican Plus DHPPi/L4 aşısının yıllık olarak tekrar uygulanması önerilmektedir.

4.10. Doz aşımı, varsa semptomlar, acil durum prosedürler, antidotlar (gerekli ise)
Aşının 10 kat aşırı dozunun uygulanmasından sonra, ters etkilerde belirtilenlerin haricinde başka hiçbir reaksiyon gözlenmemiştir. Ancak, hayvanların küçük bir kısmında, aşının 10 kat aşırı dozunun uygulanmasından hemen sonra enjeksiyon bölgesinde ağrı gözlenmiştir. Ağrı geçici olmuş ve tedavi gerektirmeksizin ortadan kalmıştır.

4.11. Kalıntı arınma süreleri (sıfır gün olanlar da dâhil)
Uygulanabilir değildir.

5. İMMÜNOLOJİK ÖZELLİKLER

ATC Vet Kodu: QI07AI02
Farmakoterapötik Grup: Canidae için immünolojik ürünler, canlı viral ve inaktivf bakteriyel aşılar.

Aşı, sağlıklı köpek yavrularının ve köpeklerin köpek distemper virüsü, köpek parvovirüsü, köpek adenovirüsü tip 1 ve 2, köpek parainfluenza virüsü, *Leptospira interrogans* serogrup Australis serovar Bratislava, *Leptospira interrogans* serogrup Canicola serovar Canicola, *Leptospira interrogans* serogrup Grippotyphosa serovar Grippotyphosa ve *Leptospira interrogans* serogrup Icterohaemorrhagiae serovar Icterohaemorrhagaie'nin neden olduğu hastalıklara karşı aktif immünizasyonu içindir.

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1. Yardımcı maddeler
Liyofilizat:
Trometamol
Edetik Asit
Sükroz
Dekstran 70

Çözücü:
Sodyum klorür
Potasyum klorür
Potasyum dihidrojen fosfat
Disodyum fosfat dodekahidrat
Enjeksiyonluk su

6.2. Geçimsizlikler
Geçimlilik çalışmaları yapılmamış olduğundan, bu veteriner tıbbi ürünü başka veteriner tıbbi ürünleriyle karıştırılmamalıdır.

6.3. Raf ömrü
Ürünün satışa sunulmuş hali ile raf ömrü: 2 yıl.

Talimata uygun şekilde sulandırarak hazırlamadan sonraki raf ömrü: Sulandırılan ürün hemen kullanılmalıdır.

6.4. Muhafaza şartları
2 °C – 8 °C arasında muhafaza edilmeli ve nakledilmelidir.
Dondurmayınız. Işıktan koruyunuz.

6.5. Birincil ambalajın niteliği ve kompozisyonu
1 doz liyofilizat içeren, bromobütil kauçuk tıpa ve alüminyum başlık ile kapatılan tip I cam flakon.
1 ml çözücü içeren, klorobütil kauçuk tıpa ve alüminyum başlık ile kapatılan tip I cam flakon.

Ambalaj boyutları:
25 liyofilizat flakonu ve 25 çözücü flakonu içeren plastik kutu.
50 liyofilizat flakonu ve 50 çözücü flakonu içeren plastik kutu.

Ambalaj boyutlarının hepsi pazarlanmıyor olabilir.

6.6 Kullanılmış veya arta kalan ürünün imhasına ilişkin özel önlemler

Ürün atık su veya evsel atıklar yolu ile atılmamalıdır. Kullanılmamış ürünlerin imhası ile ilgili olarak veteriner hekime danışınız. Bu önlemler çevre sağlığını korumada yardımcı olacaktır.

7. PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ
Zoetis Hayvan Sağlığı Ltd. Şti., Buyaka İki Sitesi, Kule 2, Kat:2, 34771, Ümraniye – İstanbul

8. PAZARLAMA İZNİ NUMARASI
-

9. PAZARLAMA İZNİNİN İLK VERİLME VEYA YENİLEME TARİHİ
14.12.2016

10. METİN DEĞİŞİKLİK TARİHİ
16.07.2026

Prospektüs:

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır

Versican Plus DHPPi/L4

Köpekler için enjeksiyonluk süspansiyon için liyofilize kısım ve çözücüsü

BİLEŞİM

Her bir 1 ml'lik doz aşağıdakileri içerir.

Aktif maddeler:

Liyofilizat (canlı atenüe)	Minimum	Maksimum
Köpek distemper virüsü, suş CDV Bio 11/A	$10^{3.1}$ $TCID_{50}$*	$10^{5.1}$ $TCID_{50}$*
Köpek adenovirüsü tip 2, suş CAV-2 Bio 13	$10^{3.6}$ $TCID_{50}$*	$10^{5.3}$ $TCID_{50}$*
Köpek parvovirüsü tip 2b, suş CPV-2b Bio 12/B	$10^{4.3}$ $TCID_{50}$*	$10^{6.6}$ $TCID_{50}$*
Köpek parainfluenza virüsü tip 2, suş CPiV-2 Bio 15	$10^{3.1}$ $TCID_{50}$*	$10^{5.1}$ $TCID_{50}$*

Çözücü (inaktif)	
Leptospira interrogans serogrup Icterohaemorrhagiae serovar Icterohaemorrhagiae suş MSLB 1089	ALR** titre ≥ 1:51
Leptospira interrogans serogrup Canicola serovar Canicola, suş MSLB 1090	ALR** titre ≥ 1:51
Leptospira kirschneri serogrup Grippotyphosa serovar Grippotyphosa, suş MSLB 1091	ALR** titre ≥ 1:40
Leptospira interrogans serogrup Australis serovar Bratislava, suş MSLB 1088	ALR** titre ≥ 1:51

* Doku kültürü enfeksiyöz dozu %50

** Antikor mikro aglütinasyon-litik reaksiyonu

Adjuvant:

Alüminyum hidroksit	1.8 – 2.2 mg

KULLANIM SAHASI/ENDİKASYONLAR

6 haftalık yaştan daha büyük köpeklerin aşağıdaki enfeksiyonlar için aktif immünizasyonunda kullanılır

- köpek distemper virüsünün (CDV) neden olduğu mortalitenin ve klinik belirtilerin önlenmesi
- köpek adenovirüsü tip 1'in (CAV-1) neden olduğu mortalitenin ve klinik belirtilerin önlenmesi
- köpek adenovirüsü tip 2'nin (CAV-2) neden olduğu klinik belirtilerin önlenmesi ve viral saçılımın azaltılması
- köpek parvovirüsünün neden olduğu klinik belirtilerin, lökopeninin ve viral saçılımın önlenmesi
- köpek parainfluenza virüsünün (CPiV) neden olduğu klinik belirtilerin (nazal ve oküler akıntı) önlenmesi ve viral saçılımın azaltılması
- *L.interrogans* serogrup Australis serovar Bratislava'nın neden olduğu klinik belirtilerin, enfeksiyonun ve idrarla atılımın önlenmesi
- *L.interrogans* serogrup Canicola serovar Canicola ve *L.interrogans* serogrup Icterohaemorrhagiae serovar Icterohaemorrhagiae'nin neden olduğu klinik belirtilerin ve idrarla atılımın önlenmesi ve enfeksiyonun azaltılması
- *L.kirschneri* serogrup Grippotyphosa serovar Grippotyphosa'nın neden olduğu klinik belirtilerin önlenmesi ve enfeksiyonun ve idrarla atılımın azaltılması

Bağışıklığın başlaması

- CDV, CAV, CPV için ilk aşılamadan 3 hafta sonra.
- CPiV için primer aşılamaların tamamlanmasından 3 hafta sonra
- Leptospira bileşenleri için primer aşılamaların tamamlanmasından 4 hafta sonra.

Bağışıklığın süresi:
CDV, CAV-1, CAV-2 ve CPV için primer aşılamaların tamamlanmasını takiben en az üç yıldır. CAV-2'ye karşı immünitenin süresi epruvasyonla belirlenmemiştir. Aşılamadan 3 yıl sonra CAV-2 antikorlarının hâlâ mevcut olduğu gösterilmiştir. CAV-2 ile ilişkili solunum hastalığına karşı koruyucu immün yanıtın en az 3 yıl sürdüğü düşünülmektedir. CPiV ve Leptospira bileşenleri için primer aşılamaların tamamlanmasını takiben en az bir yıldır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Deri altı yolla uygulanmalıdır.

Primer aşılama : 6 haftalık yaştan itibaren 3–4 hafta arayla iki doz Versican Plus DHPPi/L4 uygulanır.

Tekrar aşılama : Versican Plus DHPPi/L4 aşısının yıllık olarak tekrar uygulanması önerilmektedir.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN UYARILAR
Liyofilize kısım sulandırıcı içerisinde aseptik olarak sulandırılmalıdır. İyice çalkalanır ve hazırlanmış ürün içeriğinin tamamı (1 ml) hemen uygulanır. Sulandırılarak hazırlanmış aşı: pembemsi ya da sarımsı renkte, hafif opalesan görünümdedir.

Yalnızca sağlıklı hayvanlar aşılanmalıdır.

Aşılamadan sonra, aşılanan hayvanlardan canlı atenüe virüs aşısı suşları CAV-2, CPiV ve CPV-2b'nin saçılımı söz konusu olabilir; CPV saçılımının 10 güne kadar sürdüğü gösterilmiştir. Bununla birlikte, bu suşların patojenitesi düşük olduğundan, aşılanan köpeklerin aşılanmamış köpeklerden ayrı tutulması gerekli değildir.
Gebelikte Kullanım: Gebeliğin ikinci ve üçüncü dönemlerinde kullanılabilir. Gebeliğin erken döneminde ve laktasyon dönemindeki güvenliliği araştırılmadığı için kullanılmamalıdır.

İSTENMEYEN ETKİLER
Köpeklere deri altı yolla uygulamayı takiben enjeksiyon bölgesinde geçici şişlik (5 cm'ye kadar) sıklıkla gözlenebilmektedir. Şişlikler ağrılı ve sıcak olup, kızarıklık görülebilir. Bu tür şişlikler, aşılamadan sonraki 14 gün içinde ya kendiliğinden ortadan kalkar ya da büyük oranda küçülür. Anoreksi ve azalmış aktivite nadiren gözlenebilir. Nadiren enjeksiyon bölgesinde şişlik, kitle, nodül görülebilir. Nadiren hipersensitivite reaksiyonları (yani gastrointestinal belirtiler, diyare ve kusma gibi, anafilaksi, anjioödem, dispne, dolaşım şoku, kollaps) görülebilir. Bu tür reaksiyonların görülmesi durumunda derhal uygun tedavi uygulanmalıdır. Bu tür reaksiyonlar yaşamı tehdit edebilen daha şiddetli bir rahatsızlığa dönüşebilir. Çok nadiren letarji, hipertermi, ve genel keyifsizlik gibi sistemik reaksiyonlar görülebilir. Çok nadiren hemolitik anemi, trombositopeni veya poliartrit gibi bağışıklıkla ilişkili hastalıklar görülebilir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ
Bu aşının başka herhangi bir veteriner tıbbi ürünü ile birlikte kullanıldığı durumdaki güvenliliği ve etkililiği hakkında bilgi mevcut değildir. Bu nedenle, bu aşının başka herhangi bir veteriner tıbbi ürününden önce ya da sonra kullanılmasına dair karar veteriner tarafından vaka bazında verilmelidir.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT
Aşının 10 kat aşırı dozunun uygulanmasından sonra, ters etkilerde belirtilenlerin haricinde başka hiçbir reaksiyon gözlenmemiştir. Ancak, hayvanların küçük bir kısmında, aşının 10 kat aşırı dozunun uygulanmasından hemen sonra enjeksiyon bölgesinde ağrı gözlenmiştir. Ağrı geçici olmuş ve tedavi gerektirmeksizin ortadan kalmıştır.

GIDA DEĞERİ OLAN HAYVANLARDA KALINTI UYARILARI
Uygulanabilir değildir.

KONTRENDİKASYONLAR
Yoktur.

GENEL UYARILAR
Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz. Raf ömrü geçmiş ve ambalajı hasarlı ürünleri satın almayınız ve kullanmayınız.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN ÖNERİLER
Uygulayıcı kaza sonucu kendi kendine enjeksiyon yaptığı takdirde derhal tıbbi yardıma başvurulmalı ve hekime kullanma talimatı ya da etiket gösterilmelidir.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ
Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 24 aydır.
Sulandırılmış aşı bekletilmeden kullanılmalıdır
Süspansiyon ve liyofilize kısım 2 – 8 °C arasında, buzdolabında, ışıktan koruyarak muhafaza edilmelidir. Dondurulmamalıdır.

KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR
Kullanılmamış veteriner tıbbi ürünü veya böyle bir veteriner tıbbi ürününden kaynaklanan atık maddeler, yönetmeliklere uygun şekilde imha edilmelidir.

Aşı virüsü suşu CPV-2b evcil kedilerde ve köpek parvovirüslerine duyarlı oldukları bilinen diğer karnivorlarda (köpekler haricinde) test edilmemiştir. Dolayısıyla, aşılanan köpekler, aşılamadan sonra diğer köpekgillerden ve kedigillerden ayrılmalıdır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKİLLERİ
1 doz liyofilizat içeren, bromobütil kauçuk tıpa ve alüminyum başlık ile kapatılan tip I cam flakon.
1 ml çözücü içeren, klorobütil kauçuk tıpa ve alüminyum başlık ile kapatılan tip I cam flakon.

Ambalaj boyutları:
25 liyofilizat flakonu ve 25 çözücü flakonu içeren plastik kutu.
50 liyofilizat flakonu ve 50 çözücü flakonu içeren plastik kutu.

Tüm ticari takdim şekilleri piyasada bulunmayabilir.

PROSPEKTÜSÜN ONAY TARİHİ: 16.07.2026

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİHİ :
14.12.2016

PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ : Zoetis Hayvan Sağlığı Ltd. Şti., Buyaka İki Sitesi, Kule 2, Kat:2, 34771, Ümraniye – İstanbul

ÜRETİCİ FİRMA VE ADRESİ :
Bioveta A.S. Komenskeho 212, 683 23 Ivanovice na Hane
Çek Cumhuriyeti

Kutu Etiketi : 25 x 1 doz veya 50 x 1 doz için

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır
Versican Plus DHPPi/L4
Attenüe Canlı Aşı
Köpek distemper – adenovirus tip 2 – parvovirus tip 2b – parainfluenza virüsü tip 2 aşısı
Leptospira icterohaemorrhagiae – canicola – grippotyphosa - Bratislava
Köpekler için enjeksiyonluk süspansiyon liyofilizatı ve çözücüsü
Köpeklere uygulanır
Sadece hayvan sağlığında kullanılır
Deri altı yolla uygulanmalıdır.

Bileşimi:
Her bir 1 ml'lik doz aşağıdakileri içerir.

Etkin maddeler:

Liyofilizat (canlı atenüe)	Minimum	Maksimum
Köpek distemper virüsü, suş CDV Bio 11/A	$10^{3.1}$ $TCID_{50}$*	$10^{5.1}$ $TCID_{50}$*
Köpek adenovirüsü tip 2, suş CAV-2 Bio 13	$10^{3.6}$ $TCID_{50}$*	$10^{5.3}$ $TCID_{50}$*
Köpek parvovirüsü tip 2b, suş CPV-2b Bio 12/B	$10^{4.3}$ $TCID_{50}$*	$10^{6.6}$ $TCID_{50}$*
Köpek parainfluenza virüsü tip 2, suş CPiV-2 Bio 15	$10^{3.1}$ $TCID_{50}$*	$10^{5.1}$ $TCID_{50}$*

Çözücü (inaktif)	
Leptospira interrogans serogrup Icterohaemorrhagiae serovar Icterohaemorrhagiae suş MSLB 1089	ALR** titre $\geq$ 1:51
Leptospira interrogans serogrup Canicola serovar Canicola, suş MSLB 1090	ALR** titre $\geq$ 1:51
Leptospira kirschneri serogrup Grippotyphosa serovar Grippotyphosa, suş MSLB 1091	ALR** titre $\geq$ 1:40
Leptospira interrogans serogrup Australis serovar Bratislava, suş MSLB 1088	ALR** titre $\geq$ 1:51

* Doku kültürü enfeksiyöz dozu %50
** Antikor mikro aglütinasyon-litik reaksiyonu

Kullanmadan Önce Kullanma Talimatını Okuyunuz. Soğutma koşulları altında saklayınız ve taşıyınız. Dondurmayınız. Isıktan koruyunuz. Atma: Kullanma talimatını okuyunuz. Yalnızca hayvan tedavisinde kullanılır. Yalnızca veteriner hekim reçetesi ile tedarik edilir. Çocukların göremeyecegi ve erişemeyeceği yerlerde saklayınız.

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Pazarlama izni tarihi : 14.12.2016

Pazarlama izni sahibi ve adresi :
Zoetis Hayvan Sağlığı Ltd. Şti., Buyaka İki Sitesi, Kule İki, Kat İki, 34771 Ümraniye, İstanbul

Üretici firma ve adresi :
Bioveta A.S. Komenskeho 212, 683 23 Ivanovice na Hane
Çek Cumhuriyeti

Seri no :
Üretim ta.:
Son. Kul. ta.:

Şişe (Liyofilize kısım) : 1 doz

Versican Plus DHPPi
1 doz 1 ml ile sulandırılır
Versican Plus DHPPi/L4
Attenüe Canlı Aşı
Köpek distemper – adenovirus tip 2 – parvovirus tip 2b – parainfluenza virüsü tip 2 aşısı
Leptospira icterohaemorrhagiae – canicola – grippotyphosa - bratislava
Sadece hayvan sağlığında kullanılır.
Deri altı yolla uygulanılır.

Seri no :
Üretim ta.:
Son. Kul. ta.:

Şişe (Çözücü) : 1 ml

Versican Plus L4
1 ml
Versican Plus DHPPi/L4
Sadece Versican Plus L4 ile kullanılır
Sadece hayvan sağlığında kullanılır.
T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Pazarlama izni tarihi : 14.12.2016

Seri no :
Üretim ta.:
Son. Kul. ta.: